

Gemeinverständliche Belehrung über die Krätze

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Das Rote Kreuz : offizielles Organ des Schweizerischen Centralvereins vom Roten Kreuz, des Schweiz. Militärsanitätsvereins und des Samariterbundes**

Band (Jahr): **27 (1919)**

Heft 18

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-547227>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

heiten als Folgen entstehen können, man denke an die Rückenmarkschwinducht, an die Gehirnerweichung usw. Und dann überzähle man die gewaltige Zahl von Fehlgeburten, welche mit Syphilis sicher im Zusammenhang stehen, so wird man zu einer erschreckend großen Zahl kommen, die unser Eingreifen und unsere eifrigste Arbeit erheischt. Dazu ist aber außer der Früherkenntnis der Lues eben so nötig, daß sich das Volk bewußt wird, daß es mithelfen muß. Jeder Erkrankte, der an die Möglichkeit einer Syphilis denken kann, sollte sich sofort dem Arzte stellen und die Untersuchung seiner Geschwüre auf Spirochaeten veranlassen, wenn nicht absolute Sicherheit für die Diagnose schon vorliegt. So wird es gelingen, die Syphilis zu verdrängen und ihr den Schrecken zu nehmen, den sie heutzutage noch über die Menschheit verbreitet.

Auch beim Tripper, der Gonorrhoe, liegt die Sache ähnlich, wenn auch zeitlich beschränkter. Gelingt es gleich zu Anfang, die Anwesenheit der Erreger festzustellen, so führt oft eine Abortivkur zu schneller Heilung des

Leidens und unendliches Unglück kann vermieden werden.

Diese schönen Aussichten erfahren insofern eine Hemmung, als es bisher in kleinen Ortschaften nicht immer gelingt, sofort einen mit der Untersuchung vertrauten Fachmann aufzusuchen. Deshalb haben es die Gesellschaften: Deutscher Ärzte-Vereinsbund, Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und der Reichsausschuß für ärztliches Fortbildungswesen in sehr anerkennenswerter Weise an die Hand genommen, kurzfristige Kurse einzurichten, in welchen die Ärzte mit den neuesten Methoden der Frühdiagnostik bekannt gemacht werden. Die Kurse sollen nur etwa 12 Stunden, auf 3 Sonntage verteilt, dauern. Wie ernst es den leitenden Organen mit diesen Maßnahmen ist, geht auch daraus hervor, daß den Ärzten, die nicht am Kursort wohnen, die Reisekosten ersetzt werden.

Wir würden es sehr begrüßen, wenn auch in der Schweiz solche Institutionen ins Leben gerufen würden, sie würden zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten bedeutend beitragen. J.

Gemeinverständliche Belehrung über die Krätze.

Die Krätze ist eine übertragbare Hautkrankheit, die durch die Krätzmilbe verursacht wird.

Diese Krätzmilbe ist mit bloßem Auge als ein kleines, weißes, glänzendes Pünktchen kaum erkennbar. Das Männchen ist nur etwa halb so groß als das Weibchen; es bohrt sich in die Haut des Menschen ein und stirbt nach der Begattung bald ab. Das Weibchen bohrt sich nach der Begattung durch die verhornte Schicht der Oberhaut des Menschen und wühlt sich in dieser parallel zur Oberfläche Gänge. In diesen Gängen legt es, immer weiter fortgrabend, täglich 1 bis 2 Eier, aus denen nach 12 Tagen junge Krätzmilben auskriechen, die den Gang verlassen und sich in

etwa 3 bis 4 Wochen durch mehrfache Häutungen zu geschlechtsreifen Milben entwickeln.

Die erste und hervorstechendste Erscheinung der Krätze ist ein äußerst starkes Jucken, das durch den Reiz, den die Milben und ihre Ausscheidungen auf die Nervenendigungen ausüben, verursacht wird. Besonders stark ist das Jucken unmittelbar nach dem Schlafengehen, da sich die Milben in der Bettwärme lebhafter bewegen.

Dem Arzt gelingt es meist, bei Krätzekranken die Milbengänge aufzufinden. Sie stellen sich als hellgraue oder schwärzliche, gekrümmte, schmale Streifen dar, an deren Ende manchmal die Milbe als ein kleiner

weißer Punkt durchschimmert. Ihr Lieblings-
sitz sind die Hautfalten zwischen den Fingern
und die Seitenflächen der Finger, die Klein-
fingerseite der Hand und die Beugeseite des
Handgelenks.

Durch den Reiz, den die Milben und ihre
Ausscheidungen auf die Haut ausüben, kommt
es in der Umgebung der Gänge zu Entzün-
dungen. Oft entstehen unter und neben den
Gängen Bläschen und Pusteln, die mitunter
vereitern. Zu diesen durch die Milben her-
vorgerufenen Erscheinungen treten noch die
mannigfaltigen Hautabschürfungen, Rötungen,
Entzündungen und Vorkenbildungen, die durch
das Kräzen der Haut entstehen. Bei längerem
Bestehen der Krätze kommt es auch zuweilen
zu tiefergehenden Eiterungen.

Auch das Allgemeinbefinden und die Lei-
stungsfähigkeit des Menschen wird durch die
Krätze erheblich beeinträchtigt. Insbesondere
bei Kindern bewirkt der beständige Juckreiz,
daß der Schlaf und Appetit stark leidet und
sie halb mager und blaß aussehen.

Die Uebertragung der Krätze erfolgt meist
von einem Menschen auf den andern: es ist
hierbei weniger eine gelegentliche kurze Be-
rührung, wie ein Händedruck, zu fürchten,
als vielmehr eine längere ausgiebigere, wie
sie insbesondere bei Benutzung derselben
Schlafgelegenheit durch mehrere Personen
zustande kommt.

Auch durch Bettwäsche, Leibwäsche oder
Kleidungsstücke können Krätzemilbe bzw. ihre
Eier von einer Person auf andere übertragen
werden. Begünstigt wird die Verbreitung der
Krankheit in jedem Falle durch Unsauberkeit,
wie denn auch die Krätze bei unsauberen
Personen infolge einer weit stärkeren Ver-
mehrung und Ausbreitung der Milben viel
schwerer auftritt.

Die Krätze ist im Krankenhause in der
Regel in 3 bis 6 Tagen dauernd zu heilen,

Im eigenen Haushalt ist die Durchführung
einer Krätzekur viel schwieriger und der Er-
folg unsicherer, zumal wenn keine Badeein-
richtung zur Verfügung steht. Wenn vom
Arzt bei einem Kranken Krätze festgestellt ist,
müssen sogleich alle zur Familie gehörende
oder sonst in demselben Haushalt wohnenden
Personen ärztlich auf etwaiges Vorhanden-
sein von Krätze untersucht werden. Nach
Durchführung der Kur bleibt häufig noch
längere Zeit Hautjucken bestehen, bis die viel-
fachen, durch Kräzen erzeugten Verletzungen
abgeheilt sind. Nur in seltenen Fällen tritt
die Krätze nach einer gründlichen Behandlung,
ohne daß eine neue Ansteckung stattfand,
wieder auf, wenn einige Milbeneier bei der
Kur der Vernichtung entgingen.

Keine an Krätze oder unter krätzeverdäch-
tigen Erscheinungen erkrankte Person darf
mit andern Personen das gleiche Bett be-
nutzen. Jeder Krätzekrankte hat nach Mög-
lichkeit die nähere Berührung mit Gesunden zu
vermeiden. Die gleichen Vorsichtsmaßregeln
sind von Personen zu beachten, die eben erst
eine Krätzekur durchgemacht haben und noch
Jucken spüren. Schüler, die an Krätze erkrankt
sind, sind vom Schulbesuch auszuschließen
und müssen sich einer Kur und Desinfektion
unterziehen.

Wäsche und Kleidungsstücke Krätzekrankter
und Krätzeverdächtiger dürfen von Gesunden
nicht benutzt werden, bevor sie einer gründ-
lichen Reinigung und Desinfektion unterwor-
fen worden sind. Insbesondere ist auch als-
bald eine Desinfektion der Bett- und Leib-
wäsche sowie der Kleidungsstücke und Betten
vorzunehmen, wenn sich ein Krätzekrankter zur
Behandlung in ein Krankenhaus begibt oder
sich sonst einer Krätzekur unterzieht, damit er
sich nicht aufs neue an seinen eigenen Sachen
ansteckt.

(„Deutsches Rotes Kreuz“.)

