

Le danger des médicaments au volant

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **La Croix-Rouge suisse**

Band (Jahr): **83 (1974)**

Heft 7

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-684181>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Photo Karl Zimmermann, Cologne

Le danger des médicaments au volant

Les autorités combattent depuis longtemps l'alcool au volant. Avec raison. Par contre le danger des médicaments pour les automobilistes n'est pas souligné. Bien à tort.

Vos réflexes de conducteur peuvent être influencés si vous prenez l'un des médicaments suivants, surtout pour la première fois. La plupart d'entre eux renforcent en outre l'effet de l'alcool.

Somnifères, sédatifs et analgésiques contenant des hypnotiques:

Bendor, Chloralduurat, Cibalgine, Commo-tional, Dolviran, Doridène, Evipan, Fadormir, Gubamine, Ircodényl, Medianox, Médonime, Membutal, Nodular, Norminox, Oblivon, Persédon, Phanodorm-Carcium, Prominal, Revonal, Sanofeohn, Saridon, Seconal, Sonery, Toquilone, Veramon, Xaril*.

Médicaments psychoactifs (sédatifs diurnes et tranquillisants) et relaxants musculaires:
Anafranil, Atarax, Concorin, Dartal,

Décontractyl, Dorsiflex, Fluanxol, Gamaquil, Haloperido, Istonil, Largactil, Laroxyll, Librium, Luvatren, Majeptil, Melleril, Moditen, Mogadon, Nobrium, Nortrilen, Noveril, Nozinan, Paraflex, Pertofran, Pertranquil, Prazine, Quilacortin, Quilil, Reorganin, Seresta, Serpasil, Sordinol, Surtomtil, Taractan, Temesta, Tofranil, Tran-colpal, Tranxilium, Trilaton, Truxal, Tryptizol, Valium, Veractil, Vesitan*.

Réducteurs de l'appétit et stimulants:

Aktedron, Antapentan, Benzédrine, Dexédrine, Jomanin, Lidepran, Miniscap, Modatrop, Pervitine, Pondinil, Preludin, Rege-non-A, Ritaline, Stimul*.

Médicaments contre l'hypertension et diurétiques:

Adelphan, Adelphan-Esidx, Aldomet, Arfonad, Dichlotride-Réserpine, Hygro-ton-Réserpine, Isméline, Isméline-Navidrex, Modenol, Nepresol, Rénèse-Réserpine, Serpasi, Serpasil-Esidx*.

Préparations contre l'allergie, le mal de voyage, la grippe:

L'influence des antihistaminiques, anti-allergiques, etc, sur la conduite automobile réside dans leur effet sédatif et dans le fait des combinaisons fréquentes avec des stimulants ou des hypnotiques. Leur choix est tel que nous ne pouvons entrer ici dans les détails. Demandez donc à votre médecin ou à votre pharmacien.

** Cette liste n'est pas complète*

D'autres médicaments encore peuvent s'avérer dangereux au volant. Renseignez-vous toujours auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si les médicaments que vous prenez influencent défavorablement vos aptitudes de conduite.

Ne mettez pas autrui et vous-même en danger!

(HSM. Centre d'information des pharmaciens suisses)