

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Acta Tropica**

Band (Jahr): **20 (1963)**

Heft 3

PDF erstellt am: **23.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

TRACHOME

UN SULFAMIDE

- * ACTIF A FAIBLE DOSE
- * PROCURANT UNE SULFAMIDÉMIE ÉLEVÉE ET PERSISTANTE

SULTIRÈNE

(7522 R.P. - Sulfaméthoxyypyridazine)

- Comprimés dosés à 250 mg (flacon de 20)
- Suspension buvable (flacon de 125 ml)
Une cuiller-mesure = 100 mg de principe actif.

Une seule prise

hebdomadaire ou bihebdomadaire

	ADULTES	E N F A N T S			Au-dessus de 13 ans
		Au-dessous de 6 ans	De 6 à 10 ans	De 10 à 13 ans	
Une fois par semaine →	3 g (12 comprimés)	1,50 g (6 comprimés ou 15 cuillerées de suspension)	2 g (8 comprimés ou 20 cuillerées de suspension)	2,50 g (10 comprimés)	Même posologie que chez l'adulte
ou Deux fois par semaine →	1,50 g (6 comprimés)	0,75 g (3 comprimés ou 7 cuillerées de suspension)	1 g (4 comprimés ou 10 cuillerées de suspension)	1,25 g (5 comprimés)	

Assurer une diurèse abondante pendant la durée du traitement.

ANTIBIOTHÉRAPIE LOCALE : ROVAMYCINE SPECIA POMMADE

SOCIÉTÉ PARISIENNE  **D'EXPANSION CHIMIQUE**
RHÔNE POULENC

Information Médicale : 28, Cours Albert-1^{er} - PARIS-8^e - B. P. 490-08 - BAL. 10-70

Printed in Switzerland

Druck von Friedrich Reinhardt AG., Basel