

Zeitschrift: Archives des sciences [1948-1980]
Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève
Band: 13 (1960)
Heft: 9: Colloque Ampère

Artikel: Résultats préliminaires sur deux nouveaux radicaux libres en solution
Autor: Lanzi, G. / Siragusa, G. / Zanotti, L.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-738582>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 05.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


Résultats préliminaires sur deux nouveaux radicaux libres en solution

G. LANZI, G. SIRAGUSA, L. ZANOTTI


Istituto di Fisica dell' Università, Pavia.

En examinant le comportement au spectrographe E.P.R. (bande X) de quelques substances organiques nous nous sommes occupés en particulier de l'étude de deux composés de la phénothiazine, à savoir le perchlorate et le perbromure de phénothiazine.

On peut dire tout d'abord qu'il s'agit de deux degrés d'oxydation différents de la phénothiazine. En ce qui concerne le perchlorate de phénothiazine (semiquinone) on utilise comme oxydant H_2SO_4 concentré ($d = 1,84$), et on procède suivant la méthode [1]:



Ce produit d'une première oxydation est précipité par H_2SO_4 avec HClO_4 selon la réaction suivante:



Cette semiquinone, d'une couleur vert-foncé, ne présente pas sous cette forme un paramagnétisme très important [2]. Cela peut être attribué au fait qu'il existe un équilibre entre la forme monomère, précédemment décrite, et la forme dimère.

Le perchlorate de phénouthiazine ainsi obtenu est parfaitement soluble dans H_2SO_4 concentré et la solution a donné un signal de structure hyperfine qui est montré dans la figure 1a.





Fig. 1.

- a) Perchlorate (semiquinone);
- b) Perbromure (quinone).


Il convient de remarquer à ce sujet qu'il est facile de rapporter l'aspect de cette structure principalement à l'interaction de l'électron libre avec le spin nucléaire de l'azote, toutefois il y a dans la courbe une particularité qui ne rend pas du tout satisfaisante cette interprétation.

La seconde substance que nous avons étudiée est le bromure de phénouthiazine (quinone), préparé selon le procédé Kehrmann.

Nous pouvons schématiquement représenter la réaction sous cette forme :



En oxydant encore cette semiquinone on devrait obtenir:




dans ce cas l'anion X est constitué par l'ion négatif Br_3^- .

Le dernier produit de la réaction (qui se trouve avec un excès de Br) ne devrait pas être paramagnétique dans cette forme d'après la littérature.

Au contraire, une analyse au spectrographe E.P.R. de la substance a montré un fort et inattendu paramagnétisme.

Ce paramagnétisme serait justifiable si l'on admettait, pour le produit final, à côté de la formule de structure, une formule du type suivant:



Ce dernier dérivé présente, en solution de H_2SO_4 concentré ($d = 1,84$) la structure hyperfine qui se trouve dans la figure 1b.

On remarquera que pendant la dilution du perbromure dans H_2SO_4 , se développe du Br qui est remplacé par le H_2SO_4 dans la formation du sel du quinone.

La structure hyperfine de cette substance se soustrait à notre avis, à une interprétation immédiate, — ne fût-elle que partielle.

Toutefois d'autres recherches pourront fournir des informations intéressantes sur la configuration de la molécule.

Il faut noter que le perbromure de phenothiazine est le produit de base d'une vaste gamme de colorants, parmi lesquels on trouve notamment, le bleu de méthylène et le violet de Lauth.

Les auteurs désirent vivement remercier M. le professeur L. Giulotto pour son aide efficace et pour ses conseils très utiles; ils tiennent également à remercier le Consiglio Nazionale delle Ricerche pour son aide financière.

BIBLIOGRAPHIE

1. KEHRMANN, *Ber.*, 48, 325 (1915).
 2. CURTI, R., private communication.
 3. CAMAGNI, P. et G. LANZI, *Rend. 43^o Congr. Naz. di Fisica Padova-Venezia*, XII, 4 (1957).
-