

# Gefässpflanzen

Autor(en): **Jäggi, J. / Schröter, C.**

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse**

Band (Jahr): **2 (1892)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Fortschritte**  
der  
**schweizerischen Floristik**  
im Jahr 1891.

---

Beiträge für diese Rubrik, die in den folgenden Jahrgängen der « Berichte » fortgesetzt werden soll, werden erbeten : Für die Gefässpflanzen an die Herren Prof. J. Jäggi und Prof. Dr. C. Schröter in Zürich ; für die Moose, Flechten, Algen, Pilze an Dr. Ed. Fischer in Bern.

**A. GEFÄSSPFLANZEN**

Zusammengestellt von Prof. J. Jäggi und Prof. Dr. C. Schröter.

Diese Zusammenstellung enthält :

1. Im Gebiet vorkommende neu unterschiedene Sippen\* ; durch **fetten Druck** hervorgehoben.
2. Für das Gebiet neue Sippen ; mit **GROSSEN BUCHSTABEN** gedruckt.
3. Neue Fundorte seltenerer Sippen.
4. Florula adventiva, nach folgenden Kategorien :
  - a) Neue Standorte verschleppter Schweizerpflanzen.
  - b) Neue Standorte früher eingeschleppter Arten.
  - c) Neue eingeschleppte Arten.
5. Notizen aus der Litteratur über Fortschritte in der systematischen Umgrenzung schwieriger Sippen.

\* Wir gebrauchen dieses Wort im Nägelischen Sinne für systematische Einheiten jeglichen Ranges, hier also für Arten : Unterarten, Varietäten, Formen und Bastarte.

## 6. Originalmittheilungen über dasselbe Thema.

Als Quellen dienten uns :

COTTET et CASTELLA. Guide du botaniste dans le canton de Fribourg. Frib. 1891 (Fl. Frib.).

GILLOT. Herborisations dans le Jura central, Val de Travers, Creux du Van, Tourbières des Ponts et de la Brévine. Lyon 1891 (Gillot, Herbor.).

Rob. KELLER. Flora von Winterthur, Wint. 1891 (Fl. Wint.).

Rob. KELLER. Beiträge zur schweizerischen Phanerogamenflora, III. Die wilden Rosen der Leventina. Bot. Centralblatt. Band XLVII, Cassel, 1891 (Keller, Beitr.).

JÄGGI. Referat über « Neue wichtigere Beobachtungen aus der Flora d. Schweiz » in : Berichte der deutschen botan. Gesellschaft. Band VIII (erschienen 1891, citirt : Jäggi Ber.)\*

Ferner schriftliche und mündliche Mittheilungen der Herren :

*H. Binz*, cand. phil. aus Basel, in Zürich ;

*O. Appel*, cand. Pharm., in Breslau ;

*O. Buser*, Chemiker, Zürich ;

*Dr. Cornaz*, Neuchâtel ;

*F. Käser*, Lehrer in Zürich ;

*H. Lüscher* in Zofingen ;

*Dr. Mæhrten*, Orbe ;

*Prof. Dr. Hans Schinz*, Zürich ;

*Dr. Wilczek* aus Freiburg, bis 1892 in Zürich, und endlich eigene Beobachtungen der Referenten (J. u. Schr.).

Als Grundlagen, hinter welche nicht zurückgegangen wird, figuriren : *Gremli*, Excursionsflora d. Schweiz, VI Aufl. 1889, und *Gremli*, Neue Beiträge z. Flora d. Schweiz, V. Heft. 1890.

Auch in Anordnung u. Nomenclatur schliessen wir uns möglichst an *Gremli's* Excursionsflora an.

*Thalictrum* : Flor. Frib. giebt an, mit ausführlichen

\* Auch aus dem 1890<sup>er</sup> erschienenen Bericht haben wir einiges entnommen.

Diagnosen : *Th. collinum* Wallr., *majus* Jacq., *odoratum* Gren, Godr., *calcareum* Jord., *Laggeri* Jord.

— *alpinum* L. Val Tuoi, südl. vom Piz Buin, U. Engadin (Käser).

— *saxatile* DC. (*calcareum* Jord) soll nach Gillot (siehe Referate) einen nicht kriechenden Wurzelstock besitzen, ebenso *majus* Jacq., während *Thalictrum minus* kriecht.

RANUNCULUS RECTUS Boreau (v. Nyman mit *acris* vereinigt) unterscheidet sich von *acris* durch anliegende Haare am Stengel, tief zertheilte, unterseits sammtige Blätter, u. langen spitzen leicht gebogenen Fruchtschnabel). Combes 1700<sup>m</sup>, (Fl. Frib.).

— *spretus* Jord. (nach Nyman zu *nemorosus* DC. gehörig). Trockene Bergmatten (Fl. Frib.).

— *acris* L.  $\beta$ . *multifidius* DC. Evolenaz (Schr.).

— *flammula* L., var. *radicans* Nolte. Herblingenthal (Appel).

*Myosurus minimus* L. Middel (Fl. Frib.), Würenlingen, Ct. Aargau (Boll, bestätigt v. Lüscher).

*Aquilegia alpina* L. Köpfe ob der Alp Gamsli, Weisstannenthal (Wilczek).

*Aconitum Stoerkeanum* Rchb. 3 Stand. im Kt. Freib. (Fl. Frib.).

*Nuphar pumilum* Schmidt. Kämmoos-Teich zwischen Bubikon u. Rüti; Ct. Zürich (Dr. C. Hegetschweiler in Jäggi, Berichte).

NASTURTIUM RIPARIUM Gremli  $\times$  AMPHIBIUM R. Br., zwischen den Eltern am Seeufer bei Intra. Grenzpflanze! (Wilczek).

*Barbarea stricta*. Andr. Liebloser Thal, beim Försterhaus an einem Graben! (Kt. Schaffh.) Diese von Gremli als für die Schweiz noch nicht sicher nachgewiesen betrachtete Art findet sich am genannten Standorte mit *B. vulgaris* R. Br., von der sie sich leicht durch die kleineren hellen Blüten, die auch früher sich entfalten als die der *B. vulgaris*, unterscheidet (Appel).

— *intermedia* Bor. Cases d'Allières (Fl. Frib.).

*Dentaria digitata*  $\times$  *polyphylla* (Killiasü Brügger). Mollis leg. Marti, Bauma leg. Wolfensberger (in Jäggi Bericht).

*Brassica nigra* Koch. Umgegend v. Freiburg, Saanethal, Gruyère, Charmey, häufig und wohl spontan (Fl. Frib.).

*Sinapis arvensis* L., var. *orientalis* Murr. Abläntschen (Schr. u. Wilczek).

*Alyssum montanum* L. Sissacher-Fluh, (E. Steiger in Schneider, Fl. v. Basel. bestätigt von Binz).

*Draba muralis* L. Charmey, Romont, zwischen Kiemy u. Räsch (Fl. Frib.).

*Thlaspi Lereschii* Reuter. Nach Fl. Frib. von *alpestre* L. verschieden. Haute-Gruyère (Fl. Frib.), Noiraigues (Gillot, Herborisations).

IBERIS DECIPIENS Jord. (Diagn. espèc. nouv. I, p. 289), Noiraigues (Herb. Gillot), hoch, steif, Blüten kleiner als bei *amara*, oft violett, Fruchtrauben kurz, Blätter kleiner, schmaler, stärker gezähnt als bei *amara*. Einjährig, aber oft als Rosette überwinternd; nach einer Beobachtung von Grenier (Revue de la flore des monts Jura, p. 43) an der verwandten *J. panduriformis* sind die im ersten Jahr blühenden Exemplare einstenglig, die überwinterten vielstenglig (Gillot Herb.). Soll verschieden sein von *J. ceratophylla* Reut. (= *panduriformis*) und sich mehr der *amara* nähern als letztere.

VIOLA HIRTA L., VAR. VARIEGATA Rupp. Schweizerbild. Blüten lila, weissgestreift! Da andere Merkmale die Pflanze von der gewöhnlichen Form nicht unterscheiden, so dürfte sie wohl kaum mehr als eine Farbenspielart bedeuten (Appel). Auch an der Lägern ob Wettingen (Schr.).

— *mirabilis* × *Riviniana* Uchtr. *Uchtritziiana* (Richter.) Ob Bad Osterfingen (Vergl. Bericht der Vers. Schweiz. Naturf. zu Fribourg, 1892), (Appel).

— TRICOLOR VAR. VULGARIS Koch. Steinbruch im Mühlenthal (Schaffhausen). Blütenblätter grösser als an var. *arvensis* Mur, lebhaft gefärbt, Pflanzen gross, aber nicht ausdauernd (Appel).

— *hirta* × *odorata* (= *permita* Jord?). Nicht selten um Schaffhausen, besonders an den Abhängen des Randens (Appel).

- *collina* × *hirta* = *V. hybrida* Valde Lièvre. Schweizersbild (Appel).
- *stricta* Hornemann. Salvatore (J. u. Schr.). Vuissens, Murist (Fl. Frib.).
- *sciaphila* Koch. Morteys, Cases d'Allières (Fl. Frib.).
- Drosera obovata* M. K. Lac de Lussy (Fl. Frib.), Egelsee bei Maschwanden, Ct. Zürich (Dr. Hegetschweiler).
- Sagina nodosa* Fenzl. Wieder aufgefunden bei Wauwyl, Ct. Luzern (Lüscher).
- Stellaria palustris* Ehrh. (*glauca* With), marais de Vully (Fl. Frib.).
- *pallida* Piré (Boræana Jord.) Freiburg (Fl. Frib.).
- *Holostea* L. Winterthur (Fl. Wint.).
- DIANTHUS COLLIVAGUS Jord. (teste auctore!) hoch, vielblüthig, verzweigt, Blütenblätter ohne Fleck, mit sylvestris verwandt. Freiburger Alpen: Bonaudon, L'Urqui, Vudeche, Morteys, Merles (Fl. Frib.).
- Hypericum quadrangulum* × *tetrapterum*, Winterthur (Fl. Wint.).
- PERFORATUM × QUADRANGULUM Winterthur (Fl. Wint.).
- Acer opulifolium* Vill. Bataille bei Broc (Fl. Frib.).
- Cytisus capitatus* Grab. Pruntrut (Koby nach Lüscher).
- *Laburnum* L. subspec. **Alsingeri** (Vis.), Wettstein. Generoso, Salvatore, Magadino (Herb. Helv. teste Wettst.).
- *Laburnum* L. subspec. **Linnæanus** Wettst., Salève (Herb. Helv.).
- *alpinus* Mill., var. *pilosa* Wettst. Generoso. (= *Laburnum* L., var. *insubrica* Gaud., teste Wettst.).
- Ononis procurrens* Wallr., var. *mitis* Gremli. Pfl. mit nur wenigen oder ohne Dornen, nicht selten im Ct. Schaffh. (Appel).
- Var. *fallax* Gremli. Pfl. fast dornenlos, aufrecht oder aufstrebend, oft bis 1 m. hoch. Blättchen grösser, sehr stark drüsenhaarig. Kapf bei Thayngen (Appel).
- **Var. tenella**, Appel in Sched. Kleine aufrechte pyramidenförmig wachsende Form, dornig; Blüten hellroth, auffallend stark duftend (Appel).

*Astragalus leontinus* Wulfen, Im Sande des Avner Rheins bei Juf ca 1900 m. Für den Kanton Graubünden neu! verbindet das Walliser mit dem Tiroler Vorkommen (Schr. u. Stebler).

*Vicia tenuifolia* DC. Barga, (Kt. Schaffh.), auf Felsen (Appel).  
— *villosa* Rchb. Paradies (Appel).

*Trifolium pallescens* Schreb., Creux-dessus, Vudèche, Bonaudon (Fl. Frib., ob richtig?).

— *spadiceum* L., Gruyère, Porcheresse, Machereux, Berra, Gubloux (Fl. Frib.).

*Prunus spinosa* L., var. *serotina* Rchb., Lausanne, Favrat (Jäggi Ber.), Sihlhölzli bei Zürich (Wilczek).

*Rubus*. Die Fl. Wint. führt folgende bemerkenswerthe von Keller gesammelte und grösstentheils von Favrat revidirte Arten auf: *sulcatus* Vest., *Mercieri* Genev., *thyrsoides* Spec. collect., *candicans* Weihe, *thyrsanthus* Focke, *bifrons* Vest., *elatior* Focke, *macrostemon* Focke, *obtusangulus* Greml, *tumidus* Greml, *tomentosus* Borkh., *vestitus* W. et N., *conspicuus* P. J. Müller, *semivestitus* Favr., *teretiuseculus* Kalt., *suavifolius* Greml, *Radula* W. et N., *rudis* W. et N., *saltuum* Focke, *Weiheanus* Greml, *Güntheri* W. et N., *Villarsianus* Focke.

Bastarte: *tomentosus* × *bifrons*, *tomentosus* × *Radula*, *cæsius* × *Idaeus*, *cæsius* × *tomentosus*, *cæsius* × *thyrsanthus*, *cæsius* × *sulcatus*.

Die Fl. Frib. führt aus ihrem Gebiet 69 Arten, Varietäten und Bastarte von *Rubus* auf, alle mit Diagnosen versehen.

*Fragaria collina* × *elatior* = *sericea* Chr. Waldrand bei Osterfingen (Appel).

*Agrimonia odorata* Mill. Ziemlich gemein in der Gruyère (Fl. Frib.).

*Potentilla* siehe pag. 102.

*Rosa*. Die Fl. Wint. führt folgende, von R. Keller gesammelte bemerkenswerthe Vorkommnisse auf: *pomifera* Herm. (leg. Imhof), *agrestis* Savi, *tomentella* Lem., *trachyphylla* Rau, *glauca* Vill., *coriifolia* Fr.

— *rubiginosa* L., var. *Jenensis* = Max Schulze, Eglisau (Keller, in Jäggi Ber.).

In der Fl. Frib. werden 103 Arten, Varietäten, Formen und Bastarte von *Rosa* aufgeführt u. diagnosticirt. Neu sind :

- **stephanocarpa Rip.**  $\alpha$  **helvetica Cottet.** — **oreades Cottet.** — **rorida Cottet.** — **rhyncocarpa Rip.** — **hirtella Rip.** — **platyphylloides Déségl. et Rip.**

*Alchimilla* s. sub. Buser in den « Referaten », p. 128.

*Sorbus latifolia* Pers. (*Aria*  $\times$  *torminalis*). Um Zürich häufig (Zürichberg, Waid, Altberg, Uto u. Albis, O. Buser). Chauxmont (Sire u. Tripet nach Lüscher).

— **ARIOIDES.** Michalet (Exs. jur. II, 76, nach Godron ex. Nyman ein Bastard). Allières, Albeuve (Fl. Frib.).

— *Hostii* Tausch (*tomentosa* auct., *hybrida* Mich. *Aria*  $\times$  *Chamaespilus* ?). Rochers de Travas, Nontanettes, Arête de Sador (Fl. Frib.).

*Epilobium.* Die Fl. Wint. bringt folgende v. Siegfried gesammelte, von Haussknecht revidirte seltenere Arten u. Bastarte. *Lamyi* Schultz, *obscurum* Schreb., *parviflorum*  $\times$  *roseum*, *superparviflorum*  $\times$  *roseum*, *parviflorum*  $\times$  *montanum*, *adnatum*  $\times$  *Lamyi*, *Lamyi*  $\times$  *parviflorum*, *Lamyi*  $\times$  *montanum*, *obscurum*  $\times$  *montanum*, *montanum*  $\times$  *parviflorum*.

*Isnardia palustris* L. Seedorfsee, marais de Cheyres (Fl. Frib.).

*Circæa intermedia* Ehrh. Uto b. Zürich (Wilczek).

*Montia minor* Gmel. Dintikon, Ct. Aargau, in Roggenäckern, nicht Drütikon, wie es in Gremlı Exc. fl. VI, p. 191 heisst (Lüscher).

*Herniaria glabra* L. Klein Döttingen, Aargau (Lüscher).

**SEMPERVIVUM VERLOTI** Jord. Morteys (Fl. Frib.).

*Sedum Fabaria* Koch, tritt im Jura nach Genti (in Gillot, Herboris.), in einer forma *jurana* auf, verschieden von der Pflanze der Vogesen.

*Saxifraga Hirculus* L. Marais des Ponts, Tourbières de Semsales, Lac de Lussy (Fl. Frib.).

— *tenera* Suter der Fl. Frib., ist nach Engler, Monogr. Saxifr. synonym mit *varians*.



— **androsacea** × **Seguieri** Avers (Schröter).

*Helosciadium nodiflorum* Koch. Promasens, Rue (Fl. Frib.).

*Peucedanum austriacum* Koch. Zahlreiche Standorte in d. Freibg. Alpen (Fl. Frib.).

*Heracleum montanum* Schleicher ist nach Gillot (Herbor) eine Varietät von *Sphondylium*. Er beobachtete am Creux du Van zahlreiche Uebergänge zwischen beiden. Die Vermuthung eines hybriden Ursprungs (*alpinum* × *Sphondylium*) scheint ausgeschlossen, da *alpinum* am Creux du Van völlig fehlt.

*Torilis infesta* Hoffmann (*helvetica* Gmel.). Champ de la Broye (Fl. Frib.).

*Anthriscus nitida* Garcke., Passwang (Lüscher).

*Asperula cynanchica*, var. *arenicola* Reuter. Ob Bad Osterfingen, Sandgrube bei Thayngen (Appel).

*Valeriana tripteris* L., var. *intermedia* Hoppe. Mit ungetheilten Stengelblättern, aber sicher kein Bastard *tripteris* × *montana*! Gäsi bei Weesen (Jäggi in Ber.).

*Knautia longifolia* Koch. Lieux tourbeux près Semsales (Fl. Frib.).

*Scabiosa Columbaria* L., var. *pachyphylla* Gaud. Ménières (Fl. Frib.).

*Erigeron angulosus* Gaud. An der Thur bei Flaach, neu für den Canton Zürich (Jäggi).

— *alpinus* L. β *intermedius* Schl. Dent de Ruth, Gastlosen-kette (Schröter und Wilczek), Avers (Schröter).

*Filago apiculata* Sm. Balliswyl (Fl. Frib.).

*Senecio vulgaris* × *silvaticus*. Eschenberg bei Winterthur (Fl. Wint.)

*Cirsium arvense* × *lanceolatum*, *lanceolatum* × *oleraceum*, *nemorale* × *palustre* und *arvense* × *palustre*. Sämmtlich um Winterthur (Fl. Wint.).

*Carduus Brunneri* Al. Br. (*Gentyanus* Gillot), *deflorato* × *nuttans*. Beim Dorfe Bayard (Neuchateller Jura), leg. Gillot (Herborisations).

• — *defloratus* × *Personata* (*Bambergeri* Hausm.) Zwischen Jaun und Abläntschen (Schröter und Wilczek), Avers (Schröter).

— *crispus* b. *multiflorus* Gaud. Lausanne (Favrat in Jäggi, Ber.).

*Lappa tomentosa* Lam. Bei Winterthur (Fl. Wint.).

— *nemorosa* Körnicke — nach Gillot (Herbor.), eine Standortsform von *L. officinalis*, wie *pubens* Bor. von *minor*. Die Köpfchen leicht spinnwebig, bald traubig, bald ebensträussig.

*Centaurea Jacea* L. Eine Annäherungs-Form an die var. *Gaudini* Reut. auf Wiesen in Abläntschen, Ct. Bern (Schröter und Wilczek).

*Thrinicia hirta* Roth. Marais de Rue, de Prez (Fl. Frib.).

*Leontodon crispus* Vill. Morteys, Oussannaz, Keisereck (Fl. Frib.). Ob richtig?

— *Pilosella* L. subsp. *virescens* N. P. Schweizersbild, Ct. Schaffhausen (Appel).

— *Auricula* Lam. Subsp. *melaneilema* N. P. Mühlethal, Ct. Schaffhausen (Appel).

*Hieracium Zizianum* Tausch. Bei Weiach, Ct. Zürich (Wilczek).

— *chnoodes* Peter (*Hoppeanum* > *glaciale*), Avers (Käser, ex Peter in Jahrb. S. A. C., XXII, in Jäggi Ber.).

— *chloromelanum* Peter (*Hoppeanum* × *aurantiacum* × *Auricula*), Avers (wie voriges).

— *brachycomum* N. et P. (*furcatum* × *Auricula*), subsp. *apocladum* Peter. Avers (wie voriges!).

— *fuliginatum* Hut. und Gand. Albula, am Fuss der Cresta Mora (Lüscher teste Favrat).

— *bupleuroides* Gmel. Gigerwald hinter Vättis, Ct. St. Gallen (Wilczek).

— *gothicum* Fries. Zofingen (Lüscher) Gigerwald hinter Vättis (Wilczek), zwischen Albeuve und Montbovon (Fl. Frib.).

— *præcox* Schultz bip. Tössberg bei Winterthur (Fl. Wint.).

— *præcox* var. *cinerascens* Jord. Mehrere Standorte in Fl. Frib.

— *lycopifolium* Fröel. Mont-Vully, Chiètres (Fl. Frib.).

— *sabaudum* auct. Tour de la Molière (Fl. Frib.).

— *boreale* Fr. var. *racemosum* Hausm. Enge, Ct. Schaffhausen (Appel).

— *umbellatum* L. var. *coronopifolium* Bernh. Hohe Fluh, Ct. Schaffhausen (Appel).

— *squalidum* (Arv. Touv. Hier. des Alpes françaises 1888) = *murorum* L. × *humile* Jacq. — Creux-du-Van Genty (ex Gillot, Herb.).

*Phyteuma nigrum* Schmidt.

Wir erhielten Exemplare von dem einzigen Standort, an welchem diese Species aus der Schweiz angegeben wird (Jouxthal) durch die Güte des Herrn Vetter in Orbe, auf dessen Angabe sich diejenige in Gremli stützt; ferner durch Herrn Aubert stud. rer. nat. Dieselben gehören unseres Erachtens nicht zu *Phyteuma nigrum*, welches uns in sichern Exemplaren aus Böhmen (Carlsbad) vorlag, sondern zu *Phyteuma spicatum* var. *cærulescens* Cel. Die grundständigen Blätter sind stark- und doppelt gekerbt (nicht einfach und schwach); die stengelständigen lange nicht so stark keilförmig verschmälert wie bei *nigrum* und die Farbe ist nicht schwarzviolett. Die Behaarung der Staubfäden (siehe Gremli, Excurs. fl.), und die Runzelung der Krone (vergl. Grenier und Godron, Flore de France), geben keine trennenden Merkmale (vergl. Cel. Flora von Böhmen).

*Pirola uniflora* L. Höhen um Winterthur (Fl. Wint.).

— *media* Sw. Creux-du-Van, Genty, ex Bull. Soc. bot. de France, tome XXXVII, 1890. pag. 21-31.

*Vincetoxicum laxum* Bartl. Montbovon, Lessoc, Sciernes, Albeuve (Fl. Frib.).

*Pulmonaria officinalis* L. (foliis maculatis!). An der Thur zwischen Andelfingen und dem Rhein verbreitet (Schröter Jäggi und Wilczek).

*Scrofularia Balbisii* Hornem. Töss (Fl. Wint.).

— *Ehrharti* Stev. (NB. *Neesii* Wirtg. wird aus dem Gebiet nicht angegeben!) Zahlreiche Standorte aus Fl. Frib.

— *Hoppei* Koch. Vudèche, le pied du Moléson, col de Bonaudon (Fl. Frib., bisher nur aus dem Jura bekannt!).

*Linaria simplex* D. C. Tössfeld, Pfungen (Fl. Wint.).

*Veronica prostrata* L. Corbières (Fl. Frib.).

— *opaca* Fries. Attalens (Fl. Frib.).

*Melampyrum nemorosum* L. Lussy, route de Châtel-St.-Denis

à Jongny, entre Attalens et Palézieux, Pélerin (Fl. Frib.).  
*Euphrasia lutea* L. Am Irchel unter dem Wartgut häufig  
 (Fl. Wint.).

— *ericetorum* Jord. Im Tösssand bei Wülflingen (Fl. Wint.),  
 auf der Reinacher Heide bei Basel (Binz).

*Orobanche stigmatodes* Wimm. Auf *Centaurea Scabiosa* bei  
 Freiburg (Fl. Frib.).

— *cruenta* Bert. Auf *Genista tinctoria*. Grosse-Gite près de  
 Vuadens, Part-Dieu, Gibloux (Fl. Frib.).

— *Salviae* F. Schulz. Auf *Salvia glutinosa*. Châtelet (Fl.  
 Frib.).

— *flava* Mart. Auf *Petasites albus*. Bois des Marches, Rio-de-  
 Motélon (Fl. Frib.).

— *rubens* Wallr. Auf Luzerne. Freiburg, Bossonnens (Fl.  
 Frib.).

— *Columbariae* Gren. Godr., auf *Scabiosa Columbaria* und  
*Veronica montana*. Bonaudon-Dessus (Fl. Frib.).

*Galeopsis pubescens* Besser. Montbovon, la Madeleine (Fl.  
 Frib.).

— *speciosa* Mill. Elm, Ct. Glarus (Wilczek).

#### *Ajuga* :

Nach *Briquet* (Labiées des Alpes Maritimes, pag. 108) be-  
 ruht der einzige constante Unterschied zwischen *A. reptans*  
 und *genevensis* auf der An-oder Abwesenheit *oberirdischer be-*  
*blätterter* Ausläufer. Was als *A. reptans* var. *alpina* bezeichnet  
 wird, ist ein Gemisch, zusammengesetzt aus Exemplaren von  
*A. reptans* mit kurzen Ausläufern (blosse Standortsform!),  
 und aus Exemplaren v. *A. genevensis* mit ganzrandigen Blät-  
 tern (var. *arida* und var. *Nanti*.)

*Teucrium Scordium* L. Hettlinger-Ried gegen Henggart (Fl.  
 Wint.), Nöschikon, Ct. Zürich (Dr. Hauser), Oerlingen,  
 Ct. Zürich (Dr. L. Forrer).

*Pinguicula vulgaris* L. zerfällt nach Genty (in Gillot, Herb.),  
 in zwei Unterarten, var. **uliginosa** Genty, mit kleinen  
 Blüthen und birnförmiger Kapsel, die, am Grunde stark auf-  
 geblasen oben sich rasch in einen Schnabel verschmälert,  
 und var. **alpestris** Genty, Blüthen gross, oft so gross wie  
 die der *grandiflora*, Samen-Kapsel eikegelförmig.

- *neglecta* Lehm. Oerlikon (Jäggi), in Ber.). Einsiedeln (Wilczek, in Jäggi, Ber.).
- *Bremii* Heer. Oerlikon (Jäggi Dübendorf, Wallisellen, Hermikon, alles im Glatthal, Ct. Zürich (Meister; beides in Jäggi, Ber.).
- Utricularia intermedia* Hayne. Stadler-Ried bei Weiach, Ct. Zürich (Wilczek).
- Anagallistenella* L. Marais de la Biordaz, sous Attalens (Fl. Frib.).
- Primula elatior* × *officinalis* (media Peterm.) Beerenberg bei Wülflingen (Fl. Wint.). Bruchhalde, Schaaren bei Schaffhausen (Appel).
- Cortusa Matthioli* L. Votas ob Sta. Maria im Münsterthal (Ch. Lorez teste Dr. Cornaz).
- Samolus Valerandi* L. Güttingen, Ct. Thurgau. Ammann (†) im Herb. Kölliker, jetzt Herb. Helv.; neu aufgefunden v. Dr. H. Rehsteiner, 1885, also nicht, wie es in Mittheilungen des badischen botan. Vereins, 1891. Nro. 91-92, pag. 350 heisst. von E. Wilczek entdekt.
- Polycnemum majus* A. Br. Bei Pfungen (Fl. Wint.).
- Chenopodium rubrum* L. Avenches, Fribourg (Fl. Frib.).
- Rumex pulcher* L. Broc, Fribourg (Fl. Frib.).
- *Hydrolapathum* Huds. Fossés de la Broye, entre Domdier et St. Aubin, la Sauge, Morat (Fl. Frib.).
- *nemorosus* Schrad. Eschenberg, Breite bei Winterthur (Fl. Wint.).
- *crispus* × *conglomeratus*, *crispus* × *nemorosus*. Bei Winterthur (Fl. Wint.).
- **OBTUSIFOLIUS** × **CONGLOMERATUS** = **R. ABORTIVUS** Ruhmer, Stockerberg Ct. Schaffhausen (Appel).
- *obtusifolius* × *crispus* = *R. pratensis* M. K. Beim Storchchen, am Weg nach Neuhausen, Ct. Schaffhausen (Appel).
- Polygonum aviculare* L. var. *humifusum* Jord. Umgebung von Freiburg (Fl. Frib.).
- *viviparum* L. forma **rubriflora** Stallerberg, c. 2500 m. (Schröter).
- Buxus sempervirens* L. var. **MYRTIFOLIA** Loudon. Im Wald ob Oberbuchsiten Ct. Solothurn mitten unter der Normalform (Schröter).

- Euphorbia palustris* L. Mehrere Standorte im Ct. Freiburg (Fl. Frib.).
- Quercus Cerris* L. Abhänge des Monte Generoso gegen Val Muggio in Menge (Schröter).
- Ostrya carpinifolia* Scop. Ragatz, nach Bezirksförster Bächtold nicht angepflanzt (Wartmann u. Schlatter, Uebersicht etc., in Jäggi, Ber.).
- Alnus glutinosa* × *incana*. Am Tössufer bei Neftenbach (Fl. Wint.)
- *incana* DC. var. *sericea* Chr. Ausgeprägt bei Bremgarten (Herb. Haussknecht) (Appel).
- Salix aurita* × *purpurea* = *S. mutabilis* Schl. Bruchhalde, Ct. Schaffhausen (Appel).
- Alisma Plantago* L. var. *graminifolium* Ehrh. Bonfol (Lüscher); ausserdem nur noch im Bodenseeriet (Wartmann und Schlatter).
- Potamogeton Zizii* M. und K. Interlaken (Lüscher).
- *compressus* L. Lac des Jons bei Châtel-St.-Denis (Fl. Frib.). Nahe der Schaffhausergrenze bei Gottmadingen (Grenzpflanze) (Appel).
- Zannichellia palustris* L. var. *tenuis* Reut. Gruyères (Fl. Frib.).
- Najas minor* All. Marais de Morat, Vully, Biordaz, sous Attalens (Fl. Frib.).
- Sparganium affine* Schnitzl. Bei Semsales, Champoteys, Torfmoore des Ponts (Fl. Frib.).
- Orchis Traunsteineri* Sauter. Töss (Fl. Wint.).
- Nigritella angustifolia* Rich. var. **rubra** Wettstein (sub. *Gymnadenia* als Art; vergl. Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, Bd VII, 1889, seite 306-317). Unterscheidet sich vom Typus: durch den schon beim Beginn des Aufblühens langgestreckten Blütenstand, durch die rosenrothe (nicht schwarz purpurne) Blütenfarbe, und durch d. Form der Lippe: eiformig mit allmählig ausgeschweifter Spitze u. breitem dütenartig eingerolltem Grund, (beim Typus dreieckig, gegen d. Basis rasch verjüngt v. mässig eingerollt). Alp. Darlux b. Bergün (Peter, teste Wettst.). Albula (Prof. Dr. Schinz, teste Wettst.). Avers (Käser, teste Schröt), Davos (Schröter).

- Ophrys aranifera* × *muscifera* (*apiculata* Schmidt) kommt nicht, wie Keller in Fl. Wint. angiebt ob Dättlikon in Sumpfwiesen vor, sondern auf trockenen Bergwiesen ob dem Berghof am Südabhang des Irchels, 1875 und 1876 von Jäggi gefunden, seither nicht mehr.
- Malaxis paludosa* Sw. Wird in Fl. Wint. nach Steiner bei Neuburg nächst Winterthur angegeben. Zweifelhaft! — 3 Standorte bei Einsiedeln: Schnabelberg bei Bennau (Jäggi u. Schröter, 1890), Robloserried, mit *Juncus stygius*, *Trientalis*, *Betula nana* (dieselben 1889), Studenmoos (Jäggi und Rhiner noch 1889).
- Ornithogalum pyrenaicum* L. Bötzingen, Ct. Aargau (Geheeb und Lüscher), Sissach (Lüscher).
- Gagea minima* Schult. Kalfeserthal in der Nähe der Kapelle (Direktor Weller †) (Zweiter Standort für St.-Gallen-Appenzell).
- Allium Scorodoprasum* L. Magden, Sulz, Leidikon, Ritterhalden bei Mettau, alles Ct. Aargau (Lüscher).
- Muscari neglectum* Guss. Behringen, Trüllikon (Appel).
- Juncus diffusus* Hoppe (*effusus* × *glaucus*). Hallwylersee (Lüscher).
- *Tenageia* Ehrh. Am Ufer des Neuenburger-Sees bei Gletterens (Fl. Frib.).
- Luzula angustifolia* Garcke fol. *variegatis*. Zofingen (Lüscher).
- Cyperus longus* L. Sümpfe der Abtei von Sales, in der Gemeinde Granges und an den Ufern der Biordaz (Fl. Frib.).
- Rhynchospora fusca* Roem. und Schulth. Studenmoos im Sihlthal, 3 Stunden v. Einsiedeln (Jäggi und Rhiner). Am Linthkanal ob Schloss Grynau (Stebler und Schröter).
- Carex chordorrhiza* Ehrh. Champoteys, tourbières des Ponts et de Sâles (Fl. Frib.).
- *muricata* L. var. *Pairæi* F. Schultz. Besserstein (Lüscher, teste Appel). Freudenthal, Wutachthal, Enge alles Ct. Schaffhausen (Appel).
- *muricata* L. var. *Chaberti* F. Schultz. Zugerberg (Lüscher, teste Appel).
- *muricata* L., var. *Leersii* F. Schultz. = *C. divulsa* aut. helv. non Good. Schaarenwald, Rheinhard (Appel). Born, Ct. Solothurn (Lüscher, teste Appel).

- *mucronata* All. Alp. Tersol, Ct. St. Gallen (Wilczek).
- *depauperata* Good. Bois de Bonaudon, de Chenausannaz, la Tine, Liery (Fl. Frib.)
- *ericetorum* Poll. An mehreren Orten um Winterthur (Fl. Wint.).
- *refracta* Schk. (*tenax* Reut.). Monte Generoso, oberhalb der Alpe di Melano häufig (Schröter).
- *ampullacea* Good. var. *LATIFOLIA* Aschers. Wildegg, Ct. Aargau (Lüscher).
- *flava* L. var. *INTERMEDIA* Coss. et Germ. Oerlikon (Appel).
- *FLAVA* × *OEDERI*. Oerlikoner Ried (Zschokke und Appel).
- *FLAVA* × *HORNSCHUCHIANA* = *C. xanthocarpa* Degl. Oerlikon, Katzensee (Appel).
- *HORNSCHUCHIANA* × *LEPIDOCARPA* (*Leutzii* Kneucker) Wiesendanger Ried (Fl. Wint.). Katzensee (Appel).
- *HORNSCHUCHIANA* × *OEDERI* (Appeliana Zahn), Mauensee Ct. Luzern (Lüscher, teste Appel), Katzensee (Appel).
- *LONGIFOLIA* × *MONTANA*. Zofingen (Lüscher, teste Appel).
- *divulsa* Good! Gailingerberg! (Appel).
- *TURFOSA* *Fries*. Fribourg (Lagger in herb. hort. bot. Vratislav). Engesumpf Schaffhausen (Appel).
- *acuta* L. subsp. ***pseudaquaticus*** Appel, in D. bot. Monatssch., 1892.

Diese von mir als subsp. zu *b. acuta* gezogene Form, war allem Anschein nach schon Merklein bekannt, der in seinem Verzeichnisse der Gefässpflanzen des Cantons Schaffhausen in einer Fussnote pag. 62 sagt: *b. aquaticus* Whlbg auf Wiesen des Dörflinger Riedes, scheint mir noch nicht ganz sicher. Mit der nordischen *b. aquaticus* lässt sich unsere Pfl. nicht wohl vereinigen, da besonders die Merkmale der vegetativen Organe ganz den Typus der *b. acuta* zeigen. Charakterisirt ist *b. pseudaquaticus* durch ihren Habitus, ihre Aehrchen und ihre Schläuche: Sie wird bis mannshoch, trägt schmal aufrechte und an den Halm sich anschmiegende



Aehrchen, und besitzt kugelig aufgeblasene, fast oder ganz nervenlose Schläuche (Appel).

— MONTANA  $\times$  UMBROSA = *b. VIMARIENSIS* Hausskn. Zofingen (leg. Lüscher) (Appel).

— AMPULLACEA  $\times$  RIPARIA = *b. Beckmanniana* Figert, Zofingen (leg. Lüscher) (Appel).

*Digitaria filiformis* Kœl. Wartbad bei Winterthur (Fl. Wint.), Bruderholz bei Basel (Binz).

*Agrostis alpina* Scop. var. *flavescens*. Grat des Vanilnoir (Gruyère) bei 2200 m. (Schröter).

— *Schleicheri* Jord. Mythen (Eggler, 1867, in Herb. Helv.), Morteys, Nontanettes (Fl. Frib.), bei Weisstannen, 1000 m. und Alp Tersol, 1700 m. (Wilczek). Neu für den Ct. St. Gallen!

*Calamagrostis lanceolata* Roth, Seebach, Ct. Zürich (Wilczek).

*Halleriana* DC. Hat oft ein deutliches Rudiment der Aehrchenaxe; Granne nicht immer unter der Mitte der Spelze entspringend, sondern aus der Mitte oder über der Mitte (so namentlich an Exemplaren aus Bündten) (Schröter).

— *varia* Link, *B. acutiflora* DC. Oberbergfluh in der Gastlosenkette ob Abläntschen, 1700 m. (Schröter und Wilczek). ob Cresta im Avers (Stebler und Schröter).

— *arundinacea* Roth, forma *genuina*. Monte Generoso (Schröter).

— *arundinacea* Roth, *b. montana* Host, Monte Generoso ob Alpe di Melano (Schröter), Wandfluh in der Gastlosenkette, 1800 m. (Schröter und Wilczek).

*Sesleria caerulea* Ard. var. *flavescens*. Am Besserstein bei Villigen im Aargau (Stebler), beim Steingletscher am Sustenpass (Dr. C. Hegetschweiler).

— *caerulea* Ard. forma *interrupta* Schur. Uto (Heer im Herb. Helv.), S. Bernardino (Salis im Herb. Helv.), Axenstrasse (Schröter).

*Deschampsia caespitosa* Beauv., var. **flavescens** (verschieden von *altissima* Lam.). Fürstenalp bei Chur (Stebler und Schröter). Hundsruck ob Abläntschen, 1600 m. (Schröter und Wilczek). Am Fuss des Uto bei Zürich (Schröter).

*Aira caryophyllea* L. Ebenen der Broye, Aumont, Fétigny, Middel, Surpierre (Fl. Frib.).

*Poa sudetica* Hænke. Alp Foo. Neu für den Ct. St. Gallen!  
(Wilczek).

*Dactylis glomerata* L., var. **flavescens**. Monte Generoso  
(Schröter).

*Festuca alpina* Sut., Straffli im Avers, Marchzahn in der  
Gastlosenkette, Faulberg auf der Fürstenalp (Antheren  
etwas länger als 1 mm., aber Lamina 3 nervig (Stebler und  
Schröter), Rinderalp am Stanzerberg (Lamina 3 nervig,  
Spelzen schmal lineal, Antheren 1,5 mm. lang) leg. S.  
Amstad.

— *alpina* Sut., var. **intercedens** Hackel in litt., ausgege-  
ben in der 1892 erschienen 4. Lieferung der schweizerischen  
Gräsersammlung von Stebler und Schröter (Zwischenform  
zwischen *alpina* und *Halleri*; Antheren theilweise 1 1/2 mm.  
lang. Lamina theilweise 5 nervig!) Wandfluh in der  
Gastlosenkette bei 2100 m. (Stebler und Schröter), Cresta  
mora am Albula bei 2320 m. (Stebler und Schröter),  
Ochsenstock am Tödi bei 2200 m. (Schröter).

— *Halleri* All. forma *genuina*. Ob Alpe di Sella, Gotthard, am  
Weg zum Pizzo centrale, 2400 m. (Schröter), Piz Lan-  
guard (Stebler).

— *rupicaprina* Hack. Weissberg im Avers, auf Dolomit  
(Schröter), Bergünnerfurka, 2700 m. (Stebler und Schröter).

— *rupicaprina* Hack., var. *intermedia* Stebler und Schröter.  
(Zwischenform zwischen *rupicaprina* und *Halleri*-vergl.  
diese Berichte, Heft I, 1891, Seite 153). Bergünnerfurka  
neben *genuina*, 2700 m. (Stebler und Schröter).

— *ovina* L., var. *supina* Schur *fructifera*. Monte Generoso  
(Schröter); *vivipara* Hack. Canicül im Ferrerathal (Stebler  
und Schröter), — Sub-Var. *grandiflora* Hack. Pilatus  
(Lüscher).

— *ovina* L., var. *capillata* Lam., Seedorf, Freiburg, Marais  
de Gourze, Vaud (Lüscher).

— *ovina* L., var. *duriuscula*, subvar. *crassifolia* Hack., Zer-  
matt (Schröter), Mauremont, Vaud, auf Jurakalk (Favrat),  
Vanilnoir, Gruyères (Schröter), Marchzahn und Wandfluh  
in der Gastlosenkette, 1994 m. auf Dolomit (Stebler und  
Schröter), — subvar. *genuina*, forma *longifolia* Thuill.

- Avers (Schröter und Stebler). — *trachyphylla* Hack. Ponte im Engadin (Stebler).
- *heterophylla* Lam. Lausanne, Ecublens, Zofingen (Lüscher). Häufig bei Gandria am Luganersee (Stebler und Schröter).
- *violacea* Gaud., var. *nigricans* Schl. Monte Generoso, 1500 m. (Schröter). Wandfluh in der Gastlosenkette (Schröter und Wilczek), Kühalpthal, Sertig (Lüscher). Iuf im Avers (Stebler und Schröter).
- *pumila* Chaix, var. *genuina* Hack., aber mit subconfluenten Scleremchymbündeln. Vanilnoir, 2200 m. (Schröter).
- *pumila* Chaix, var. *genuina* Hack., subv. **glaucescens** Stebler und Schröter). Hat die glauken Blätter der var. *rigidor* aber gar nicht oder kaum zusammenfließende Scleremchymbündel. Albula (Stebler und Schröter).
- *rubra* L., var. *genuina*, subvar. *barbata* Hack. Im Sande des Avner Rheines bei Juppä, 1900 m. (Stebler und Schröter).
- *loliacea* Huds. (*F. pratensis* × *Lolium perenne*). Wöschnau und Erlinsbach bei Aarau (O. Buser).
- Bromus asper* Murr. Im Berner Oberland selten, z. B. Abendberg bei Interlaken; dagegen ist *Br. ramosus* Huds. dort verbreitet (Lüscher).
- *ramosus* Huds. Käferhölzli bei Zürich (Wilczek). Bois de Boulère bei Bulle, bei Jaun (Schröter und Wilczek). Wangenthal und Neunkirch, Ct. Schaffhausen (Wilczek).
- Gaudinia fragilis* Beauv. Beim Schloss Middes (Fl. Frib.).
- Agropyrum glaucum* R. Sch. Villarimbaud (Fl. Frib.).
- Hordeum secalinum* Schreb. Lully, Estavayer, Morens (Fl. Frib.).
- Pinus Cembra* L. Félesinaz, Gobettaz, revers d'Ousannaz, Lappé, Morteys, Dent de Broc, les Combes de Gruyères, rochers des Bimmis (Fl. Frib.).
- Equisetum ramosum* Schl. (*ramosissimum* Desf.). Barrage, Stadt Freiburg, Granges-de-Mont (Fl. Frib.).

## FLORA ADVENTIVA

*Neue Standorte verschleppter Schweizerpflanzen.*

- Sisymbrium austriacum* Jacq. Stadt Freiburg, Villarbeney (Fl. Frib.).  
 — *Sinapistrum* Crantz. Orbe (Möhrlen). Am Rheinufer unterhalb Basel (Binz).  
*Eruca sativa* Lam. Hin und wieder subsontan als Gartenflüchtling am Ufer des Neuenburger Sees (Fl. Frib.).  
*Camelina microcarpa* Crantz. Aarburg nach Lüscher (Gremli, Neue Beiträge, IV. S. 2) ist nur *sativa* (Lüscher). Umgegend von Freiburg, Romont (Fl. Frib.).  
*Cytisus Laburnum* L. Bei Bonfol verwildert; Muri, Ct. Aargau in grossen Exemplaren ebenfalls verwildert (Lüscher).  
*Asperula glauca* Bess. Oensingen in Menge, seit 1885 eingebürgert (Lüscher), Montbovon und Freiburg (Fl. Frib.).

*Neue Standorte früherer Einschleppungen.*

- Lepidium apekalum* Willd. Pürt im Avers, 1900 m. auf einer angeblühten Wiese (Schröter und Stebler). (Vergl. Ascher-son in Abhandlungen des botan. Vereins der Provinz Brandenburg. Br. XXXII, 1892, pag. 108-142.)  
 — *perfoliatum* L. Rechtes Rheinufer unterhalb Basel (Binz).  
 — *virginicum* L. Massenhaft auf dem rechten Rheinufer unterhalb Basel (Binz). Lausanne, Favrat (Jäggi, Ber.).  
*Capsella rubella* Reuter, Zofingen (Lüscher, ex Jäggi Ber.).  
*Brassica armoracioides* Czern. Klein Hüningen unterhalb Basel (Binz). Mühlehorn am Walensee (Jäggi).  
*Rapistrum perenne* All. Orbe (Möhrlen). Morges, Lausanne (Favrat).  
*Euclidium syriacum* R. Br. Vorbahnhof Zürich (J. u. Schr.).  
*Impatiens parviflora* DC. Winterthur selten (Fl. Wint.).  
*Vicia narbonensis* L. Orbe (Möhrlen).  
*Bifora radians* M. Bieb. Rechtes Rheinufer unterhalb, Basel (Binz).  
*Galinsoga parviflora* Cav., bei Brugg leg. Truog (in Jäggi, Ber.; nicht « Truog bei Brugg, » wie es dort fälschlich heisst!). Bahnhof Capolago (Schröter).

- Matricaria discoidea* DC. Glarus. Lehrer J. Wirz, 1884;  
Lüscher, 1890, in Masse und auch bei Riedern-Ennenda.  
*Carduus acanthoides* L. Orbe (Möhrlen).  
*Xanthium spinosum* L. Orbe (Möhrlen).  
*Lysimachia Ephemerum* L. Bei Eglisau am Rhein eingebürgert, seit 1887 beobachtet (Wilczek teste Jäggi).

*Neu eingeschleppte Arten.*

- Meconopsis cambrica* Vig. Val Travers (Jäggi), Grion ob Bex, gegen Col de Cheville (Binz), am Creux du Van angepflanzt!  
*Arabis aubrietioides* Boiss. Gartenmauer in Freiburg (Fl. Frib.).  
*Alcea ficifolia* L. Orbe (Möhrlen).  
*Trigonella Bessieriana* Ser. Orbe (Möhrlen).  
*Vicia bithynica* L. Orbe (Möhrlen).  
— *melanops* Sibth. Sm. Orbe (Möhrlen).  
— *grandiflora* Scop.  $\beta$ , *oblonga*, Neilreich (*sordida* W. K.), Buchberg b. Thal, Ct. St. Gallen (Wartmann und Schlatter, in Jäggi, Ber.).  
*Hacquetia Epipactis* DC. Mont-Aubert, Ct. Neuchâtel ex Favrat (Jäggi, Ber.).  
*Galium parisiense* L. Vorbahnhof Zürich (Wilczek).  
*Centaurea spinulosa* Rochel. Zwischen Yverdon und Grandson am See (leg. Cruchet, comm. Favrat).  
— *Barbeyana* Vetter = *diffusa*  $\times$  *maculosa*. Orbe (Möhrlen).  
— *Möhrleniana* Vetter = *orientalis*  $\times$  *Scabiosa* Orbe (Möhrlen).  
— *Aschersoniana* Vetter = *Barbeyana*  $\times$  *solstitialis*, Orbe (Möhrlen).  
— *Favratiana* Vetter = *orientalis*  $\times$  *Sadleriana*. Orbe (Möhrlen).  
*Crepis rhœadifolia* M. Bieb. Ependes, Vaud (Möhrlen).  
*Veronica multifida* L. Orbe (Möhrlen).  
*Polygonum Bellardi* All. Orbe (Möhrlen).  
*Euphorbia Engelmanni* Boiss. Bei Lintthal (Lüscher), als Unkraut im bot. Garten Genf (Lüscher), im Garten von Fröbel in Zürich (Jäggi). (Auch auf Isola Bella! Schröter.)

*Brachypodium distachyum* P. B. Ascona leg Dr. J. Scriba  
(Jäggi, Berichte).

*Lagurus ovatus* L. Auf Kies bei Freiburg (Fl. Frib.).

*Triticum elongatum* Host. Ependes, bei Orbe (Möhrlen).

— *cristatum* Schreb. Yverdon (Möhrlen).

— *desertorum* Fisch. Ependes, bei Orbe (Möhrlen).

NEUE FORMEN UND STANDORTE SCHWEIZ. POTENTILLEN  
von Hans Siegfried in Winterthur.

*Neue Formen :*

**Potentilla Trefferi** Siegfr. (1890.)

*Syn. : P. supervillosa* Crantz non auct. al.  $\times$  *P. aurea*  
L. non auct. — Vorauen-Richisau in den Glarneralpen c.  
950<sup>m</sup> s. m. (O. Hug). — Rigi-Staffel, Ct. Schwyz (Siegfr.).

**Potentilla Wolfii** Siegfr. (1890.)

*Syn. : P. nivea* L. non auct.  $\times$  *P. frigida* Villars non auct.  
al. — Illhorn im Einfischthal zwischen den Stammarten,  
Wallis c. 2700<sup>m</sup> s. m. (F. O. Wolf).

**Potentilla Paicheiana** Siegfr. (1891.)

*Syn. : P. super-Gaudini* Gremlı  $\times$  *P. pallida* Lehmann.  
Bei Saxon im Unter-Wallis (Ph. Paiche).

**Potentilla Käseri** Siegfr. (1891.)

*Syn. : P. leucopolitana* P. Müller in F. Schultz  $\times$  *P. opaca*  
L. non auct. — Bei Glattfelden, Ct. Zürich (J. Jäggi,  
F. Käser).

**Potentilla Schroeteri** Siegfr. (1891.)

*Syn. : P. Gaudini* Gremlı  $\times$  *P. villosa* Crantz non auct.  
al. — Bei Zermatt im Wallis (Stefan Biner, F. O. Wolf).

**Potentilla Candriani** Siegfr. (1891.)

*Syn. : P. superparviflora* Gaudin non Desf.  $\times$  *P. aurea*  
L. non auct. — Bei Samaden im Engadin zwischen den  
Stammarten c. 1800<sup>m</sup> s. m. (M. Candrian).

**Potentilla pseudo-rubens** Siegfr. (1891.) — Rog-  
genfluh über Oensingen im solothurner Jura, 999<sup>m</sup> s. m. (J.  
Jäggi, E. Wilczek). — Rafellenfluh über Oensingen c. 550<sup>m</sup>  
s. m. (C. Schröter).

*Potentilla Thuringiaca* Bernh. non C. A. Meyer var. **Jurasica** Siegfr. (1888). — Marchairuz, en dessus du chalet de la Saint-Georges, Jura vaudois c. 1200<sup>m</sup> s. m. (L. Favrat).

*Potentilla cinerea* Chaix non auct. al. **forma Genevensis** Siegfr. (1892) — Moraines des environs de Genève (Ph. Paiche).

*Potentilla rubens* Crantz non auct. al. var. **glandulosa** R. Keller non auct. al. — Am Ruessberg und ob Aesch bei Nefenbach, Ct. Zürich (Rob. Keller).

*Neue Standorte :*

*Potentilla Gremlii* Zimmeter — Zimm. Pot. europ. pag. 6, n° 11.

*Syn.* : *P. ascendens* Gremlii non auct. al. — *P. nemoralis* Gaudin non Nestler nec auct. al. — *P. reptans* L. × *P. erecta* L.

*forma aprica* Siegfr.

Seelhofenmoos bei Bern (F. v. Tavel) — Metmenstetten — Maschwanden, Ct. Zürich (C. Hegetschweiler, J. Jäggi, E. Wilczek) — Terrains marécageux sous Aire près Genève (Ph. Paiche).

*forma umbrosa* Siegfr.

An der Waldstrasse von Marthalen nach Andelfingen, Ct. Zürich (Siegfr.).

*Potentilla reptans* L. var. *microphylla* Tratt. non auct. al. — Zimm. Pot. europ. pag. 6, n° 16.

Nicht selten auf trockenem, steinigem Boden im Ct. Schaffhausen (O. Appel). — Waldränder beim Bruderhaus über Winterthur (Siegfr.) — Am Calanda über Haldenstein c. 1000<sup>m</sup> s. m., Bünden (E. Wilczek).

*Potentilla polyodonta* Borbas — Zimm. Pot. europ. pag. 9, n° 64.

*Syn.* : *P. canescens* Gremlii non Besser nec Tenore et auct. al. — Im Steinbruch Fäsenstaub bei Schaffhausen (O. Appel).

*Potentilla praecoax* F. Schultz — Zimm. Pot. europ. pag. 11, n° 75. — Strassenabhänge zwischen Neuhausen und Behringen, Ct. Schaffhausen (O. Appel).

*Potentilla Cornazi* R. Buser — Zimm. Pot. europ. suppl. I, pag. 23, n° 89 a.

*Syn.* : *P. pseudo-argentea* Blocki var. *Cornazi* Siegfr. (1891). — Vallée de Munster (Val Mustair) : sur la rive gauche du Ramm le long des chemins, de Sainte-Marie jusqu'à 4 kilom. environ plus bas que Tauffers (Grisons et Tyrol). Sur le schiste de Casanna. Alt. : 1388 -- c. 4180<sup>m</sup> s.m. (Ed. Cornaz).

*Potentilla tenuiloba* Jordan — Zimm. Pot. europ. pag. 43, n° 92. — Bei Bovernier, Unter-Wallis (F. O. Wolf).

*Potentilla grandiceps* Zimmeter — Zimm. Pot. europ. suppl. I, pag. 25, n° 93 a. — Auf alten Mauern bei Dissentis, c. 1230<sup>m</sup> s. m., und von Curaglia bis Platta im Val Medels c. 1350<sup>m</sup> s. m. Bünden (O. Hug).

*Potentilla rubens*<sup>1</sup> Crantz non auct. al. — Zimm. Pot. europ. pag. 16, n° 112.

*Syn.* : *P. opaca* Koch *Syn. et auct. al. non L.* — Mühleberg über Andelfingen, Ct. Zürich (O. Hug, R. Keller, Siegfr.) — Bei Rohr, Geisel und anderwärts um Frauenfeld, Thurgau (O. Nägeli) — Bei Eschenz, Thurgau (C. Sulger-Buel) — Bei Stein <sup>a</sup>/Rh., Ct. Schaffhausen (C. Sulger-Buel).

*Potentilla serotina* Villars — Zimm. Pot. europ. pag. 18, n° 117.

*Syn.* : *P. verna forma gracilis* Vocke — *P. verna*  $\beta$  *incisa* Tausch — Am Stein in Baden, Aargau (O. Hug). — Près le Sépey sur Aigle, alpes vaudoises (A. Mermod). — Murs sur Vevey, Vaud (L. Favrat). — Bei Glattfelden und an der Strasse von Marthalen-Rheinau, Ct. Zürich (Siegfr.).

*Potentilla glandulifera* Krasan — Zimm. Pot. europ. pag. 18, n° 120.

*Syn.* : *P. glandulosa* Krasan non Lindley nec R. Keller — Bei Ellikon am Rhein und unterhalb Alten gegen Ellikon, Ct. Zürich (R. Keller). — Vallon de Geuroz sur Vernayaz c. 700<sup>m</sup>

<sup>1</sup> Die zu den « Chrysanthae » gehörige *Pot. rubens* Crantz mit 7-9 zähligen Wurzelblättern und wagrecht abstehender, langer, weisser Behaarung ist bis jetzt nur für die Kantone Schaffhausen, Basel, Thurgau und Zürich mit Sicherheit nachgewiesen — Südlichste Grenze Winterthur.



s. m., Bas-Valais (E. Wilczek). — Pelouse sèche, graveleuse sous Lausanne, occid. (L. Favrat). — A la station de Chexbres, Vaud (L. Favrat). — Près le Sépey sur Aigle, alpes vaudaises (A. Mermod).

*Potentilla longifrons* Borbas — Zimm. Pot. europ. pag. 18, n° 121.

*Syn.* : *P. longifolia* Borbas non Willd. — Unterhalb Alten, Ct. Zürich (R. Keller). — Bei Basel (A. Roesly). — Aux bords du Rhône et dans les environs de Veyrier près Genève (Ph. Paiche). — Sonnige, dürre Abhänge bei Glattfelden-Eglisau, Ct. Zürich (Siegfr.).

*Potentilla aestiva* Haller fil. — Zimm. Pot. europ. pag. 19, n° 122. — Terrains sablonneux sous Veyrier près Genève (Ph. Paiche). — Felsige Orte am Stein in Baden, Aargau (O. Hug). — Auf alten Mauern bei Neuhausen, Ct. Schaffhausen (O. Appel). — In einer Kiesgrube zw. Wiesendangen — Sulz, Ct. Zürich (F. Käser). — Felsige Abhänge der Hohfluh über Schaffhausen (Siegfr.). Auf alten Mauern in Seglingen bei Eglisau, Ct. Zürich (Siegfr.).

*Potentilla autumnalis* Opiz — Zimm. Pot. europ. pag. 19, n° 123. — Am Strassenbord beim Storchen über Schaffhausen (Schalch, Siegfr.).

*Potentilla Amansiana* F. Schultz. — Zimm. Pot. europ. pag. 19, n° 124.

*Syn.* : *P. Chaubardiana* Timbal-Lagr. — *P. verna* var. *grandiflora* Vocke — *P. rubens* St. Amans non auct. al. — Auf Moosboden der Fichtenbestände am Risibuck über Eglisau, Ct. Zürich (Siegfr.).

*Potentilla Vitodurensis* Siegfr. — Zimm. Pot. europ. pag. 19, n° 126. — Am Strassenbord zw. Hard und Neftenbach, Ct. Zürich (Siegfr.).

*Potentilla albescens* Opiz — Zimm. Pot. europ., pag. 19, n° 127. — Weinberg-Mauern im Fährli-Leh bei Wettingen, Aargau (F. Käser). — Strassenbord von Marthalen nach Rheinau, Ct. Zürich (O. Hug). — Sonnige Abhänge des Risibuck über Eglisau, Ct. Zürich (Siegfr.).

*Potentilla Siegfriedii* Zimmeter — Zimm. Pot. europ. suppl. I, pag. 32, n° 121 a. — Wegbord zwischen der Landstrasse u.

der Rothfärberei Neftenbach, Ct. Zürich (Siegfr.).

*Potentilla explanata* Zimmeter — Zimm. Pot. europ. pag. 20, n° 132.

*Syn.* : *P. prostrata* Gremlı non auct. al. — Trockene, sandige Abhänge bei obern Sägemühle in Eschenz, Thurgau (C. Sulger-Buel).

*Potentilla Turicensis* Siegfr. — Zimm. Pot. europ. pag. 20, n° 133. — Am Abstieg vom Rossberg nach Bad Osterfingen, Ct. Schaffhausen (O. Appel). — Près le Sépey sur Aigle, alpes vaudoises (A. Mermod).

*Potentilla opacata* Jordan — Zimm. Pot. europ., pag. 20, n° 135. — Nicht selten an Wegen und auf Mauern der Reb-  
gelände bei Genf (R. Buser, Ph. Paiche).

*Potentilla Jurana* Reuter — Zimm. Pot. europ., pag. 22, n° 144.

*Syn.* : *P. villosa* Crantz non auct. al.  $\times$  *P. opaca* L. non auct. — Rochers de la Dent de Ruth, c. 1800<sup>m</sup> s. m., Ct. de Fribourg (E. Wilczek). — Pâturages des alpes de Morcles, Vaud (A. Mermod). — Marchairuz, Jura vaudois, en-dessus du chalet de la St-Georges c. 1200<sup>m</sup> s. m. (L. Favrat).

*Potentilla alpina* Willkomm — Zimm. Pot. europ. pag. 24, n° 158.

*Syn.* : *P. aurea* L. non auct. var. *alpina* Willk. — *P. aurea* L. non auct.  $\beta$  *minor* Lehmann.

An den Randseen bei Cresta im Val Avers, Bünden (O. Hug). — Am Piz Padella über Samaden im Engadin c. 2300 s. m. (M. Candrian). — Auf Felsblöcken beim St-Gotthard-Hospiz c. 2100<sup>m</sup> s. m. (Siegfr.).

*Potentilla subternata* Brügger — Zimm. Pot. europ. pag. 25, n° 164 et suppl. I, pag. 35.

*Syn.* : *P. alpestris*  $\times$  *minima* Brügger — *P. ternata* Cat. hort. bot. Turic. non C. Koch — *P. villosa* Crantz non auct. al.  $\times$  *P. dubia* Crantz non Suter — Am Piz Padella über Samaden im Engadin zwischen den Stammarten c. 2000<sup>m</sup> s. m. (M. Candrian).

*Potentilla dubia* Crantz non Suter — Zimm. Pot. europ. pag. 25, n° 163.

*Syn.* : *P. minima* Haller fil. non auct. al. — *P. Brauneana*

Hoppe — Am Piz Padella über Samaden im Engadin c. 2000<sup>m</sup> s. m. (M. Candrian).

*Potentilla verna* L. non auct. — Zimm. Pot. europ. pag. 25, n° 165.

*Syn.* : *P. rubens* Vill. non All. nec Crantz et auct. al. — *P. aurea firma* Gaudin — *P. Sabauda* D. C. — *P. Salisburgensis depressa* Tratt. — *P. maculata* var. *firma* Lehm. — *P. alpestris* a. *firma* Koch Syn. — *P. affinis* Host — Ueber Compatsch im Val Samnaun, Bündneralpen (F. Käser). — Am Piz Padella über Samaden im Engadin c. 2000<sup>m</sup> s. m. (M. Candrian).

*Potentilla obtusifolia* Schleicher herb. — Zimm. Pot. europ. suppl. I pag. 35, n° 165.

*Syn.* : *P. verna* L. non auct. forma — In der Umgebung von Samaden im Engadin c. 1800<sup>m</sup> s. m. (M. Candrian).

*Potentilla villosa* Crantz non auct. al. — Zimm. Pot. europ. pag. 25, n° 166.

*Syl.* : *P. aurea crocea* Gaudin — *P. maculata* Pourr. non Gilib. — *P. maculata* var. *gracilior* Lehm. — *P. alpestris* Haller fil. — *P. Salisburgensis* Hänke — Sommet du Col de Jaman, alpes vaudoises c. 1500<sup>m</sup> s. m. (L. Favrat). — Zwischen Vorauen und Richisau, Glarneralpen c. 950<sup>m</sup> s. m. (O. Hug).

*Potentilla grandiflora* L. non auct. var. *minor* Gaudin — An der Gotthardstrasse über Airolo, Tessin (O. Hug). — Ueber Cresta im Val Avers, Bünden c. 1990<sup>m</sup> s. m. (O. Hug)

*Potentilla Peyritschii* Zimmerman — Berichte d. naturwiss. medicin. Vereins in Innsbruck XIX Jahrg. Innsbruck, 1891, pag. 37.

*Syn.* : *P. aurea* L.  $\times$  *grandiflora* L. — Zimm. Pot. europ. suppl. I pag. 35, n° 173.

a) *P. superaurea* L. non auct.  $\times$  *P. grandiflora* L. non auct.

b) *P. supergrandiflora* L. non auct.  $\times$  *P. aurea* L. non auct. — Beide Formen am Piz Padella über Samaden im Engadin zwischen den Eltern c. 2000<sup>m</sup> s. m. (M. Candrian).

*Potentilla frigida* Villars non auct. al. — Zimm. Pot. europ. pag. 27, n° 177.

*Syn.* : *P. glacialis* Haller fil. non Seringe — *P. Helvetica* Schleicher — *P. Norvegica* All. non L. — Gipfel des Schiahorn bei Davos, Bünden c. 2700<sup>m</sup> s. m., Dolomit (C. Schröter).

*Potentilla Valesiaca* Huet — Zimm. Pot. europ. pag. 27, n° 180.

*Syn.* : *P. frigida* Vill. non auct. al.  $\times$  *P. grandiflora* L. non auct. — Sehr selten an Felsabhängen über dem Bistinenpass — Simplon im Ober-Wallis zwischen den Stammarten c. 2600<sup>m</sup> s. m. (F. O. Wolf).

*Potentilla nivea* L. non auct. — Zimm. Pot. europ. pag. 28 n° 182. — Piz Valmatruga im Val Samnaun, Bünden c. 2770<sup>m</sup> s. m. (F. Käser). — Gipfel des Cucal nair (Guggernüll) ob Campsut im Val Avers, Bünden alt. : 2529<sup>m</sup> s. m., Triaskalk (C. Schröter).

*Potentilla micrantha* Ramond in D. C. — Zimm. Pot. europ. pag. 31, n° 210.

*Syn.* : *P. Fragaria*  $\beta$  *micrantha* Nestler — *P. Fragariastrum* var.  $\beta$  Schlosser und Vuk. — *P. breviscapa* Vest. — *P. Fragariastrum* Gussone non Ehrh. Auf dem Kapf über Thayngen, Ct. Schaffhausen (O. Appel).

Die Diagnosen der neuen Formen werden später folgen.  
Winterthur im Januar 1892.

## B. MOOSE.

a. AUS AMANN : *Characterbilder aus der Moosflora des Davoser Gebietes*. Jahrbuch des S. A. C. Jahrgang XXVI.

### 1. Neu für die Schweiz :

*Bryum comense* Schp. Zwischen Davos Platz und Frauenkirch, am Eingang des Flüelathales b. Davos, an der Strasse.  
*Thuidium delicatulum genuinum*, an den Ufern des Davoser Landwassers.

*Dicranodontium circinatum* Wils. Davosergebiet, auf Gneissfelsen und-Blöcken.