

**Zeitschrift:** Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse

**Herausgeber:** Schweizerische Botanische Gesellschaft

**Band:** 10 (1900)

**Heft:** 10

**Rubrik:** Fortschritte der schweizerischen Floristik 1898 und 1899

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 08.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Fortschritte der schweizerischen Floristik 1898 und 1899.

---

### I. Myxomyceten.

Referent: Ed. Fischer.

**Martin, Ch. Ed.**, giebt in seiner Contribution à la flore mycologique suisse (Bulletin des Travaux de la Société botanique de Genève No. 9, Oct. 1899) ein Verzeichnis von Myxomyceten, die hauptsächlich in der Umgebung von Genf gesammelt sind. Da bisher erst sehr wenige Angaben über Vorkommen von Myxomyceten in der Schweiz vorliegen, geben wir hier die Liste der von Martin zusammengestellten Arten wieder, verweisen aber für die Standortsangaben auf die Publikation selber:

*Ceratiomyxa mucida* Schroet., *Physarum nutans* Pers., *Fuligo septica* Gmel., *Chondrioderma spumarioides* Fr., *Didymium difforme* Duby, *D. nigripes* Fr. und var. *xanthopus*, *Spumaria alba* (Bull.), *Stemonitis ferruginea* Ehrenb., *S. Smithii* M. Bride, *S. fusca* Roth, *Comatricha laxa* Rost., *C. Persoonii* Rost., *Amaurochaete atra* Rost., *Cribraria macrocarpa* Schrad., *C. aurantiaca* Schrad., *Tubulina fragiformis* DC., *T. cylindrica* DC., *Dictydiaethalium plumbeum* Rost., *Reticularia Lycoperdon* Bull., *Trichia favoginea* Pers., *T. contorta* Rost. v. *genuina*, *T. contorta* Rost. var. *corticola* nov. var.; *T. contorta* Rost. var. *Karstenii* (= *Hemitrichia Karstenii* Lister), *T. fallax* Pers., *Hemitrichia rubiformis* Lister, *H. clavata* Rost., *Arcyria albida* Pers., und var. *pomiformis*, *A. punicea* Pers., *A. incarnata* Pers., *Perichaena populina* Fr., *Dianema corticatum* Lister, *Lycogala miniatum* Pers.

### II. Pilze.

Referent: Ed. Fischer.

Da es an neueren und vollständigen Katalogen der schweizerischen Pilze fehlt, so kann hier nicht von einer bestimmten einheitlichen Grundlage ausgegangen werden; die folgende Auswahl ist daher natürlich eine oft etwas

willkürliche. Bei der Zusammenstellung des Verzeichnisses wurde folgende Litteratur benützt:

1. **Boltshauser, H.** Krankheiten unserer Kirschbäume. Mitteilungen der thurgauischen naturforschenden Gesellschaft. Heft XIII.
1. a **Boltshauser, H.** Blattflecken des Wallnussbaumes, verursacht durch *Ascochyta Juglandis* n. sp. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Bd. VIII, 1898, p. 263.
2. **Britzelmayr, M.** Revision der Diagnosen zu den von M. Britzelmayr aufgestellten Hymenomyceten-Arten. Botanisches Centralblatt. Bd. LXXIII, 1898, p. 129—135, 169—175, 203—210, Bd. LXXV, 1898, p. 163—178, Bd. LXXVII, 1899, p. 356—363, 395—402, 433—441, Bd. LXXX, 1899, p. 57—66.
3. **Corboz, F.** Flora Aclensis. Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. Sér. 4. Vol. XXXV, No. 131, p. 49 ff., 1899.
4. **Dufour, J.** Communication sur trois maladies de la vigne. Compte rendu des travaux présentés à la session de la Société helvétique des sciences naturelles réunie à Berne 1898 (Archives des sciences physiques et naturelles 1898), p. 104—106.
5. **Fischer, Ed.** Zwei für die Schweiz neue Pflanzen. Mitteilungen der bernischen naturforschenden Gesellschaft aus dem Jahre 1898, p. VIII—IX.
6. **Fischer, Ed.** Beiträge zur Kenntnis der schweizerischen Rostpilze. 4—7. Bulletin de l'herbier Boissier. T. VI. Janvier 1898.
7. **Fischer, Ed.** Beiträge zur Kenntnis der schweizerischen Rostpilze. 8—10. Ibid. T. VII. Mai 1899.
8. **Fischer, Ed.** Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen über Rostpilze. Bd. I, Heft 1 der Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz. Bern, 1898.
9. **Jacky, E.** Untersuchungen über einige schweizerische Rostpilze. Diese Berichte Heft IX.
10. **Jacky, E.** Die Compositen-bewohnenden Puccinien vom Typus der *Puccinia Hieracii* und deren Spezialisierung. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Bd. IX.

10. a **Lenticchia, A.** Seconda contribuzione alla micologia del M. Generoso. Bolletino della società botanica italiana 1899, p. 293—300.
11. **Martin, Ch. Ed.** Contribution à la flore mycologique suisse et plus spécialement genevoise. Bulletin des travaux de la Société botanique de Genève No. 9, Oct. 1899, p. 52—79.
12. **Maurizio, A.** Beiträge zur Biologie der Saprolegnieen. Mitteilungen des deutschen Fischerei-Vereins. Bd. VII, Heft 1, 1899.
13. **Rolland, L.** Excursions à Chamonix. Bulletin de la Société botanique de France. Tome XV, fasc. 2, 1899, p. 73—78.
14. **Schellenberg, H. C.** Über die Sklerotienkrankheit der Quitte. Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft 1899, p. 205 ff.
15. **Sydow, P.** Uredineen (Exsiccat).  
Ferner Beobachtungen und Mitteilungen der Herren **Dr. R. Thaxter** in Cambridge (Mass) (16), **Dr. F. v. Tavel** (17), des **Referenten** (18), der Herren **Prof. Dr. E. Wilczek** in Lausanne (19), Lehrer **O. Uhler** in Freidorf (Thurgau) (20), **A. Fischer**, Vikar in Ringgenberg (21), Pfarrer **G. v. Rütte** † in St. Beatenberg (22), **Prof. Dr. J. Dufour** in Lausanne (23).

### 1. Chytridinae.

*Synchytrium Drabae* R. Lüdi n. sp. aus der Gruppe *Chrysochytrium*. Auf *Draba aizoides*, Alpweiden an der Südseite des Bettlihornes (Oberwallis) 11. Aug. 1899 (18). Nach der Untersuchung von Hrn. R. Lüdi liegt hier eine von *S. aureum* verschiedene, neue Art vor, deren Charaktere folgende sind: Warzen vereinzelt bis krustenbildend, einfach bis reich zusammengesetzt. Nährzellen farblos. Dauersporen zu 1—2 (selten zu 3—4) in der Nährzelle, dieselbe nicht ausfüllend. Endospor graugelb, Exospor glatt, hellbraun; auf dem Exospor dunkle Inhaltsreste. Grösse der Dauersporen: 42—94  $\mu$  (meist 45 oder 75  $\mu$ ) Durchmesser.

*Woronina polycystis* Cornu auf Saprolegnieenrasen auf Fischen vom Zürcher Fischmarkt. (12)

*Rozella septigena* Cornu auf Saprolegnieenrasen auf Eiern der Seeforelle. Lindau, Zürich. (12)

2. Oomycetes.

- Cystopus Tragopogonis* Pers. auf *Xeranthemum inapertum* bei Siders, 5. Aug. 1899. (18)
- Cystopus candidus* Lév. auf *Sisymbrium officinale*. Aclens (Waadt). (3)
- Peronospora Ficariae* Tul. auf *Ranunculus glacialis*. Unweit vom Märjelensee (Wallis), 19. August 1899 (bestimmt von Alb. Eberhardt). (18)
- Peronospora* spec. auf *Solidago Virgaurea*. Bois de Bulloz bei Aclens (Waadt). (3)
- Apodya lactea* Cornu auf Hecht und Seeforelle, Zürcher Fischmarkt; auf Lachseiern, alte Fischbrutanstalt Zürich; Schlammprobe aus der Sihl beim Sihlhölzli. (12)
- Saprolegnia crustosa* Maurizio n. sp. auf *Anadonta mutabilis* im Zürichsee bei Wädensweil. (12)
- Saprolegnia hypogyna* var. *Corregoni* nov. var. auf Corregonuseiern. Hallwylersee (12), eine andere Var. (Var. II) in den städtischen Sandfiltern Zürich. (12)
- Saprolegnia dioica* de Bary auf Forelleneiern in einer Fischbrutanstalt in Menziken (Kt. Aargau). (12)

3. Hemiasci.

- Protomyces pachydermus* Thümen auf *Taraxacum officinale*. Zwischen Guarda und Ardez (Unter-Engadin), 16. Aug. 1898. (18)
- Protomyces Kreuthensis* Kühn auf *Crepis paludosa* Mönch, bei Adelboden, E. Juli 1898. (17)
- Protomyces macrosporus* Unger auf *Heracleum Sphondylium* bei Guarda (Unter-Engadin), 4. Sept. 1898. (18)

4. Ascomyceten.

- Poronia punctata* Fr. Plan-les-Ouates (Genève). (11)
- Bombardia fasciculata* Fr. Piédance, Carouge (Genève). (11)
- Sclerotinia Vaccinii* Wor. auf *Vaccinium Vitis Idaea*. Bei Sta. Maria, Münsterthal, Graubünden, 31. Aug. 1898. (18)
- Sclerotinia Aucupariae* Woron. in den Früchten von *Sorbus Aria*. Sulwald ob Isenfluh (Lauterbrunnenthal), 16. Juli 1899. (18)
- Sclerotinia Cydoniae* Schellenberg nov. sp. auf *Cydonia vulgaris*. Landwirtschaftliche Schule Strickhof bei Zürich. (14).

*Aleuria eximia* Lév. var. *carnea* nov. var. Les Ormonts-dessus, ferner mehrere Arten von *Aleuria* und *Lachnea* aus der Umgebung von Genf. (11)

*Phialea confluens* Hers. Bois de Troinex, Plan-les-Ouates (Genève). (11)

*Morchella crassipes* Pers. Saconnex d'Arve. (11)

*Mitrophora bohémica* Kr. Vernier. (11)

*Mitrophora rimosipes* DC. Champel (11), aux Vaux bei Aclens (Waadt). (3)

*Helvella monachella* Fr. var. *nigra* Genève. (11)

*Tuber magnatum* Pico (ob hier nicht eine Verwechslung vorliegt? Ref.) dans un labourage Derrière-les-bois près d'Aclens. (3)

*Choiromyces maeandriiformis* Vitt. En Bulloz bei Aclens (Vaud). (3)

---

*Laboulbenia flagellata* Peyritsch. Interlaken. (16)

*Laboulbenia Ophoni*. Interlaken. (16)

*Idiomycetes Peyritschii* Thaxter. Lauterbrunnen. (16)

#### 5. Ustilagineen.

*Urocystis sorosporioides* Körn. auf *Thalictrum alpinum*. Val Tuoi (Unter-Engadin), 17. Aug. 1898. (18)

*Urocystis Anemones* (Pers.) auf *Aconitum lycoctonum*. Am Weg von Stocken nach Aelpithal (Stockhornkette), 18. Juni 1898. (18)

*Urocystis Agropyri* Preuss. auf einer nicht näher bestimmbar Graminee am Gipfel des Eggischhornes (Wallis) bei ca. 2800—2900 M., 19. Aug. 1899. (18)

*Doassansiopsis occulta* (Hoffm.) Setch. auf *Potamogeton marinus*. Hinter dem Hôtel von Crans ob Siders, 24. Juli 1894 (bestimmt von Ed. Fischer). (19)

#### 6. Uredineen.

*Uromyces Lapponicus* Lagerh. auf *Astragalus alpinus* am Eingang des Suvrettathales (Ober-Engadin) (Aecidien), Alp-Suot im Val Tuoi (Unter-Engadin) (Aecidien und Teleutosporen). (7)

*Uromyces Solidaginis* (Sommerfelt) Niessl. auf *Solidago Virgaurea*. Zwischen Giarsun und Sur-En (Unter-Engadin), 27. Aug. 1898. (18)

- Uromyces ambiguus* (DC) Schröt. auf *Allium Schoenoprasum*. Argentine ob Bex (bestimmt vom Ref.) (19)
- Uromyces Primulae* Lévl. Bachalp am Faulhorn auf *Primula hirsuta* All. (Aecidien, Uredo. u. Teleutosporen). (6)
- Uromyces Primulae integrifoliae* (DC), Aecidien und Teleutosporen auf *Primula integrifolia* und *P. viscosa* All. (6)
- Uromyces Junci* (Desmaz.) Teleutosporen auf *Juncus obtusiflorus*, Aecidien auf *Pulicaria dysenterica*. Selhofenmoos bei Bern. (8)
- Uromyces Astragali* (Op.) Sacc. auf *Oxytropis campestris*. Zermatt, 9. Sept. 1895 (15: No. 1151).
- Puccinia Caricis-frigidae* Ed. Fischer. Aecidien auf *Cirsium spinosissimum*, Teleutosporen auf letztjährigen Blättern von *Carex frigida*. Val Tuoi (Unter-Engadin), 15. Aug. 1898 (18); gegenüber Imfeld im Binnenthal, 14. August 1899 (18).
- Puccinia Aecidii-Leucanthemi* Ed. Fischer. Aecidien auf *Chrysanthemum Leucanthemum*. Isenfluh, Berner Oberland, 12. Juni 1895 (15: No. 1164, 8, 6). Zwischen Charmey und Schwarzsee (Kt. Freiburg) (6), zwischen Jaun und Reidigalp (westliche Stockhornkette) (6), bei Reidenbach (Simmenthal) (6), Gegend von Silvaplana (Ober-Engadin) (6). Teleutosporen auf *Carex montana*: Isenfluh (6).
- Puccinia Caricis-montanae* Ed. Fischer. Aecidien auf *Centaurea Scabiosa*: Isenfluh (15: No. 1208, 8, 6), Samaden (Ober-Engadin) (6), Vernayaz (Wallis) (6); auf *Centaurea montana*: Saxeten (Berner Oberland) (6), Walopalp und Reidigalp (Stockhornkette) (6), Meerenalp ob Mühlehorn am Wallensee (6). Teleutosporen auf *Carex montana*: ob Vulpera (Unter-Engadin), 25. Aug. 1898 (18), Isenfluh (6).
- Puccinia firma* Dietel. Aecidien auf *Bellidiastrum Micheli* und daneben *Carex capillaris* mit Teleutosporenlagern. Aug. 1899 auf Dolomit gegenüber Imfeld (Binnenthal) bei ca. 1800 M. (18).
- Puccinia Pringsheimiana* Kleb. Aecidien auf *Ribes rubrum*. Freidorf (Kt. Thurgau). Anfang Juni 1898 (20).
- Puccinia Caricis* (Schum) Teleutosporen auf *Carex ferruginea* (experimentell bestätigt), bei Adelboden (8).
- Puccinia obtusata* Oth. Teleutosporen auf *Phragmites communis*: Hunzikerau bei Rubigen (Kt. Bern) (8, 15: No. 1270). Aecidien auf *Ligustrum vulgare*, ebendasselbst (8, 15: No. 1271), Steilabsturz gegen die Aare bei Steinisweg (Gem. Wohlen, Kt. Bern), Mai 1898 (8).

- Puccinia Festucae* Plowr. Teleutosporen auf *Festuca rubra* L. var. *fallax* Thuell., Aecidien auf *Lonicera nigra*. Hohlweg zwischen Sigriswyl und Wylerallmend (Berner Oberland) (8).
- Puccinia Agropyri* Ell. et Ev. Spermogonien und junge Aecidien auf *Clematis Vitalba*. Abstürze gegen die Aare bei Steinisweg (Gem. Wohlen), Kt. Bern. Mai 1898 (18).
- Puccinia Agrostidis* Plowr. Aecidien auf *Aquilegia alpina*, Teleutosporen auf *Agrostis alba*. Oberhalb Fionnay (am Weg nach Corbassière), Val de Bagne (9).
- Puccinia persistens* Plowr. Teleutosporen auf *Poa nemoralis* var. *firmula*, Aecidien auf *Thalictrum minus*, oberhalb Samaden (Ober-Engadin) (8), Aecidien auf *Thalictrum foetidum* zwischen Boschia und Ardez (Unter-Engadin), 16. Aug. 1898 (18).
- Puccinia septentrionalis* Juel. Teleutosporen auf *Polygonum viviparum*, welches neben aecidienbefallenem *Thalictrum alpinum* stand, von den Teleutosporen der *Pucc. Bistortae* in der Form abweichend und genau mit Juel's Beschreibung übereinstimmend, also dessen Angaben betreffs Zugehörigkeit von *Pucc. septentrionalis* zum *Aecidium Sommerfeltii* bestätigend. Val Tuoi, 17. August 1898 (18).
- Puccinia Senecionis* Lib. auf *Senecio Fuchsii* Schlucht zwischen Tarasp-Fontana und Bonifaciusquelle (Unter-Engadin), 20. Aug. 1898 (18).
- Puccinien* vom Typus der *Pucc. Hieracii*. Eine Zusammenstellung der schweiz. Standorte giebt E. Jacky (10). Im Folgenden sind wesentlich nur die neu unterschiedenen Arten angeführt:
- Puccinia Cirsii-eriophori* E. Jacky nov. spec. auf *Cirsium eriophorum*. Fionnay (Val de Bagne), Creux du Champ (Les Ormonts), Ober-Engadin (10).
- Puccinia Carduorum* E. Jacky nov. spec. auf *Carduus defloratus*, Fionnay (Val de Bagnes), Isenfluh (Berner Oberland), Surlej bei Silvaplana (Ober-Engadin); auf *Carduus Personata*: Val Medel (Graubünden), auf *Carduus crispus*: St. Moritz (Ober-Engadin) (10).
- Puccinia Carlinae* E. Jacky nov. spec. auf *Carlina acaulis* Sigriswylgrat (Berner Oberland), Isenfluh (Berner Oberland), Onnens (Jura) (10).
- Puccinia montana* (Fckl. p. p.) auf *Centaurea montana*. Weissenburgbad, Walopsee, Oeschinenthal bei Kandersteg (Berner Oberland), Rigi, Col de Chaude bei Châteaud'Oex (10).



- Puccinia Chlorocrepididis* E. Jacky nov. spec. auf *Chlorocrepis staticifolia*. Fionnay (Val de Bagnes), Saas-Fee (Wallis), Adelboden (Berner Oberland) (10).
- Puccinia Leontodontis* nov. spec.? auf *Leontodon*arten. Bei Bern, St. Moritz, Pontresina, Albula, Val Zeznina (Unterengadin) (10).
- Puccinia Virgaureae* (DC.) auf *Solidago Virgaurea*. Zwischen Giarsun und Sur En (Unter-Engadin), 27. Aug. 1898 (18).
- Puccinia expansa* Link. auf *Senecio cordatus*. Saas-Fee (Wallis) (8).
- Puccinia rhaetica* Ed. Fischer n. sp. auf *Veronica bellidoides*. Am Grad südlich vom Piz Arpiglia (Unter-Engadin) bei ca. 2800 M. (7).
- Puccinia Grossulariae* (Gmel.) auf *Ribes rubrum*: Pfarrhausgarten St. Beatenberg (Berner Oberland), Juli 1898 (bestimmt vom Ref.) (22), Pfarrhausgarten in Gsteig bei Saanen, 29. Aug. 1898 (bestimmt vom Ref.) (21); auf *Ribes petraeum*: Clozzaschlucht bei Guarda (Unter-Engadin), 29. Aug. 1898 (18).
- Puccinia Aegopodii* (Schum) auf *Astrantia major*. Über Stocken (am Fuss des Stockhorns, Berner Oberland), 18. Juni 1898 (18).
- Puccinia Imperatoriae* E. Jacky nov. spec. auf *Imperatoria Ostruthium*. Val Tuoi (Unter-Engadin), 13. Aug. 1898 (18), oberhalb Fionnay (Val de Bagnes) (9).
- Puccinia Saxifragae* Schlechtend. auf *Saxifraga androsacea*. Hintergrund des Val Zeznina bei Lavin (Unter-Engadin) (18).
- Puccinia Trollii* Karst. auf *Trollius europaeus*. Val Tasna (Unter-Engadin) an der Strasse von Ardez nach Fetan, 20. Aug. 1898 (18).
- Puccinia Epilobii-Fleischeri* Ed. Fischer, auf *Epilobium Fleischeri*, Bachgerölle bei Imfeld, Binnenthal, 6. Aug. 1899 (18).
- Gymnosporangium confusum* Plowr. Aecidien auf *Cotoneaster tomentosa*, zwischen Schuls und Kurhaus Tarasp, 20. Aug. 1898 (18).
- Gymnosporangium clavariaeforme* (Jacq.). Teleutosporen auf *Juniperus communis*, unweit Isenfluh (Lauterbrunnenthal) (8).
- Gymnosporangium tremelloides* A. Braun. Teleutosporen auf *Juniperus communis* bei St. Luc (Eifischthal) (8).
- Coleosporium Senecionis* (Pers.) auf *Senecio Doronicum*: ein offenbar zugehöriges Peridermium auf *Pinus montana* (Nadeln). Franzenshöhe am Stillfserjoch (7).

- Coleosporium Inulae* (Kze.). Uredo- und Teleutosporen auf *Inula Vaillantii*. Aaredamm längs der Elfenau bei Bern. Aecidien auf den Nadeln von *Pinus silvestris* ebendasselbst und Aaredamm am Selhofenmoos bei Bern (8).
- Melampsora alpina* Juel. Aecidien (*Caeoma Saxifragae* Strauss) auf *Saxifraga oppositifolia*. Teleutosporen auf *Salix herbacea*. Moräne am Rande des Glacier de Corbassière am Grand Combin bei 2650 M. (9).
- Cronartium ribicolum* Dietr. auf *Ribes petraeum*. Innenschlucht bei St. Moritz (Ober-Engadin) (6).
- Aecidium Aconiti-Napelli* (DC) auf *Aconitum paniculatum* an der Blattunterseite in rundlichen Gruppen. Die Aecidien waren schon ziemlich alt und von einem braunen Hofe umgeben, Teleutosporen waren nicht zu finden. Vermutlich handelt es sich um eine heteroecische Art, ob sie aber identisch ist mit der Form auf *Aconitum Napellus*, bleibt fraglich. Clozza-Schlucht bei Guarda (Unter-Engadin), 29. Aug. 1898 (18).
- Aecidium Conorum-Piceae* Reess, auf Zapfenschuppen von *Picea excelsa*. Rechtes Inn-Ufer bei Giarsun (Unter-Engadin), 27. und 29. Aug. 1898, Aufstieg von Süs nach dem Flüela, 7. Sept. 1898 (18).
- Aecidium Actaeae* (Opiz) Wallr. auf *Actaea spicata*. Eingang des Längthales (Binnenthal, Wallis), 7. Aug. 1899 (18).
- Aecidium Primulae* nov. sp. auf *Primula acaulis*. Bois de St. Christophe bei Aclens (Waadt) (3). Dürfte, trotzdem Verf. keine Teleutosporen beobachtete, vielleicht doch zu *Pucc. Primulae* gehören (Ref.).

#### 7. *Autobasidiomyceten.*

- Exobasidium Warmingii* Rostr. auf *Saxifraga bryoides*, ganze Sprösschen deformierend, Blätter blass verfärbt. Val Muranza (Münsterthal, Graubünden), 31. August 1898 (18).
- Russula mustellina* Fr. Bois du Bouchet Chamounix (13).
- Lactarius fuscus* Rolland nov. spec. Bois du Bouchet Chamounix (13).
- Britzelmayr (2) führt aus der Gegend von Greyerz folgende Agaricaceen an (Autor überall Britzelmayr):
- Agaricus* (*Lepiota*) *angustanus*, *flavifolius*, (*Armillaria*) *subimperialis*, (*Tricholoma*) *gigantulus*, *subsulfureus*, *subalpinus*, *deliberatus*, (*Clitocybe*) *planiusculus*, (*Collybia*) *pseudoplatyphyllus*, (*Mycena*) *vulgatus*, (*Pluteus*) *Romellii*, (*Entoloma*) *principalis*, (*Inocybe*) *serratus*, *aemulus*,

*nitidiusculus*, (*Clypeus*) *mixtilis*, (*Naucoria*) *scabrisporus*.  
— *Cortinarius odorifer*, *subflexuosus*. — *Hygrophorus eburneolus*.

Martin (11) zählt 78 Hymenomyceten-Arten, vorwiegend aus der Umgebung von Genf, auf, von denen wir hier nur folgende anführen (für die übrigen muss auf das Verzeichnis selber verwiesen werden):

*Lepiota medullata* Fr. var. *Secretani* nov. var. A l'angle de la route de Drize et du chemin de la Chapelle. Septembre.

*Hygrocybe conica* (Scop.) Fr. var. *nigrocapillata* nov. var. Bois d'Humilly et bois de Troinex.

*Boletus miniatus* Martin = *B. purpureus* Fr. Entre Challex et Pougny.

*Phallus impudicus* L. Bois de hêtres de Pisy (11). Am Monte Generoso (10 a).

*Chamonixia caespitosa* Rolland nov. gen. et spec. (*Gautieria* nahe verwandt), Chamounix (13).

*Hymenogaster Klotzschii* Tul. Aclens (Vaud) (3).

*Geaster pectinatus* Pers. Valleyres près Orbe (11).

*Geaster elegans* Vittad. Langwies, Graubünden (11).

*Geaster marchicus* Hennings. Am Eingang des Lötschenthals bei Gampel (5).

*Tulostoma mammosum* Fr. Bei Aclens (Waadt) (3).

#### Pflanzenkrankheiten.

*Plasmopara viticola* Berk. anno 1898 im Kanton Waadt stark aufgetreten, hauptsächlich auf den Rebenblüten (23,4).

*Peronospora gangliiformis* Berk. stark entwickelt auf *Lactuca sativa* im Frühling 1898 bei Aclens (Waadt) (3).

*Peronospora parasitica* de By. auf *Brassica oleracea* bei Aclens (Waadt) (3).

*Exoascus deformans* (Fuck.), Hexenbesen des Kirschbaumes im Kanton Thurgau häufig vorkommend (1).

*Sclerotinia Cydoniae* Schellenberg auf *Cydonia vulgaris*. Landwirtschaftliche Schule Strickhof bei Zürich (14).

*Oidium Tuckeri* Berk. ist seit 2 Jahren im Kanton Waadt in Zunahme begriffen. Die Krankheit hat sich auch in Bezirken verbreitet, die früher ganz verschont waren (23).

*Monilia fructigena* (Pers.) im Kanton Thurgau auf dem Kirschbaum bisher nur auf den Früchten beobachtet (1).

*Guignardia Bidwellii* (Ellis) (Black-rot der Rebe) ist bisher

auf Schweizerboden noch nicht aufgetreten, wurde aber in Salins, unweit der Grenze, beobachtet (4).

*Septocylindrium dissiliens* Sacc. auf der Weinrebe 1834 zum erstenmale in der Gegend von Genf beobachtet, trat 1894 neuerdings in Ollon, Saxon und St. Léonhard (Wallis) auf (4).

*Ascochyta Juglandis* Boltshauser n. sp. an den Blättern von *Juglans regia* im Kanton Thurgau nicht geringen Schaden verursachend (1a).

*Clasterosporium Amygdalearum* (Sacc.) auf dem Kirschbaum in der Schweiz 1882 zum erstenmal in Zug beobachtet, seither bedeutend ausgebreitet (1).

*Phoma Betae* Frank hie und da im Kanton Waadt, nicht mit besonderer Intensität (23,3).

## II. Algen.

Referent: L. Fischer.

Für Algen und Moose ist die Litteratur des Jahres 1899 benutzt worden, die der vorangehenden Jahre nur in soweit als dieselbe nicht durch Referate in den früheren Heften dieser Berichte berücksichtigt wurde. Bei der Zusammenstellung des nachstehenden Verzeichnisses ist benutzt worden:

1. **Overton, E.** *Notizen über die Grünalgen des Ober-Engadins.* Diese Berichte Heft 7, 1897, p. 49—68.
2. **Overton, E.** *Notizen über die Wassergewächse des Ober-Engadins.* Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 1899, p. 226—228.
3. **Senn, G.** *Über einige koloniebildende einzellige Algen.* Inauguraldissertation. Basel, 1899.

### Conjugaten.

*Xanthidium aculeatum.* Flüela-Pass, 2388 m (1).

*Calocylindrus turgidus.* Flüela-Pass, 2388 m (1).

*Spirotaenia condensata.* Flüela-Pass, 2388 m (1).

*Zygnema adnata* (provisorischer Name für mehrere Z.-Formen, die an Steinen festsitzend vorkommen), im Inn zwischen dem Campfer- und St. Moritzersee, am Piz Ot bei ca. 3000 m (1).

### Chlorophyceen.

*Hydrurus foetidus* im Engadiner Gebiet, äusserst formenreich und während des ganzen Sommers in üppigster Entwicklung (noch bei 2597 m) (1).

- Coelastrum reticulatum* (Dangeard) Senn. im Cementbassin eines Landgutes in Klein-Hüningen bei Basel (3).  
*Pediastrum integrum* in Masse längs des N.-W.-Ufers des Silvaplanersees (August 1892) (1).  
*Chlamydococcus pluvialis* in der Aushöhlung einer Granitsäule auf der Passhöhe des Julier (2287 m) (1).  
*Microthamnion Kützingianum* im Sumpfbereich zwischen Samaden und Celerina (1).  
*Chaetonema irregulare*. Ebenso (1).  
*Aphanochaete repens*. Ebenso (1).  
*Chaetophora pisiformis, elegans und endiviaefolia* in der Thalsohle des Engadins sehr verbreitet (1).  
*Draparnaldia glomerata und plumosa* zwischen Samaden und Pontresina häufig (1).

#### *Characeen.*

- Nitella opaca* im Seengebiet vom Maloja bis St. Moritz, im Inn von der Innschlucht bis zur Vereinigung mit dem Berninabach (1).  
*Nitella gracilis* (der *N. confervacea* sich nähernde Form) im Lago minore im Pontresinathal (2220 m), Lago nero, Lago della Crocetta (2306 m) (2).  
*Chara aspera* (in weiblichen Exemplaren) in einem Teich bei Samaden (2).  
*Chara foetida* in einem Teich östlich vom Campfersee (2).

### **III. Moose.**

Referent: L. Fischer.

Bei der folgenden Zusammenstellung, in welcher nur eine beschränkte Auswahl des Interessanteren aus den zum Teil längeren Standortsverzeichnissen ausgezogen wurde, ist folgende Litteratur benutzt:

1. **Culmann, P.** *Localités nouvelles pour la flore bryologique suisse.* Bulletin de l'herbier Boissier. T. 7, 1899, p. 133—136. (Nomenclature pour les espèces indiquées sans nom d'auteur d'après Schimper Synopsis Ed. 2.) Total des espèces énumérées 33, provenant pour la plupart du Canton de Zurich.
2. **Herzog, T.** *Einige bryologische Notizen aus den Waadtländer- und Berner-Alpen.* Bulletin de l'herbier Boissier. T. 7, 1899, p. 489—492. — Es werden 62 Arten aus der genannten Region (sämtlich auf Kalk-Unterlage)

aufgezählt, mit Standorts- und Höhenangaben. Im Anhang folgen noch 11 von J. v. Schneider im Berner-Oberland gefundene Arten.

3. **Meylan, Ch.** *Contributions à la flore bryologique du Jura.* Bulletin de l'herbier Boissier. T. 7, 1899, p. 602—608. Stations de 43 espèces, dont 10 nouvelles pour le Jura.

*Laubmoose.*

- Hymenostomum crispatum.* Hüttkopf (Canton de Zürich) sur la Nagelfluh (1).
- Dicranum strictum* Schl. Sur troncs pourris. La Chaux 1100 m. Vallée de Joux (3).
- Leptotrichum vaginans* (probablement la var. *brevifolium*). Stérile audessus de Goldau sur le chemin du Rigi Nouveau pour la Suisse (1).
- Desmatodon systilius* B. E. Sommet du Suchet 1580 m. Espèce nouvelle pour le Jura (3).
- Barbula obtusifolia* Schwaegr. Sur un rocher de Conglomerat molassique. Esp. nouvelle pour le Jura (3).
- Schistidium alpicola* an schiefrigen Kalkfelsen des Faulhorns (2300 m) (2).
- Ulota Drummondii* Bd. Vallon de Noirvaux près St. Croix sur un hêtre, et près de la Vraconnaz sur Corylus. Esp. nouvelle pour le Jura (3).
- Ulota intermedia.* Sommet de la Hohe Rhone (1220 m). Nouveau pour la Suisse (1).
- Funaria microstoma* B. E. Près de La Chaux (1050 m) et à une distance de 1 km de cette station une forme intermédiaire (probablement hybride) entre *F. microstoma* et *hygrometrica*. Esp. nouvelle pour le Jura (3).
- Webera proliger* Lindb. Kohlfirst, Lägern vers Regensberg, près de Steg, Pfannenstiel (760 m) (1).
- Webera lutescens* Limpr. Stigibühl près de Maschwanden Kohlfirst (1).
- Webera elongata* Spr. La Vraconnaz, sur sable molassique, 1100 m. Esp. nouvelle pour le Jura (3).
- Bryum Gerwigii* C. Müller. En amont de Kaiserstuhl sur la rive gauche du Rhin à 334 m (1).
- Bryum inclinatum* Br. Eur. Répandu sur les arêtes et les pâturages de la région alpine du Jura. Nouvelle pour la chaîne (3).
- Bryum cuspidatum* Spr. La Chaux, sur un rocher molassique, 1080 m. Esp. nouvelle pour le Jura (3).

*Mnium lycopodioides* Hook. Chasseron, 1600 m. Suchet, 1550 m. Esp. nouvelle pour le Jura (3).

*Philonotis seriata* Mitt. Göschenenthal (Uri), 1800 m (1).

*Plagiothecium curvifolium* Schlieph. Sommet de la Hohe Rhone, 1220 m. Nouveau pour la Suisse (1).

*Plagiothecium Ruthei* Limpr. Grindelmoos, 660 m, audessus de Horgen. Découvert pour la Suisse par le Dr. Hegetschweiler au Riffersweilermoos en 1891 (1).

*Amblystegium hygrophilum*. Dans un fossé de tourbière, Heischer-Allmend, 600 m. Nouveau pour la Suisse (1).

*Hypnum reptile* Rich. La Chaux, 1100 m, au pied d'un vieux bouleau au bord d'une tourbière. Esp. nouvelle pour le Jura (3).

*Hypnum procerrimum* über dem Iffigensee (ca. 2300 m) (2).

#### IV. Gefässpflanzen.

Referent: C. Schröter.

Als Grundlagen dienten: Gremlin, Excursionsflora 8. Auflage und unsere vorigen Referate (siehe Heft II, III, VI und VIII dieser Berichte.)\*)

Die Angaben stammen aus folgenden Quellen:

1. **Ascherson-Græbner**, Synopsis der mitteleuropäischen Flora, Bd. I, 1896—1898. Bd. II Lief. 7—9.
2. **Chenevard**, Notes floristiques. Bulletin de la société botanique de Genève IX. 1898.
3. **Correvon**, Une excursion botanique à la Brévine. Rameau de sapin, 1899 No. 10.
4. **H. Jaccard**, Plantes nouvelles pour la flore valaisanne. Bulletin Murithieme XXVI, 1897.
5. **P. Jaccard et Rittener**, Comptes rendus de la société helvétique des sciences naturelles, Berne 1898.
6. **Kneucker**, Bemerkungen zu den Carices exsiccatae. — Allgemeine botanische Zeitschrift, 1899.
7. **Rhiner**, Abrisse der zweiten tabellarischen Flora der schweizerischen Kantone. — Bericht der naturforschenden Gesellschaft St. Gallen.
8. **Rikli**, Ranunculus pygmæus. — Diese Berichte Heft IX.
- 8a. **Rikli**, Die schweizerischen Dorycnien. — Diese Berichte Heft IX.
9. **Rikli**, Der Säkingensee und seine Flora. — Diese Berichte Heft VIII.
- 9a. **Wolf**, Floristische Miscellaneen aus dem Wallis. — Bulletin Murithieme XXVI. 1897.
- 9b. **Bornmüller**, Zur Flora Tessins. Bull. Herb. Boissier IV, 3. 1896.

\*) Weggelassen sind 1) die *Farnkräuter*, da demnächst eine eingehende Bearbeitung der schweizerischen Farnkräuter (excl. Lycopod., Selaginella und Equisetum) von Dr. *Christ* erscheint und 2) die *Hieracien*, da Herr *Käser-Zürich* beabsichtigt, binnen kurzem darüber zu referieren, 3) die *Ranunculaceen*, da Dr. *Rikli* nächstes Jahr in diesen Berichten eine Uebersicht über die schweizerischen Angehörigen dieser Familie geben wird.



Ferner aus schriftl. Mitteilungen der Herren:

10. Dr. A. Binz, Basel. — 11. P. Chenevard, Genf. — 12. Dr. H. Christ, Basel. — 13. H. Correvon, Genf. — 14. Dr. Cornaz, père, Neuenburg. — 15. Dr. Fischer-Sigwart, Zofingen. — 16. E. Hausamann, stud. phil., Männedorf. — 17. F. Meister, Horgen. — 18. Dr. Rikli, Zürich. — 19. St. Schmidely, Genf. — 20. A. Usteri, Zürich. — 21. Dr. H. Volkart, Zürich. — 22. Dr. Tr. Waldvogel, Zürich. — 23. Prof. Dr. Wilczek, Lausanne.

I. Für die Schweiz neue oder neu aufgefasste Arten, Varietäten und Bastarde.

*Ranunculus pygmaeus* Wahlb. Glazialrelikt, neu für die Schweiz, von Prof. Ed. Fischer, am 18. August 1898, im Hintergrunde des Val Zeznina südlich von Lavin im Unterengadin bei 2600 m entdeckt. Südwestlichster Standort dieser nivalen und nordischen Pflanze im Alpengebiet. (8)

*Helianthemum polifolium*  $\times$  *virgare*; Lugano, an Felsen bei Cap Martino, zwischen den Eltern ein einziger kräftiger Strauch. (9b)

*Helianthemum virgare* Dc var. *nummularium* Mill. Kleine Form, Blätter 8—12 mm lang, 1—3 mm breit; Blüte 10 mm Durchmesser. — Branson und Morge-Thal. (2)

*Viola sciaphila*  $\times$  *Thomusiana* (*V. pachyrrhizoma* F. O. Wolf.) Alp Arolla 2200 m. (9a)

*Viola collina*  $\times$  *Favrati* (*V. Riddensis* F. O. Wolf). Wäldchen bei Tourbillon, Maragnin, Vex und um Riddes. (9a)

*Viola Beraudii*  $\times$  *hirta* (*V. Sedunensis* F. O. Wolf). Branson. Umgebung von Sitten. Bramois, Maragnin. Aproz Mont d'Orge (9a)

*Viola Beraudii*  $\times$  *Favrati* (*Mureti* F. O. Wolf). Wäldchen hinter Tourbillon, Maragnin, Aproz. (9a)

*Saponaria ocymoides* L. var  $\beta$  *intermedia* Rouy et Foucaud (= *alsinoides* aut. non Viv.) — mit kleinen Blüten in wenigblütigen laxen Trauben, Pflanze schwächlig. — Branson u. Saillon. (23)

*Saponaria ocymoides flore albo*. Saillon. (23)

„*Cerastium arvense* L., lässt sich folgendermassen gliedern:

α) *typicum* L., allgemein verbreitet,

„ subv. *glandulosum* Wilczek (Herbar.) Branson.

β) *strictum* Häncke.

„ subv. *viscidulum* Greml. Visperthäler.

γ) *latifolium* Feinl.—Branson, Chavornay.

„ subv. *glanduloso-pubescens* Wilczek—Hospenthal.

Die bemerkenswerteste der 3 drüsigen Parallelförmigen ist *viscidulum*, das ich bis jetzt ausserhalb der Visperthäler nicht gesehen habe. In den Graischen Alpen, denen meiner Ansicht nach das Wallis tributär ist, scheint sie zu fehlen.“ (23)

*Vicia Orobus* DC. Prés Rolliers zwischen Verrières und der französischen Grenze, aber noch auf Schweizergebiet, auf der Excursion der Schweizerischen botanischen Gesellschaft unter Leitung von Prof. Tripet am 3. Aug. 1899 entdeckt. (3)

*Vicia Cracca* f. *Kitaibeliana*, eine bei uns bisher nicht beobachtete Sumpfform. Hinterbergried bei Schönenberg, Kt. Zürich, Ried bei Schmerikon. (18)

*Achillea Millefolium* × *setacea* (*Briquetiana* Chen.) — Stengel 45—50 cm, ein wenig weisslich-wollig. Basalblätter 1,5 cm br. × 14 cm l., Stengelblätter 1 cm × 10 cm. Corymbus compact, kuglig; Köpfchen 3 mm lang, ähnlich denen v. *A. setacea*, Blüte weiss. — Fussweg von Alpien am Simplon. (2)

*Achillea stricta* Schl. f. *intermedia* Chenevard: Habitus von *stricta*, aber Spindel der Stengelblätter schmal und ungeflügelt wie bei *Millefolium*. Nicht hybride Zwischenform zwischen *A. Millefolium* und der nahe verwandten *stricta*. (2)

*Aster alpinus* L. f. *tubulosus*, mit lauter Röhrenblüten. — Moränen des Zwischbergengletschers. (2)

*Leontodon pyrenaicus* Gouan var. *major* Chen. Stengel 20—23 cm mit 4—6 Schuppen, besonders oberwärts rosthaarig, Blätter 10—15 cm lang, 15—20 mm breit, in einen langen Stiel verschmälert — Köpfchenhülle 18—22 mm lang — Neben der Normalform auf dem Egischhorn. (2)

*Phyteuma Scheuchzeri* All. „in d. Umgebung v. Lugano sehr formenreich. Die Form, welche Reichenbach (*Icones* tab. 1643) abbildet, häufig bei Morcote u. Figino, sowie längs der Strasse nach Melide am Fusse des S. Salvatore; var. *Columnae* Gaud. mit tief herzförmigen untersten Stengelblättern u. Basalblättern schön ausgeprägt an Felsen bei Cap Martino. Die entgegengesetzte Form mit äusserst schmalen linearen Wurzelblättern bei Figino. Eine *forma brevibracteata*, deren Stützblätter verkürzt sind und so das Köpfchen kaum überragen od. kürzer sind als dasselbe, ausserdem mit Wurzelblättern v. d. Form der var. *Columnae* Gaud. bei Cap Martino; letztere daher der Th. *Charmelii* Vill.

welche aber behaarte Kelchblätter und gefranzte Bracteen besitzt, sehr ähnlich. Eine Form schliesslich mit 3—5 sehr langen Bracteen von 6—10 cm Länge und mit linearen Wurzelblättern bei Morcote. Die wirkliche *Charmelii* Vill., die Penzig vom Generoso anführt, vergeblich gesucht.“ (9b)

*Phyteuma Scheuchzeri* Willd. var. *charmeloïdes* Biroli: Die Pflanze von Martino und vom Monte Generoso ist nach R. Buser so zu bezeichnen. (11)

*Echium vulgare* L. f. *dumetorum*. Briquet et Chenevard — 80 cm hoch, Blätter gross.  $5,5 \times 30$  cm, Inflorescenz voluminös, aber mit ungeteilten (nicht gegabelten) Cymen, Krone 1,5 cm länger als der Kelch. — Erinnert an *E. altissimum* Jacq. und *E. italicum* L, aber unterscheidet sich von dieser durch einfache Cymen und die grossen blauen Kronen. — Bildet das Gegenstück von der Reductionsform var. *valesiaca* Jacc. — Hecken in Vol-lèges, Bez. Entremont, Wallis. (2)

*Gentiana angustifolia* Vill. Mont Blanchard bei St. Gingolph (Jakowatz, K. A. der Wiss. Wien Bd. LVIII, I. Mai 1899, nach 23).

*Gentiana Amarella* L. Bormio, Stilfserjochstrasse bis gegen die 2. Cantoniera (Longa, Lehrer von Bormio). Das von Killias im Unterengadin constatierte Vorkommen durch Wettstein bestätigt! (14)

*Soldanella alpina* L.  $\times$  *pusilla* Baumg. (*hybrida* Kerner.) „in Kronform, Farbe und Länge der Fransen genau die Mitte haltend, mit 5 kleinen Schlundschuppen“. Fürstenalp bei Chur, Obersäss bei 1950 m inter parentes leg. Dr. A. Volkart. (21)

*Primula Auricula* L. var. Der var. *nuda* Widmer genähert, aber durch deutlich gezähnte Blätter mit knorpligem, dicht-drüsigem Rand ausgezeichnet. Haut d'Arbignon, Abhänge der Dent de Morcles, 1800 m. Habituell der *Primula ciliata* Moretti ähnlich. (23)

*Quercus Cerris* L. var. *laciniata* Loudon. — Ct. Tessin (12)

*Orchis latifolia* f. *longibracteata* Neilr. grasig-abschüssige Stelle mit südöstlicher Exposition, etwas unterhalb vom Rigi-Dächli bei ca. 850 m. leg. stud. Lüthy, 1. Juni 1899. (18)

*Orchis mascula* b. *obtusiflora*. Koch. — Spitze von Tanay, Wallis. (2)

*Orchis submascula*  $\times$  *pallens* (Jaccardi Chenevard), Habitus v. *mascula*, Blütenähre verlängert, lockerer als bei *pallens*.

Blüten gelb; Labell leicht gerötet; Sporn aufgerichtet, aber länger als bei *pallens* — Wiesen «aux Abufeys sur Bex.» (2)

*Orchis pallens* × *sambucina* (*Chenevardii* M. Schulze, (Österr. bot. Zeitschrift 1898, Heft 2). Oberhalb Branson. (2)

*Ophrys apifera* Huds. var. *Muteliae* Mut. — Ravine de l'Arme à Chancy bei Genf. (2)

*Ophrys aranifera* Huds. var. *ambigua* Gren. — Marais de Losty, Chancy bei Genf. (2)

*Ophrys aranifera* Huds. var. *fucifera* Rdb. fd. — Bois de Bay bei Genf. (2)

*Gymnadenia conopsea* var. *intermedia* Gren. à Aux Rouges sur Gingins bei Genf. (2)

*Carex flava* L. var. *alpina* Kneucker nov. var.

Pflanze 4—15 cm hoch, selten höher, weibliche Ährchen klein, kuglig; unterste weibliche Ährchen bei zahlreichen Individuen deutlich gestielt und infolgedessen das zugehörige Tragblatt mit langer Scheide versehen; unterste weibliche Ähre oft bis zur Basis herabgesetzt.

An mässig feuchten Stellen über dem Dorf Hospenthal, Kt. Uri, nahe der Gotthardstrasse, in Begleitung einer Zwergform von *Carex Oederi* Ehrh. und *C. leporina* var. *capitata* Sonder., auf Urgestein; ferner beim Handeckfall im Haslethal, Riederalp 1947 m, Schwarzsee bei Zermatt 2558 m. (6)

*Carex atrata* L. × *alpina* Sw. (*C. atrata* × *VahlIIi* Schk. Brügger nomen nudum = *C. Candriani* Kneucker) — Albula leg. Candrian. (6)

*Carex Laggeri* Wimmer und Verwandte:

Nach Kneucker und Kükenthal (Allg. bot. Zeitschrift 1899, S. 162 ff.) ist *Carex Laggeri* Wimmer ein Bastard *grypos* (Schk.) × *foetida* Vill; *Carex Laggeri* auct. = *foetida* Vill. × *lagopina* Wahlbg; *Carex microstyla* Gay = *foetida* Vill. × *Persoonii* O. F. Lang.

Näheres darüber wird von Kükenthal publiziert werden. (6)

*Carex atrata* L. × *aterima* Hppe. (Brügger, nomen nudum) = *C. Binnensis* Kneucker. — Fleschenthal, Binnenthal, Wallis. (6)

*Heleocharis ovata* R. Br. var. *Heuseri* Uechtritz. Grenzflora: bisher nur aus Schlesien bekannt. Flora des zeitweise entleerten Beckens des Säckinger-Bergsees (382 m) im südlichen Schwarzwald. Die Pflanze unterscheidet sich von *H. ovata* R. Br. wie folgt:

	<i>H. ovata</i> R. Br. v. <i>Heuseri</i> .	<i>H. ovata</i> R. Br.
Halmhöhe:	1—6 cm (Extreme $1\frac{1}{2}$ —9 cm).	10—20 cm (Extreme 2—28 cm).
Lage d. Halme:	bogig gekrümmt bis niederliegend.	aufrecht.
Unfruchtbare Halme:	vereinzelt bis oft sogar sehr zahlreich.	0.
Ährchen:	wenig-blütig (4 bis ca. 20), eirundlich.	vielblütig (mehr als 20), eiförmig bis länglich-eiförmig.
Pergionborsten:	6, länger als das Früchtchen.	
Verdickte Griffelbasis:	ungefähr so breit als hoch.	etwas breiter als hoch (kein scharfer Unterschied).
Bälge:	länglich-oval, vorn stumpf, dunkelbraun bis braunschwarz, mit grünem Mittelnerv, Spitze und Basis schwachhäutig, seitlich kein Hautrand.	breit-oval, braun mit schwachem, grünem Mittelnerv und breitem, weishäutigem Rand.

*Heleocharis ovata* R. Br. v. *Heuseri* zeigt eine auffallend grosse habituelle Ähnlichkeit mit *H. Lereschii* Shuttl. (9)

*Agrostis alba* × *Calamagrostis tenella* (*Agrostis Stebleri* Schröter herb. 1898, *Agrocalamagrostis Stebleri* Ascherson und Graebner Synopsis II 223 1899). — Fürstenalp bei Chur 1800—1900 m, vom Referenten als Bastard erkannt, von Ascherson bestätigt. (1)

*Phleum Michelii* Ml. var. *β. luxurians* Beck (unterste Rispenäste entfernt, der unterste bis 1 cm!). Charnex, Kt. Waadt (Schneider 1).

*Avena Parlatorii* Woods (= *sempervirens* Host non. Vill.).

Die Pflanze von der Grigna, die Parlatores als *A. sempervirens* Vill., Christ als *A. Notarisii* Parl. bezeichnete, ist die obige Art. (23 und 1).

*Avena pubescens* Hudson subspec. *laevigata* Schur. proles *insubrica* Ascherson und Graebner. Die Subspecies vom Typus verschieden durch folgende Merkmale: Obere Blätter nur am Rande in der Nähe der Scheidenmündung behaart, sonst wie die oberen kahl; Ährchen bis 2,5 cm lang. Untere Klappe erheblich länger als die Blüten, in eine feine Spitze verschmälert. — Camoghè bei Piora

bis 2300 m, legit Bornmüller (Synopsis II, p. 245 u. 96). Die Race «*insubrica*» ist ausgezeichnet durch folgende Merkmale: nur 5 mm breite Blätter, an der blühenden Pflanze die untersten nur in der Nähe der Scheidenmündung schwach behaart, die mit behaarten Scheiden bereits abgestorben. Rispe stark zusammengezogen, mit nur bis 1,5 cm langen Ästen. (Die siebenbürgische Race *transsilvanica* Asch. u. Graebner hat breitere Blätter und lockerere Rispe). — Vielleicht eine gute Art! Weiter zu verfolgen! (1)

*Equisetum ramosissimum* Desf. var. *pannonicum* Ascherson  
— Maroggia Ct. Tessin. (23)

## II. Neue Standorte.

*Nuphar pumilum* Sm. Egelsee bei Bubikon (Fr. Meister, Tr. Waldvogel) Lützelsee bei Hombrechtikon. (22)

*Clypeola Gaudini* Trachs. 1895 ausserordentlich häufig in allen Weinbergen zwischen Saillon und Leytron. — 1897 nur mehr wenige Exemplare. (23)

*Draba incana* L. Rechtes Rhoneufer bei Gletsch, beim Hotel, neu f. d. Wallis. (4)

*Helianthemum canum* Dun. Gorges de la Liserne ob Ardon; neu für Wallis. (4)

*Viola collina* × *hirta* (*valesiaca* Hausskn). Linkes Rhoneufer bei Aproz, Genf. (2)

*Dianthus caesius* L. Rochers de Naye, anscheinend wild, in starken Stöcken auf den Felsen. (13)

*Silene Saxifraga* L. Bei Randa leg. Gondet (bisher in Wallis nur vom Simplon und von Zermatt bekannt). (13)

*Stellaria pallida* Piré. Maroggia Ct. Tess. (23)

*Dorycnium germanicum* (Grml) Rouy, ausser dem bekannten Standort oberhalb Chur sind durch Oberforstinspektor Coaz, Landwirtschaftslehrer Thomann vom Plantahof und von Frl. v. Gugelberg von Mayenfeld noch 7 weitere Standorte in der bündnerischen Herrschaft, bei Trimmis, Mastrils, Malans, Mayenfeld, und vom Fläscherberg bekannt geworden. (8 a)

*Astragalus depressus* L. neu für die penninische Kette — Ob Chable, Bagnes. (4)

*Vicia pisiformis* L. Wald am Fuss des französischen Jura oberhalb Evonne, dicht bei der Schweizer-Grenze. (19)

*Vicia varia* Host. Lausanne, Maroggia. (23)

*Alchimilla splendens* Christ — Engelberg, Gerschen-Abhang. Juni 1899 (12) — Am Waldrande à la Trélasse, Dôle — (erster Standort im Jura!) (19)

*Eryngium campstre* Folaterres, neu für Wallis. (4)

*Valerianella carinata* Loisl. bei Männedorf, neu für den Kanton Zürich (16)

*Carlina longifolia* Rehb. Generoso. Nach Chenevard eine Gebirgsform der *C. vulgaris*. (11)

*Campanula rhomboidalis* × *Scheuchzeri* — Abhänge des Grammont gegen Tanay 1800 m, 10. August 1899 leg. Christ (in den Alpen von Tanay sind die Eltern häufig!) Folgende ist die von Dr. Christ mitgeteilte Diagnose:

„*Campanula rhomboidalis* × *Scheuchzeri*. Rhizomate longe repente ramoso stolonibus emittente, stolonibus hornotinis folia radicalia longe petiolata late ovato cordata seu rotundato — reniformia  $1\frac{1}{2}$  cent. longa et lata grosse crenata ferentibus, caulibus florigeris numerosis solitariis flaccidis 15 ad 20 cent. longis foliosis, foliis inferioribus mediisque numero 10 ad 12 ovatis sive ovato-lanceolatis sessilibus 3 cent. et ultra longis 12 ad 12 mill. latis acutis grosse dentatis, foliis superioribus paucis (2 ad 4) lanceolatis imo lineari-lanceolato 2 ad 3 mill. latis, floribus solitariis sive binis, ternis aut quaternis erectis, foliis floralibus setaceo-linearibus suffultis, calyce brevi ( $2\frac{1}{2}$  mill.) late turbinato, segmentis anguste linearibus recte patentibus 12 mill. longis corolla late campanulata 2 cent. longa et lata dilute coerulea stylo corolla vix brevior, stigmate vix trifido conglutinato. Tota planta parce pubescente imprimis caule nervis et margine foliorum. — Habitus inter parentibus intermedius. *C. rhomboidalis* differt rhizomate brevius repente caulibus validis altioribus fasciculatis foliis numerosioribus, radicalibus stolonum late ovatis obtusis brevius petiolatis nec cordatis reniformibus, caulinis numerosioribus ovato-rhombeis magis serratis, floribus racemosis secundis nutantibus potius ventrico so-campanulatis minoribus vix  $1\frac{1}{2}$  cent. longis. *C. Scheuchzeri* Vill. differt foliis caulinis lanceolata-linearibus fere integris, corolla angustius campanulata obscure coerulea, segmentis calycis longioribus et latioribus magis erectis.“ (12)

*Fraxinus excelsior* L. var. *monophyllos*: Adlisberg bei Zürich, ein Exemplar in einer natürlichen Verjüngung, leg. Tramkondukteur Göldi. Zweiter Standort in der Schweiz! (Ref.)

*Gentiana alpina* Vill. Kalkabhänge vor Gagnerie im Massiv der Dent du Midi, häufiger aber auf Gneiss ebenda, mit *excisa* und *acaulis*, gleichzeitig blühend; die Finder betrachten je sie als gute Art. (5)

*Euphrasia stricta* Hort (*ericetorum* Jord.) existiert nicht mehr an dem von Jäggi entdeckten Standort bei Wykon, Kanton Luzern, da der Platz verbaut ist. (15)

*Cortusa Matthioli* L. Val Muranza leg. Loretz. (14)

*Plantago fuscens* Jord. Neuerdings im Binntal in ziemlicher Menge bei Tschamfigen und Kuhstafel konstatiert, in einer der *Pl. montana* sich nähernden Form. (14) — Ferner ein Stock am Südhang der Dent de Brenleyre oberhalb Oussannaz. (Jaquet in 7.)

*Betula Murithi* Gaud. Ein Baum mittlerer Grösse etwas oberhalb des linken Bachufers im Val de Bagnes, gerade gegenüber dem Hotel von *Fionney*; erster Standort ausserhalb des eng begrenzten Fundortes bei Mauvoisin! (14)

*Sagittaria sagittifolia* L. Zwischen Grynau und Tuggen Kanton Schwyz, in sehr grosser Zahl. 21. Juli 1899. (17)

*Sparganium affine* Schnitzlein suspec. *Borderi* Weberbauer forma *microcephala* Neumann. Scheideck leg. von Gansauge 1862. (1)

Der Typus: Rossboden und Blackenstafel. Urserenthal, Trübensee, Melchsee, Valle Maggia. (7)

*Sparganium polyedrum* Ascherson und Graebner. Massenhaft zwischen Grynau und Tuggen, 21. August 1899. „Im Kt. Zürich kommt nach meinen Beobachtungen nur *Sp. neglectum* Beeby vor.“ (17)

*Potamogeton americanus* Cham. im Lützelsee. (22)

*Orchis supermilitaris-purpurea* (*dubia* Camus). Ihr Vorkommen bei Martigny, Wallis, ist von Interesse, weil *purpurea* im Wallis fehlt! (2)

*Gymnadenia conopea* R. Br. var. *densiflora* Fr. Scheint verbreitet. Je mehrere Standorte bei Winterthur und Genf, Michelfelden bei Basel lg. Linder. (18)

*Epipactis sessilifolia* Petermann. Zwischen Ziefen und Rigoldswil, Baselland; Föhrenwald bei Olten. (10) Liestal (12)

*Narcissus biflorus* Curt. Bei Orbe, Kanton Waadt. (13)

*Allium pulchellum* Don. Ennetmoos bei Kerns. (15)

*Bulbocodium vernum* ist vorwiegend Gebirgspflanze und steigt von dort in die Ebene hinab: Arolla bis 2400 m, Zermatt 2401, Gspohn 1898 m und an vielen anderen hochgelegenen Stationen, vielfach auch weissblühend, und auf weite Strecken hin mit dem weiss- und violettblühenden *Crocus* vermischt einen herrlichen Blument Teppich bildend. (9a und 23.)



*Festuca valesiaca* Schleicher. Bei Münster im Münsterthal und Graubünden leg. Dr. Stebler (teste Hackel). Neu für Bündten. (20)

— *amethystina* L. Am „Haupt“ ob Landquart. (Neu f. Bündten.) (21).

*Scirpus mucronatus* L. Zwischen Grynau und Tuggen in sehr grosser Menge auf Streuwiesen. — 21. VIII 1899 (17).

*Carex Buxbaumii* Whlbg. neu für Wallis, Sümpfe oberhalb Saas-Grund. (4)

*Carex nitida* Host — Ruine Doragno, Rovio, Tessin (neu für Tessin). (20)

*Carex subnivalis* A. T. Bormio, valle dei Vitelli (14)

*Rynchospora fusca* R. Sch. Pfäffikon Ct. Zürich, Egelsee b. Bubikon (17)

*Pinus montana* Miller var. *uncinata* Ram. Als Glacialrelict bei Weinfeldern Kt. Thurgau leg. Frc. Hetzner. (H. H.)

*Picea excelsa* Link.

#### Zapfenstatistik der Varietäten

- 1) Unter 2197 Zapfen von Rigi-Klösterli (auf's Geratewohl aufgesammelt durch Herrn X. Schreiber z. Schwert) waren folgende Varietäten in den angegebenen Zahlen vertreten.

var. *fennica* Regel . . . . . 14 Zapfen (0,6 ‰)

var. *europaea* { versus *fennica* 14 }  
                  { *typica* . . . . . 1949 } 2057 „ (96‰)  
                  { *f. squarrosa* Jac. 15 }  
                  { versus *acuminata* 84 }

var. *acuminata* Beck . . . . . 65 „ 3,4 ‰

- 2) Unter 162 Zapfen von aus natürlichen Anflug hervorgegangenen, alleinstehenden Exemplaren ob *Flerdten* am *Heinzenberg* bei 13—1400 m ü. M., gesammelt von Herrn Kreisförster Hans Schwegler, fanden sich

var. *europaea* { versus *fennica* . . 6 }  
                  { *typica* . . . . . 156 }

Alle diese Zapfen waren auffallend dünnschuppig, die Schuppen sehr brüchig und glänzend, wie lackiert. 13 davon zeigten eine auffallend tief zweispaltige Schuppenspitze, ohne akuminat zu sein. (Ref.)

Spielarten:

- Pinus triloba* (bisher nur in Soglio-Bergell bekannt).  
Schynstrasse zwischen Solis und Sils: Fontana ob Vicosoprana, Bergell, an der Strasse: unterhalb Alp Zochetta. Bergell (E. Geiger, dipl. Förster.)
- Pinus pendula* Jacq. et Hér. (Trauerfichte) mehrere Exemplare beim Lago di Bitabergo, im Bergell, bei 1800 m ü. M. (Geiger)
- Pinus virgata* Casp. (Schlangenfichte) Luvertobel ob Castasegna. Fichtenwald ob Roticcio 1400 m, Bergell (Geiger)
- Pinus argentea* mit weissbunten Nadeln. — Ein einziger Baum in einem geschlossenen Fichtenwald oberhalb Saas im Prättigau, leg. stud. for. Roffler.

III. Einschleppungen und Verschleppungen.

- Sisymbrium sinapistrum* Crantz. Mündungsgebiet der Wiese bei Klein-Hüningen an verschiedenen Stellen. (10)
- Erucastrum Pollichii* Sch. Sp. Bahnkörper b. Saxon. (4)  
Sion (Ref.) Neuer Einwanderer f. d. Wallis!
- Euphorbia Lathyris* eingeschleppt, beim Degenried am Zürichberg. (16)
- Salvia verticillata* neuer Einwanderer, sich immer mehr verbreitend. Waid bei Zürich, unterhalb Hütten (Kanton Zürich). (18)
- Asperugo procumbens* L. scheint sich weiter zu verbreiten: bei verschiedenen Mayensässen bei Airolo (Fisch).

Anhang zu Abschnitt III. \*)

Einbürgerungen in d. Gegend v. Zofingen zum Zweck der Erhaltung seltener, an ihren Originalstandorten gefährdeten Arten durch Herrn Dr. Fischer-Sigwart (teilweise mit Unterstützung durch Herrn H. Lüscher).

*Trapa natans* in e. Feuerweiher (siehe d. Originalabhandlung in diesem Heft).

*Calla palustris* L. Da der einzige schweizer. Standort in Chüsireinwald gefährdet war, wurde die Pflanze (nach vielen missglückten Versuchen) in einem Tümpel im Bannwald b. Zofingen angesiedelt.

*Anemone Hepatica*. Gigerfluh im Riedthal.

*Nymphaea alba* u. *Nuphar luteum* in einigen Feuerweihern b. Zof.

---

\*) Es scheint mir notwendig, Einbürgerungsversuche zu registriren, um späteren falschen pflanzengeogr. Schlüssen vorzubeugen. (Ref.)

*Deutaria polyphylla*. W. K. Baumgartner im „Rebberg.“  
*Iberis saxatilis* L. Am Engelberggrat seit 1880 in einem  
Stock.

*Sarothamnus scoparius* Koch. Ist nun überall im Bann-  
wald ziemlich häufig. Von den Jägern eingebürgert als  
Hasenfutter im Winter.

*Rosa vestita* God. Zwei Stöcke im «Rebberge».

*Tordylium maximum*, L. Alljährlich im «Rebberge» als  
Unkraut.

*Lappa tomentosa* Lam. und *officinalis* All. Alljährlich in den  
«Rebbergen».

*Lycopus europaeus* L. Weiherchen beim Baaneingange  
der Landstrasse, Bärmoosweiher, Haldenweiher.

*Lysimachia thyrsiflora* L. Baanweiherchen, Baermosweiher.

*Hydrocharis morsus ranae* L. Im Haldenweiher, einige  
Jahre sehr üppig, auch blühend, seit zwei Jahren wieder  
verschwunden.

*Elodea canadensis* Casp. Im Baermosweiher und im  
«Teich».

*Sagittaria sagittifolia* L. Im Brunngraben, blüht aber nie.

*Typha angustifolia* L. Am Baermosweiher.

*Typha Shuttleworthii* Koch et Sonder. Im Haldenweiher  
und im Rebberg.

*Acorus calamus* L. Im Haldenweiher und Baermosweiher.

*Erythronium dens canis* L. Heiternplatz und Gigerfluh.  
Blüth alljährlich, vermehrt sich aber nicht.

*Cyperus longus* L. Am Haldenweiher seit einigen Jahren  
sehr gut gedeihend. «Rebberg».

*Glyceria spectabilis*. M. K. Baermosweiher.

*Rumex hydrolapathum*. Huds. Baermosweiher, Halden-  
weiher, Brunngraben.

Alle Versuche sind genau registriert und darüber  
Tagebuch geführt worden. Eine grosse Menge Versuche  
misslangen vollständig. Andere gelangen gut und sehr  
gut, die betreffenden Pflanzen gedeihen einige Jahre vor-  
züglich, verschwanden dann aber wieder. Dies geschah  
hauptsächlich mit einigen Wasserpflanzen, wie:

*Lemna trisulca*. L.

*Lemna gibba*. L.

*Lemna polyrrhiza*. L.

*Hottonia palustris*. L.

*Utricularia vulgaris*. L.

*Riccia fluitans*.