

Lateinische Diagnose zweier Orchideenbastarde

Autor(en): **Wildhaber, Othmar J. / Reinhard, Hans R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse**

Band (Jahr): **77 (1967)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-54333>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Berichtigung zur Arbeit von H. R. Reinhard (Berichte Schweiz. Bot. Ges. 77, 1967, S. 111 und 113): der Name der Untergattung *Orchis* subg. *Dactylorchis* stammt von Klinge, nicht von Schlechter.

Lateinische Diagnose zweier Orchideenbastarde

Von

Othmar J. Wildhaber und Hans R. Reinhard

Um dem Artikel 40 des Internationalen Code der Botanischen Nomenklatur 1966 zu genügen, sei der Beschreibung der beiden neuen, 1965 in der Schweiz gefundenen Orchideenbastarde die lateinische Diagnose angefügt (siehe Wildhaber, Ber. Schweiz. Bot. Ges. 75, S. 293, 1965, und Reinhard, l. c. 77, S. 110, 1967).

Orchis mascula L. × *O. militaris* L.
= *O.* × *wildhaberi* Reinhard

Habitus similis ei *O. militaris*. Folia longe ovata, acumine brevissimo latiusculo apiculata. Inflorescentia brevis, densiflora. Bracteae iis *O. militaris* longiores, illis *O. mascula* breviores. Color florum iis *O. militaris* similis. Sepala apice recurvata, petala lata. Labellum latissimum, papillis sanguineis ornatum, lobis lateralibus indistinctis vel plane deficientibus. Calcaris longitudo intermedia inter illas parentum.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. × *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich.
= × *Gymnanacamptis odoratissima* Wildhaber

Habitus et folia iis *Anacamptidis pyramidalis* similia. Inflorescentia longe ovata ad cylindrica. Flores dilute rosei, parvi. Sepala lanceolata, acuta. Labellum indivisum, tantum leviter sinuatum, lobis lateralibus et callis laminaribus carens. Calcar breve (1,5–2 mm), acutum, ab ovario reclinatum. Pollinia disco glutinoso communi insidentia. Odor florum fortis et suavis, eo *Gymnadeniae odoratissimae* similis.