

**Zeitschrift:** Boissiera : mémoires de botanique systématique  
**Herausgeber:** Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève  
**Band:** 24 (1975-1976)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Rapport sur la Flore d'Afrique cnetrale : 1970 à 1973  
**Autor:** Bamps, Paul  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-895568>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Rapport sur la Flore d'Afrique centrale — 1970 à 1973

PAUL BAMPS

### 1. Progrès accomplis dans l'étude de la Flore d'Afrique centrale (Zaïre — Rwanda — Burundi) de 1970 à 1973

Secrétaire de rédaction: Paul Bamps

Continuant la publication de la Flore sous forme de fascicules séparés, la Direction du Jardin botanique national de Belgique a décidé de changer l'appellation de la *Flore du Congo, du Rwanda et du Burundi* en *Flore d'Afrique centrale (Zaïre — Rwanda — Burundi)*.

En mai 1971, le secrétaire de rédaction, M. R. Boutique, cheville ouvrière de la Flore depuis son début en 1948, a pris sa retraite et nous lui avons succédé. Nous tenons à lui exprimer un hommage bien chaleureux, auquel je pense tous les botanistes africains voudront bien s'associer, pour le travail considérable et souvent bien ingrat que R. Boutique a réalisé.

Depuis le dernier congrès de l'AETFAT tenu à Munich en septembre 1970, les familles de Spermatophytes suivantes ont été publiées:

*Amaryllidaceae* (D. Geerinck, déc. 1973: 16 espèces) — *Bixaceae* (S. Lisowski, F. Malaisse & J. J. Symoens, oct. 1970: 1 espèce) — *Boraginaceae* (A. Taton, nov. 1971: 31 espèces) — *Cabombaceae* (S. Lisowski, F. Malaisse & J. J. Symoens, oct. 1970: 1 espèce) — *Cornaceae* (P. Bamps, nov. 1971: 1 espèce) — *Gentianaceae* (R. Boutique, déc. 1972: 47 espèces) — *Guttiferae* (P. Bamps, oct. 1970: 47 espèces) — *Hypoxidaceae* (D. Geerinck, nov. 1971: 3 espèces) — *Juncaceae* (S. Lisowski, F. Malaisse & J. J. Symoens, déc. 1973: 6 espèces) — *Lecythidaceae* (L. Liben, nov. 1971: 4 espèces) — *Lentibulariaceae* (P. Taylor, août 1972: 29 espèces) — *Mayacaceae* (R. Boutique, nov. 1971: 1 espèce) — *Myrothamnaceae* (S. Lisowski, F. Malaisse & J. J. Symoens, déc. 1970: 1 espèce) — *Oleaceae* (L. Liben, sept. 1973: 22 espèces) — *Oliniaceae* (L. Liben, sept. 1973: 1 espèce) — *Plantaginaceae* (S. Lisowski, F. Malaisse & J. J. Symoens, oct. 1972: 3 espèces) — *Primulaceae* (R. Boutique, oct. 1971: 12 espèces) — *Sphenocleaceae* (M. Thulin, déc. 1973: 1 espèce) — *Valerianaceae* (A. Lawalrée, juil. 1972: 1 espèce).

Soit au total, pour les 4 années écoulées: 228 espèces.

Pour les Ptéridophytes, les fascicules suivants ont été publiés: *Blechnaceae* (A. Lawalrée, févr. 1971: 3 espèces) — *Lindsaeaceae* (K. U. Kramer, nov. 1971: 2 espèces) — *Osmundaceae* (J. Lewalle, déc. 1973: 1 espèce) — *Schizaeaceae* (A. Lawalrée, sept. 1970: 5 espèces).

Soit au total, pour les 4 années écoulées: 11 espèces.

Sont actuellement à l'étude les familles de Phanérogames suivantes: *Alismataceae* (J. J. Symoens) — *Aponogetonaceae* (H. Van Bruggen, manuscrit terminé) — *Araliaceae* (P. Bamps, manuscrit terminé) — *Bignoniaceae* (L. Liben) — *Butomaceae* (J. J. Symoens) — *Campanulaceae* (M. Thulin) — *Cucurbitaceae* (M. Keraudren-Aymonin, manuscrit terminé) — *Ebenaceae* (F. White) — *Flacourtiaceae* part 2 (H. Sleumer & G. Gilbert) — *Lemnaceae* (J. L. De Sloover) —

*Lobeliaceae* (M. Thulin) – *Loganiaceae* (A. Leeuwenberg) – *Myrsinaceae* (A. Taton) – *Taccaceae* (S. Lisowski, F. Malaisse & J. J. Symoens) – *Thymelaeaceae* (A. Robyns).  
 Pour les Ptéridophytes: *Lycopodiaceae* (A. Lawalrée) – *Marsileaceae* (E. Launert).

## 2. Progrès accomplis dans l'exploration botanique de l'Afrique

De nombreuses récoltes ont été effectuées, de 1970 à 1974, en Afrique tropicale, principalement au Zaïre, au Rwanda et au Burundi, par des collaborateurs du Jardin botanique national de Belgique, où ils ont déposé soit leur collection originale soit une importante collection de doubles (le nombre de numéros est donné entre parenthèses).

Angenot (Univ. Liège): Rwanda (35) – Auquier (Univ. Liège): Zaïre (Kivu) et Rwanda (932) – Bamps (BR): Côte-d'Ivoire et Mali (324), Zaïre (Kivu) et Rwanda (587), Angola (642) – Bamps, Symoens & Vanden Berghen (BR): Rhodésie (905) – Baudet (BR): Burundi (157) – Bercovitz (LSHI): Zaïre (Shaba) – Bokdam (WAG): Zaïre (Haut-Zaïre) – Bouxin (BR): Rwanda (1509) – Bouxin & Radoux (BR): Rwanda (2003) – Breyne (BR): Zaïre (Bas-Zaïre) (503), Rép. centrafricaine (239) – Bulaimu (LSHI): Zaïre (Shaba) (343) – Carrington (WAG): Zaïre (Haut-Zaïre) – Coget (BR): Zaïre (Shaba) (150) – Coppejans (Univ. Gent): Rép. sud-africaine – Dalebroux (BR): Dahomey (40) – Darcis (BR): Zaïre (Shaba) (34) – De Plaen (BR): Togo (86) – De Sloover (BR): Réunion (92) – Dujardin (BR): Zaïre (Bas-Zaïre) (135) – Ern (BR): Zaïre (Kivu) (129) – Etienne (BR): Rwanda (23) – Evrard (BR): Zaïre (360) – F. Hallé (BR): Zaïre (Bas-Zaïre) (35) – Hulstaert (BR): Zaïre (11) – Jangoux (BR): Tchad (80) – Jans (BR): Zaïre (10) – Lemaire (BR): Zaïre (Shaba) (111) – Léonard (BR): Zaïre (Shaba) et Burundi (24) – Lewalle (BR): Burundi (2469) – Lisowski (POZ): Zaïre (Shaba, Kivu, Haut-Zaïre) – Lisowski, Malaisse & Symoens (EBV): Zaïre (Shaba) (c. 3500) – Lukuesa (EBV): Zaïre (Shaba) – Malaisse (LSHI): Zaïre (Shaba) – Michelson (BR): Rwanda (45) – Ntakyimana (BR): Zaïre (Kivu) (385) – Ohoto (BR): Zaïre (60) – Radoux (BR): Rwanda (40) – Reeckmans (BR): Burundi (2369) – Symoens (EBV): Zaïre (Shaba, Kivu, Bas-Zaïre), Zambie, Rhodésie – Symoens, De Bilde & Schwind (EBV): Zaïre (Shaba) – Thoen (LSHI): Zaïre (Shaba) – Tilquin (BR): Zaïre (61) – Troupin (BR): Zaïre (Kivu) et Rwanda (1301) – Vanden Berghen (BR): Rhodésie et Rép. sudafricaine (54) – Vander Veken (Univ. Gent): Zaïre (Kivu) et Rwanda (1040) – Van Puyvelde (BR): Rwanda (82) – Vermynen (BR): Zaïre (Kivu) (64).

*Observation:* Dans le but d'étudier l'extension de la Région saharo-sindienne dans les déserts de l'Iran, J. Léonard a prospecté ces dernières formations et y a récolté 1053 numéros d'herbier déposés à BR.