**Zeitschrift:** Boissiera : mémoires de botanique systématique

Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève

**Band:** 40 (1988)

Artikel: Monographie du genre Sterigmostemum M. Bieb. (Cruciferae -

Hesperideae)

Autor: Jacquemonod, Fernand

Kapitel: Introduction

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-895484

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

**Download PDF:** 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Introduction

Depuis la parution du premier volume de "Flora Orientalis" (BOISSIER, 1867), dans lequel figurait la totalité des espèces alors connues, le genre *Sterigmostemum* M. Bieb. n'a jamais fait l'objet d'un traitement taxonomique global et encore moins d'une révision. Qui plus est, la définition du genre est restée quasiment inchangée depuis sa description par MARSCHALL VON BIE-BERSTEIN (1819). Le genre *Sterigmostemum* était donc aussi mal défini que la plupart de ses représentants étaient mal connus. Cet état de choses devait être encore souligné dans le volume de "Flora Iranica" consacré aux Crucifères (HEDGE & RECHINGER, 1968). Il s'avéra nécessaire d'englober dans cette étude, les genres *Anchonium* et *Zerdana*, considérés à tort ou à raison comme proches de *Sterigmostemum*.

Débrouiller les relations mal précisées liant Sterigmostemum à certaines espèces d'Asie centrale, récemment réunies dans le genre Oreoloma Botsch., nécessita également la prise en considération de ce dernier genre. L'étude de la position systématique de Sterigmostemum et des genres affins, envisagée surtout sous le rapport de la morphologie de l'indument, entraîna des investigations dans la totalité des genres composant les deux tribus des Hesperideae et des Matthioleae, investigations dont les conclusions seront sommairement exposées dans la partie générale. Cependant, précisons-le d'emblée, les liens unissant ces deux tribus paraissant des plus étroits, elle seront le plus souvent désignées comme un groupe (de genres) Hesperideae-Matthioleae.