

# Abrahamia revoluta

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **71 (2017)**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**28. *Abrahamia revoluta*** Randrian. & Lowry, **spec. nova** (Fig. 25).

**Typus:** MADAGASCAR. **Prov. Antsiranana:** Rég. SAVA, Vohémar, forêt littoral au S de Vohémar, [13°21'S 50°00'E], 1-19.XII.1966, fr., *Service Forestier 24318A* (holo: P [P06168913]!; iso-: MO-05056713!).

**Diagnosis** *Abrahamia revoluta* Randrian. & Lowry can be distinguished from its congeners by its glabrous leaves with undulate and revolute margins and semicraspedodromous secondary veins.

**Description** Trees 15-20 m tall, 21.6 cm DBH; young twigs glabrous, lenticellate. Leaves opposite or subopposite; blade obovate, 3.2-9 × 1.4-3.8 cm, subcoriaceous, apex retuse, sometimes emarginate, margin revolute, undulate, base cuneate, both surfaces glabrous, venation semicraspedodromous, midvein prominent abaxially, secondary veins 15-30 pairs, more or less parallel, 2-4(-5) mm apart, raised on both leaf surfaces, tertiary veins not visible on both surfaces; petiole 5-13 mm long, 0.5-1 mm in diam., canaliculate on adaxial surface, usually glabrous. *Inflorescence* and *flowers* unknown. *Infrutescence* terminal. *Fruits* 2.5-2.7 × 1.3-1.5 cm, glabrous, with longitudinal striations.

**Distribution, ecology and phenology** *Abrahamia revoluta* occurs in NE Madagascar from S of Vohémar to the southern part of the Masoala peninsula (Map 9). Fruiting material has been gathered between October and December.

**Conservation status** *Abrahamia revoluta* has a minimum AOO of 12 km<sup>2</sup> and only one of its three extant subpopulation occurs within a protected area (Masoala) whereas the other two were collected in areas where future decline is expected in terms of quality of habitat. It has therefore been assigned a preliminary status of “Endangered” [EN B2ab(iii)] using the IUCN Red List Categories and Criteria (IUCN, 2012).

**Notes** *Abrahamia revoluta* most closely resembles *A. ditimena*, with which it shares obovate leaves with a retuse apex that are similar in size and the number of secondary veins. However, *A. revoluta* differs by its subcoriaceous (vs coriaceous) leaves, semicraspedodromous (vs craspedodromous) venation, revolute and undulate (vs entire and flat) leaf margins, obscure (vs raised and visible) tertiary venation on the lower leaf surface, terminal (vs terminal or axillary) infrutescences, and glabrous (vs velutinous) fruits.

**Paratypes** MADAGASCAR. **Prov. Antsiranana:** versant NW de la Montagne d'Ambre, forêt d'Ankarefo (Ankazobe), 19-21.X.1954, y. fr., *Service Forestier 11357bis* (P, MO). **Prov. Toamasina:** Maroantsetra, Masoala Peninsula, S of Ambanizana, 15°40'24"S 49°57'51"E, 110-260 m, 29.XI.1994, ster., *Vasey et al. 176* (MO, TAN).



**Fig. 25.**  
*Abrahamia revoluta* Randrian. & Lowry.  
**A.** Fruiting branch; **B.** Fruit. [Service Forestier 24318A, M0] Drawings: R.L. Andriamiarisoa