

Etudes chromosomiques de quelques Phanérogames d'Iran, II

Autor(en): **Ghaffari, Seyed Mahmood**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **111 (1988)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-89291>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ÉTUDES CHROMOSOMIQUES DE QUELQUES PHANÉROGAMES D'IRAN, II

par

SEYED MAHMOOD GHAFFARI

AVEC 2 PLANCHES

INTRODUCTION

Cette note représente notre deuxième contribution à l'étude caryologique des Phanérogames d'Iran (GHAFFARI 1986). Elle concerne 15 taxons, dont 6 endémiques iraniens. Une attention particulière a été portée au comportement méiotique. Cependant, comme nos fixations ont été réalisées sur le terrain, nous ne pouvons pas exclure tout à fait que certaines des irrégularités observées tiennent plus à l'état physiologique de la plante (défaut de turgescence) qu'à son génotype. Or, de toute évidence, seules les perturbations d'ordre génomique sont révélatrices des processus microévolutifs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les numérations chromosomiques ont été réalisées sur des boutons floraux prélevés dans des populations naturelles. Le matériel a été fixé sur place dans l'alcool acétique (3:1). Après 24 h, il a été transféré et conservé dans l'éthanol à 70%. Les anthères ont été colorées et écrasées dans le carmin acétique à 2% additionné de Fe. Le montage permanent a été effectué dans la térébenthine de Venise (WILSON 1945).

Des témoins de nos récoltes sont conservés dans les herbiers du «Research Institute of Forests and Rangelands (TARI)».

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

Les résultats sont exposés par ordre alphabétique des familles et des genres. Les nombres chromosomiques affectés d'un astérisque (*) mettent en évidence les résultats nouveaux ou différents des données publiées par d'autres auteurs.

Asteraceae

Centaurea aucheri (DC.) Wagenitz subsp. *elbursensis* Wagenitz, $n = 9^*$.
Tehran: Ab-ali. 7864.

Espèce polymorphe, *C. aucheri* occupe un vaste territoire compris entre la partie orientale de l'Anatolie et la moitié nord-ouest de l'Iran. Son subsp. *elbursensis* est confiné dans les montagnes de nord-ouest de l'Iran. Diploïde (pl. I A), il offre une anaphase I partiellement asynchrone.

Centaurea carduiformis DC. subsp. *iranica* Wagenitz, $n = 10^*$. Tehran: Sorkhe-Hesar. 12664.

Comme l'espèce précédente, *C. carduiformis* appartient à l'élément irano-touranien, mais offre un caractère nettement moins orophile. Son subsp. *iranica*, diploïde (pl. I B), est un endémique centro-iranien rare et disséminé.

Centaurea ustulata DC., $n = 8^*$. Tehran: SW. 6464.

Endémique centre et ouest iranien, *C. ustulata* offre une méiose perturbée, les anaphases I et II étant asynchrones (pl. I C).

Lactuca undulata Ledeb., $n = 9^*$. Firouz-kouh: 25 km de Ghaemshahr. 18364.

L. undulata appartient à l'élément méridional est-européen et ouest-asiatique. La méiose de cette espèce diploïde est régulière (pl. I D).

Outreya carduiformis Jaub. et Spach, $n = 16^*$. Tehran: 10 km de Karaj. 5764.

Outreya représente un genre monotypique inféodé aux *Carduinae*. Son aire coïncide avec celle du domaine floristique oriental (au sens de MEUSEL et al. 1965). Son nombre chromosomique $n = 16$ (pl. I E) peut être interprété comme diploïde ($x = 16$), plusieurs genres subordonnés à la même sous-tribu offrant un nombre de base relativement élevé, par exemple $x = 17$ chez *Cirsium*, *Jurinea*, *Silybum*, *Notobasis*, etc.

Varthemia persica DC., $n = 8^*$. Firouz-Kouh: 25 km de Ghaemshahr. 18764.

Orophyte de l'Iran, de l'Afghanistan, du Pakistan et du Turkménistan, *V. persica* est diploïde (pl. I F).


Brassicaceae

Malcolmia behboudiana Rech. f. et Esfand., $n = 7^*$. Ahvaz: 20 km de Hamidyya. 3664.


Espèce orientale, *M. behboudiana* est diploïde. Son nombre chromosomique correspond à celui établi sur les autres espèces du genre.

Matthiola longipetala (Vent.) DC., $n = 7$. Ahvaz: 20 km de Hamidyya. 3564. Saveh: 40 km de Qom. 12064.

Les deux populations étudiées possédaient $n = 7$ chromosomes confirmant ainsi le résultat antérieur d'ARYAVAND (1978). En revanche,



Microphotographies de divisions méiotiques. A: *Centaurea aucheri*, $n = 9$. Anaphase I (un seul pôle). B: *Centaurea carduiiformis*, $n = 8 \text{ II} + 1 \text{ IV}$. C: *Centaurea ustulata*, $n = 8$ anaphase II très irrégulière. D: *Lactuca undulata*, $n = 9 \text{ II}$. E: *Outreya carduiiformis*, $n = 16 \text{ II}$. F: *Varthemia persica*, $n = 8 \text{ II}$. G: *Malcomia behboudiana*, $n = 7 \text{ II}$. H: *Campanula khorasana*, $n = 14 \text{ II}$. I: *Silene montbretiana*, $n = 12 \text{ II}$, les 2 chromosomes B sont signalés par une flèche. J: *Silene swertiifolia*, $n = 12 \text{ II}$. K: *Londesia eriantha*, $n = 9 \text{ II}$. L: *Scutellaria multicaulis*, $n = 11 \text{ II}$. M: *Astragalus mollis*, $n = 8 \text{ II}$.



Microphotographies de divisions méiotiques. A-E: *Astragalus macropelmatus*. A: Pont chromatique et fragment (flèches). B: Anaphase II. C: Anaphase II, pont et fragment (flèches). D: Anaphase I tardive, avec 1 chromosome retardataire (flèche). E: Anaphase I, ségrégation régulière (8-8). F-I: *Matthiola longipetala*. F: Anaphase I (3 cellules), pont et séparation tardive d'un bivalent (flèches). G: Diakinese (3 cellules) offrant 7 II. H: Anaphase I, pont et séparation tardive d'un bivalent (flèches). I: Anaphase I, séparation tardive d'un bivalent (flèche) et ségrégation régulière 7-7 (cellule du haut).

MAASSOUMI (1980) a publié $n = 6$. Dans les méioses de notre matériel, un bivalent offrait une ségrégation tardive, un pont chromatique pouvant persister jusqu'en fin d'anaphase I (pl. II F-I). Cette irrégularité pourrait expliquer la numération sans doute erronée de MAASSOUMI.

Campanulaceae

Campanula khorasanica (Rech. f. et Aellen) Rech. f., $n = 14^*$. Tehran: Sorkhe-Hesar. 12864.

Endémique iranien, *C. khorasanica* offre un nombre de base rare ($x = 14$ ou 7) pour le genre *Campanula* (pl. I H).

Caryophyllaceae

Silene montbretiana Boiss., $n = 12^* + 0 - 2$ B. Karaj: Asara. 9563.

La méiose de *S. montbretiana* paraît très régulière; les 12 bivalents portent généralement un chiasma par bras, d'où leur configuration préférentielle en anneau, moins fréquemment en bâtonnet. Occasionnellement, les figures méiotiques offraient 1 ou 2 chromosomes B (pl. I I).

Silene swertiifolia Boiss., $n = 12$. Karaj: Asara. 15764.

Le nombre chromosomique et la morphologie des chromosomes en méiose correspondent à ceux de l'espèce précédente. Toutefois, aucun chromosome B n'a été observé (pl. I J).

Chenopodiaceae

Londesia eriantha F. et M., $n = 9^*$. Ahvaz: 20 km de Hamidyya. 4764.

La méiose de *L. eriantha* s'est révélée très régulière, offrant 9 bivalents à la diacinèse (pl. I K).

Fabaceae

Astragalus macropelmatus Bunge, $n = 8$. Tehran: 10 km de Karaj. 17563.

Notre observation confirme le résultat publié par ARYAVAND (1983).

Au cours des anaphases I et II, diverses figures (ponts chromatiques, fragments acentriques) révèlent le caractère hétérozygote pour une inversion paracentrique de notre matériel. D'autres images offrant des chromosomes retardataires ou des associations multiples témoignent sans doute aussi de mutations structurales (pl. II A-E).

Astragalus mollis M. B., $n = 8^*$. Tehran: 10 km de Karaj. 6964.

Comme la majorité des Astragales étudiés jusqu'ici, *A. mollis* est diploïde avec $x = 8$ (pl. I M).

Lamiaceae

Scutellaria multicaulis Boiss. subsp. *multicaulis*, $n = 11^*$. Saveh: 40 km de Qom. 12164.

Espèce propre aux montagnes de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan, *Sc. multicaulis* a différencié plusieurs sous-espèces. La sous-espèce type, endémique de l'Iran, est donc diploïde. Son nombre de base ($x = 11$) correspond à celui trouvé dans les autres espèces du genre (pl. I L).

Remerciements

J'exprime ma reconnaissance au D^r E. Esfandiari, ainsi qu'au D^r M. Iranshar, pour l'identification de notre matériel.

Résumé

Les nombres chromosomiques de 15 espèces appartenant à 11 genres ont été déterminés. Treize taxons dont 6 endémiques n'avaient jamais fait l'objet de contrôles cytologiques. Une attention particulière a été portée au comportement méiotique des espèces étudiées.

Zusammenfassung

Der Autor hat die Chromosomen und das Meioseverhalten von 15 Arten aus 11 Gattungen untersucht. Zum ersten Mal werden die Chromosomenzahlen von 13 davon 6 endemischen Sippen angegeben.

Summary

Original chromosome observations, including number for 15 taxa representing 11 genera are reported. Six of these are endemic to Iran, and 13 species are reported for the first time. Paracentric inversion, laggard chromosomes and accessory chromosomes were noted in some species.

BIBLIOGRAPHIE

- ARYAVAND, A. — (1978). Contribution à l'étude cytotaxonomique des crucifères de l'Iran, II. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 101: 95-106.
— (1983). IOPB Chromosome number reports L. *Taxon* 32 (3): 505.
- GHAFFARI, S. M. — (1986). Chromosome studies in some flowering plants of Iran. *Rev. Cytol. Biol. Végét. Bot.* 10: 3-8.
- MAASSOUMI, A. A. Ramak — (1980). Crucifères de la Flore d'Iran. Etude caryosystématique. Thèse de doctorat de spécialité. *Strasbourg*, 83 pp.
- MEUSEL, H., JAEGER, E. et WEINERT, E. — (1965). Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora, I. Text. 583 pp. *Jena*.
- WILSON, G. B. — (1980). The venetian turpentine mounting medium. *Stain Technology* 20: 133-135.