

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 2 (1924-1926)

Artikel: Begoniaceae novae
Autor: Candolle, C. de
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879124>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BEGONIACEAE NOVAE

AUCTORE

† C. de CANDOLLE

Begonia Corredorana C. DC., sp. nov.; ramulis haud dense villosis, foliis longe petiolatis e basi inaequilatera et cordata ovatis apice breviter acuminatis utrinque haud dense villosis, margine serrulatis denticulis apice setulosus, petiolo dense villosus; inflorescentiae longe pedunculatae late ramosae, pedunculo parce villosus, ramulis adultis subglabris, floribus fem. sat longe pedicellatis 2-lobis, lobis obovatis integris glabris, stylis a basi liberis apice 2-fidis laciniis spiraliter papilliferis, capsulae globosae glabrae 3-alatae ala maxima transverse elongata oblonga apice obtusa aliis marginiformibus.

Herba ut videtur erecta. Ramuli in sicco 7 mm. crassi, fasciculis intramedullaribus nullis. Limbi a petiolo ad 13 cm. longi et 9 cm. lati in sicco tenuiter membranacei pellucidi et pellucido-punctati mesophyllo cystolithis (cystotyliis Fell.) atque cellulis sclerenchymatosis fibriformibus praedito. Petioli 12 cm. longi. Inflorescentiae pedunculus ad 13 cm. longus. Capsulae maturae 5 mm. longae, pedicellus fere 1 cm. longus, ala maxima 15 mm. longa fere 7 cm. lata. Styli 3 caduci. Placentae bipartitae lamellis undique ovuliferis.

Llanos de Corredor, Costa-Riva méridional. Mars, en fruits (Pitt. n. 10954 in h. Brux).

Begonia fusibulba C. DC., sp. nov.; caule erecto setuloso; foliis modice petiolatis oblique ovatis basi subaequilatera repando-subcordatis apice acute acuminatis ambitu acute 5-6-dentatis serratisque utrinque setulosus, palmatinerviis; petiolis dense setulosus; cymis axillaribus 1-2-floris brevibus; floris masc. sepalis 2 rotundatis, antheris obovatis filamenta aequantibus numerosis; floris fem. 2-lobi, lobis obovatis extus setulosus margine crenulatis, stylis liberis, linearibus apice lunulatis; capsula elliptica alisque parce setulosus, alis apice obtusis ala maxima oblonga horizontali.

Radix bulbosus bulbo fusiformi. Caulis 30 cm. alt. in sicco ruber 2 mm. crassus. Folia alterna. Limbi in sicco membranacei a petiolo 6 cm. longi, 4 cm. lati. Petioli circiter 2 cm. longi. Flores rosei. Floris masc. stamina in apice columnae inserta, antherae rimis longitudinalibus dehiscentes. Capsulae pedicellus 16 mm. longus puberulus bracteolis 2 ovato-acuminatis 4 mm. longis fultus. Capsulae 3-locularis 1 cm. longae ala maxima + 15 mm. longa, 9 mm. lata. Stylorum lunulae supra papilliferae. Placentae bipartitae lamellis utrinque ovuliferis. Species sectionis *Gircondia* Alph. DC., stylis basi haud connatis insignis.

Mexico, Sierra Madre, 1200 m. alt. in solo granitico. Decembri (E. Langlassé n. 591 in h. Cand.).

Begonia Batesii C. DC., sp. nov. ; foliis longissime petiolatis, limbis rotundato-ovatis apice breviter cuspidatis 5 cm. supra basin peltatis margine integris utrinque sparsim et ad nervos densius pilosis nervis 10 a petiolo divaricantibus, petiolis haud dense pilosis, inflorescentiis masc. ex. apice ramulorum radicanthum ortis apice 2-3-floris longiuscule pedunculatis et haud dense pilosis, floris masc. sepalis 2 rotundato-ellipticis integris extus hirtellis, petalis 0, staminibus adultis basi in columnam brevem connatis antheris oblongis filamenta superantibus, inflorescentiis femineis ignotis, flore femin. 2-lobo lobis ovatis extus sat dense pilosis, stylis 4 fere a basi liberis apice 2-fidis lobis arcuatis extus margine haud spiraliter papillosis, ovario ellipsoideo sat dense piloso exalato 4-loculari.

Herba monoica verisimiliter repens vel epiphytica pilis filiformibus caulibus radicanthibus floriferis circiter 3 mm. crassis. Foliorum limbi circiter 19,5 cm. longi, 15 cm. lati, in sicco membranacei, cystolithis 0, stomatibus sparsis ; petioli ad 23 cm. longi. Inflorescentiarum masc. pedunculis circiter 6 cm. longis apice 2-3-floris, floribus longe pedicellatis pedicellis ad 3 cm. longis, sepalis circiter 15 mm. longis, antheris 3 mm. longis. Flores feminei cum specimine servati lobis circiter 12 mm. longis, placentis integris utrinque dense ovuliferis.

Species cum nulla auctorum sectione congruens.

In declivitate silvestri prope Nkomo R. 80 mill. a Gaboon, Maio (S. H. Bates n. 475.).
