

# Notice sur la nomenclature de quelques Graminées

Autor(en): **Becherer, A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **7 (1936-1938)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-880550>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# NOTICE

## SUR LA NOMENCLATURE DE QUELQUES GRAMINÉES

PAR

**A. BECHERER**

---

En appliquant les *Règles internationales*, nous avons été obligé, au cours de nos travaux de classement des Graminées des herbiers du Conservatoire Botanique de Genève, de changer à plusieurs reprises la nomenclature adoptée par les auteurs. Nous énumérons ci-dessous les changements les plus importants, rendant ainsi valables nos noms restés jusqu'à maintenant des *noms d'herbier*. Pour le cas de l'*Agrostis tenella* Roem. et Schult. = *A. Schraderiana* Becherer, nous renvoyons à la note que nous avons publiée dans le *Bulletin de la Société Botanique Suisse*, vol. 48, p. 282-283 (1937).

***Apluda mutica*** L. *Spec. pl.*, ed. 1, p. 82 (1753) em. Rendle in *Journ. Linn. Soc. [London]* XXXVI, p. 379 (1904) = *A. varia* Hackel in Engl. u. Prantl *Nat. Pflanzenfam.* II, 2, p. 26 (1887) et ap. DC. *Monogr. Phanerog.* VI, p. 196 (1889); Dur. et Schinz *Consp. Fl. Afr.* V, p. 696 (1894); Hooker *Fl. Brit. Ind.* VII, p. 150 (1896); Hackel et Schinz ap. Sarasin et Roux *Nova Caledonia, Bot.*, I, 1, p. 70 (1914); E. G. et A. Camus ap. Lecomte *Fl. Indo-Chine* VII, p. 281 (1922).

*A. mutica* L. ssp. ***mutica*** (L.) Becherer, comb. nova = *A. mutica* L. l. c. (1753), s. str.; Balansa in Morot, *Journ. de Bot.* IV, p. 83 (1890); Honda *Monogr. Poac. Jap.*, p. 367 (1930); C. E. C. Fischer ap. Gamble *Fl. Madras*, p. 1750 (1934) = *A. varia* ssp. *mutica* Hackel ap. DC. l. c., p. 197 (1889); Dur. et Schinz l. c. (1894); Hooker l. c. (1896); Hackel et Schinz l. c. (1914) = *A. varia* var. *mutica* Hosseus in Engl. *Bot. Jahrb.* XLV, p. 371 (1911); E. G. et A. Camus l. c., p. 283 (1922).

*A. mutica* L. ssp. **aristata** (L.) Becherer, comb. nova = *A. aristata* L. *Amoen. Ac.* IV, p. 303 (1759) ; Pal. Beauv. *Agrost.*, p. 133 (1812) ; Balansa l. c. (1890) ; Fischer l. c. (1934) = *A. varia* ssp. *aristata* Hackel ap. DC. l. c., p. 199 (1889) ; Dur. et Schinz l. c. (1894) ; Hooker l. c. (1896) = *A. varia* var. *aristata*<sup>1</sup> Williams in *Bull. Herb. Boiss.*, 2<sup>me</sup> sér., IV, p. 221 (1904) ; Stapf ap. Prain *Fl. Trop. Afr.* IX, p. 40 (1917) ; E. G. et A. Camus l. c., p. 283 (1922) = *A. mutica* var. *aristata* Rendle l. c. (1904) ; Handel-Mazzetti *Symb. Sin.* VII, p. 1310 (1936).

Le nom adopté pour l'espèce collective par Hackel et les auteurs qui ont suivi l'éminent agrostologue, est contraire aux *Règles* (2<sup>me</sup> éd., art. 44 ; 3<sup>me</sup> éd., art. 50).

**Calamagrostis avenacea** (J. F. Gmelin) Becherer, comb. nova = *Avena filiformis* Forster *Prodr.*, p. 9 (1786) = *Agrostis avenacea* J. F. Gmelin ap. L. *Syst.*, ed. 13, p. 171 (1791) = *Deyeuxia filiformis* Petrie ap. Chilton *Subant. Isl. N. Zeal.* II, p. 474 (1909) ; Domin *Beiträge z. Fl. u. Pflanzengeogr. Austr.*, livr. 3, in *Bibl. Bot.*, fasc. 85 III, p. 351 (1915) = *Cal. filiformis* Pilger in *Dansk Vidensk. Selsk. Biol. Medd.* III, 2, p. 9 (1921) ; Blank *Fl. South Austr.*, part I, p. 69 (1922) ; Ewart *Fl. Vict.*, p. 171 (1930) (non *C. filiformis* Griseb. 1868, spec. Ind. or.) ; voir, pour les autres synonymes, Domin, l. c., p. 351-352.

Cette espèce, qui figure chez les auteurs australiens tantôt sous *Deyeuxia*, tantôt sous *Calamagrostis*, ne peut porter, dans le genre *Calamagrostis*, l'épithète de *filiformis* (*Règles*, 2<sup>me</sup> éd., art. 51 ; 3<sup>me</sup> éd., art. 61) ; nous l'avons classée dans nos collections sous le nom de *Cal. avenacea* (J. F. Gmelin).

**Sesleria seslerioides** (All.) Becherer, comb. nova = *Poa seslerioides* All. *Fl. Ped.* II, p. 246 (1785) = *Oreochloa pedemontana* Reuter ap. Boissier et Reuter *Pug.*, p. 126 (1852) ; Godr. ap. Gren. et Godr. *Fl. Fr.* III, p. 454 (1855) ; Nyman *Consp.*, p. 796 (1878-82) ; Husnot *Gram.*, p. 14 (1896) ; Rouy *Fl. Fr.* XIV, p. 168 (1913) = *Sesleria pedemontana* Reuter [Exs. 1843 et] ap. Nyman *Syll.*, p. 438 (1854-55) ; Aschers. et Graebn. *Syn.* II, 1, p. 323 (1900) = *Oreochloa seslerioides* Richter

<sup>1</sup> C'est à tort que E. G. et A. Camus (l. c., p. 283) attribuent cette combinaison à Rendle.

*Pl. Eur.* I, p. 70 (1890) ; Fournier *Quatre Fl. France*, fasc. 1-2, p. 38 (1934) = *Sesleria disticha* var. *pedemontana* Fiori ap. Fiori et Paol. *Fl. an. It.* I, p. 78 (1896) ; Fiori *N. Fl. an. It.* I, p. 117 (1923).

**Melica Lilloi** Becherer, nom. nov. = *M. laxiflora* Cav. f. *macrior* Hackel in *Ann. Cons. et Jard. bot. Genève* 17<sup>me</sup> année, 1913, p. 297 (1914) = *M. decumbens* Papp in *Fedde Repert.* XXV, p. 139 (1928) (non *M. decumbens* Weber 1778 quae = *Danthonia* ; nec *M. decumbens* Thunb. 1794, spec. Afr. austr.).

Des échantillons représentant le type du *M. decumbens* Papp se trouvent dans l'herbier Delessert ainsi que l'indique Papp (l. c., p. 140). Il s'agit du n° 11180 de l'herbier argentin de Stuckert, leg. Lillo 1912, que Hackel avait déterminé comme *M. laxiflora* Cav., « f. *macrior*, *panicula simplicior* ». Malheureusement, le nom choisi par Papp ne peut être maintenu (*Règles*, 2<sup>me</sup> éd., art. 51 ; 3<sup>me</sup> éd., art. 61).

**Festuca Philippii** Becherer, nom nov. = *F. dumetorum* Phil. in *Linnaea* XXXIII, p. 297 (1864-65) ; Saint-Yves in *Candollea* III, p. 261 (1927) (non *F. dumetorum* L. 1762 quae = *F. rubrae* var.).

L'art. 61 des *Règles* (3<sup>me</sup> éd.) ne permet pas de conserver le nom de Philippi.

**Festuca caprina** Nees *Fl. Afr. austr.*, p. 443 (1841) em. Becherer = *F. nubigena* Jungh. in *Nat. Geneesk. Arch. Neerl. Ind.* II, p. 51 (1845) em. Saint-Yves *Clav. an.*, p. 78 (1927) et in *Candollea* IV, p. 94 (1929).

*F. caprina* Nees ssp. **eu-nubigena** (Saint-Yves) Becherer, comb. nova = *F. nubigena* Jungh. ssp. *eu-nubigena* Saint-Yves *Clav. an.*, p. 79 (1927) et in *Candollea* IV, p. 94 (1929).

*F. caprina* Nees ssp. **caprina** (Nees) Becherer, comb. nova = *F. nubigena* Jungh. ssp. *caprina* Saint-Yves *Clav. an.*, p. 79 (1927) et in *Candollea* IV, p. 96 (1929).

**Bromus remotiflorus** (Steudel) Becherer, comb. nova = *Festuca pauciflora* Thunb. *Fl. Jap.*, p. 52 (1784) ; Willd. *Spec. pl.* I, p. 425 (1798) ; Kunth *Enum.* I, p. 409 (1833) ; Steudel *Syn. Glum.* I, p. 315 (1855) ; Honda *Monogr. Poac. Jap.*, p. 55 (1930) = *F. remotiflora* Steudel l. c. (1855) ; Pilger in *Engl. Bot. Jahrb.* XXIX, p. 226 (1900) =

*Schedonorus remotiflorus* Miq. *Fl. Jap.*, p. 171 (1867) = *B. pauciflorus* Hackel in *Bull. Herb. Boiss.* VII, p. 713 (1899) ; Rendle in *Journ. Linn. Soc.* [London] XXXVI, p. 430 (1904) ; Matsumura *Ind. Pl. Jap.* II, 1, p. 44 (1905) (non *B. pauciflorus* Schumacher ex Hornem. *Fl. Dan.*, vol. VIII, text. ad tab. 1383 [1810] ; nec *B. pauciflorus* Willd. ex Steudel *Nom.*, ed. 2, p. 228 [1840]).

Dans le genre *Bromus*, le nom spécifique donné par Thunberg ne peut être conservé (*Règles*, 2<sup>me</sup> éd., art. 51 ; 3<sup>me</sup> éd., art. 61).