

Gentiana bavarica var. nov. toepfferi Leiris & Moreau nouvelle variété violette de Gentiana bavarica L.

Autor(en): **Moreau, Richard**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **17 (1959-1961)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-880408>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Gentiana bavarica var. nov. toepfferi Leiris & Moreau
nouvelle variété violette de *Gentiana bavarica* L.

par

Richard MOREAU

(Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie, Besançon, France)

Au cours de nos herborisations d'août 1957, dans les montagnes de Samoëns (Haute-Savoie), en compagnie de M. H. DE LEIRIS, nous avons trouvé sur quelques dizaines de mètres carrés, une abondante floraison de *Gentiana bavarica* L. à fleurs violettes. Ces exemplaires étaient disséminés parmi d'autres pieds dont les pétales étaient normalement bleu foncé. Cette station se trouve sur une crête qui s'élève dans la région du Col d'Anterne, parmi des gazons dominant un petit escarpement calcaire. Cette station a été retrouvée dans le même état en août 1958 et en juillet 1959 par H. DE LEIRIS.

Cette découverte n'est pas sans importance car les variations de couleur sont très rares dans ce groupe de Gentianes. Seul BEAUVERD avait décrit, en 1911 (in *Bull. Soc. bot. Genève* ser. 2, 3: 305), un *G. bavarica* L. var. *discolor* Beauv., découvert au Rawyl, dans le Valais, entre 2200 et 2400 m. d'altitude. Cette variété diffère du type (corolle bleu foncé, feuilles caulinaires relativement allongées, calice à divisions atteignant presque le haut du tube de la corolle) par ses petites feuilles presque rondes, le calice à divisions plus courtes, atteignant à peine le milieu du tube, sa corolle d'un blanc pur à l'intérieur et d'une nuance mauve lilas sur la marge extérieure des lobes.

La variété *toepfferi*¹ Leiris & Moreau présente une corolle d'un beau violet. Les sinus entre les lobes des pétales sont tachés de blanc. Le calice, dont les divisions atteignent les deux tiers du tube de la corolle, est également violacé. Les feuilles sont petites, arrondies à ovales.

Quelques pieds de *Gentiana bavarica* var. *toepfferi* ont été cultivés en 1957 et 1958 au Jardin Botanique de la Jaysinia, à Samoëns, Haute-Savoie (altitude 740 m. environ). Ils ont parfaitement proliféré et présentaient en 1958, de nombreuses pousses assez courtes, à feuilles petites, obovales; ils n'ont pas fleuri. Malheureusement, les pieds ont disparu en 1959.

¹ Nous dédions cette variété à l'écrivain suisse R. TOEPFFER, dont l'alerte récit publié au siècle dernier dans les *Nouvelles Genevoises*, contribua tant à faire connaître le Col d'Anterne.

Comme le signalait BEAUVERD à propos de sa variété *discolor*, la variété *toepfferi* est également très saillante par ses individus qui se rencontrent par touffes en compagnie du type à fleurs bleues.

DIAGNOSE:

Gentiana bavarica L. var. nov. **toepfferi** Leiris & Moreau, foliis caulinis calyceque brevioribus, corolla violacea a typo differt.

Hab. Gallia: haec nova varia invenitur in prato alpium, situm in regione loci qui vocatur « Col d'Anterne » et proximus est vico cui vulgo nomen est « Servoz ».

Leg. ipse die 6 mensis Augustii 1957 et 2 mensis Augustii 1958.