

New *Erodium* species from Iran

Autor(en): **EI-Oqlah, A. A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **40 (1985)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879776>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

New *Erodium* species from Iran

A. A. EL-OQLAH

RÉSUMÉ

EL-OQLAH, A. A. (1985). Une nouvelle espèce d'*Erodium* d'Iran. *Candollea* 40: 153-155. En anglais, résumé français.

Une espèce nouvelle provenant d'Iran est décrite: *Erodium iranicum* El-oqlah.

ABSTRACT

EL-OQLAH, A. A. (1985). New *Erodium* species from Iran. *Candollea* 40: 153-155. In English, French abstract.

A new species is described from Iran, *Erodium iranicum* El-oqlah.

Introduction

The new species *Erodium iranicum* belongs to the subgenus *Barbata* GUITTONNEAU (1972) section *Absinthoides* (Brumh) GUITTONNEAU (1972). The closest species to *E. iranicum* is *E. ciconium*. The main differences between the two species are restricted to the characteristics of the mericarp pits; in *E. iranicum* the pits on both side of the mericarp are covered with convex caps, the caps are hairy with glanduloses, while the pits in the *E. ciconium* are open without any caps.

***Erodium iranicum* El-oqlah sp. nov.**

A *E. ciconium* L'Hérit. foveis mericarpiorum operculibus convexibus, lobis inferioribus foliorum generaliter ovatis atque crenatis, foliis dense glandulosis recedit.

Herba hirsuta; rami erecti ramosi. Stipula minute pubescentia, ovata vel lanceolata. Petiolus 5.5 cm longus, teres vel subteres. Lamina 6.0 × 5.5 cm, ovata, utrinque hirsuta, pinnatisecta, infra usque ad nervum centram partita; lobis basalibus 3 × 2 cm, ovatis, crenatis; -ilis densis, glandulosis vel glandulis nullis. Sepala 20 × 6 mm, persistentia, oblonga, vulgo hirsuto-glandulosa; apice mucronate; mucrone 3 mm longo. Filamenta staminum complanata, ciliata. Mericarpium (10-)13(-15) cm longum, hispidum, setosum, apice foveatum; fovea operculo convexo atque glanduloso munita; rostrum 8 cm longum, crassum, aristatum.

Annual, 35 cm tall, with erect branched stem, hirsute, with a vertical tap-root; leaves 11.5 cm long; stipules ovate or lanceolate, brown and leathery, with very narrow white membranous margin, puberulent; petiole 5.5 cm terete in outline, clothed with long eglandular and long or sessile glandular hairs. Lamina 6 × 5.5 cm, ovate in outline, pinnatisect with lower margin fully incised to midrib resulting in 2 basal lobes 3 × 2 cm, ovate with crenate margin, lamina hirsute on both sides, glandular hairs dense usually mixed with eglandular. Umbels lateral and terminal, solitary with 3 flowers. Peduncles (4.5-)7.5(-10.5) cm clothed with glandular hairs; bracts (4-)5.1(-6.5) mm, ovate or lanceolate mucronate, leathery, glandular, hairy, ciliate with white membranous margin. Pedicels (3-)4(-5) cm, dense glandular hairy sepals, 20 × 6 mm in fruit, oblong with mucro 3 mm long. Sepals glandular hirsute. Fertile stamens, filaments broadly expanded at base, tapering to a point, ciliate at the margin in the middle. Staminodes ovate mucronate and ciliate at margin. Mericarp (10-)13(-15) mm, setose clothed with yellowish white shiny stiff hairs, the hairs arising from pockets, mericarp tapering to a fine stipe recurved onto the adaxial side. Pits of mericarp covered by convex caps, the caps glandular hairy. Beak 8 cm long, thickly aristate clothed with stiff brown unequal hairs, twisted at the base.




Fig. 1. — **A**, shows the convex cap which cover the mericarp in *E. iranicum*. **B**, shows the pits without convex cap in *E. ciconium*.

Type: Iran, Shiras, in rupestribus apricis prope pagum Gere inter Abuschir et Shiras, *Kotschy 40*, 14.iii.1842 (K).

The sheet at Kew has three specimens mounted on it: a, is the type of *E. iranicum*; b, is *E. gruinum* (L.) L'Hérit. and c, is *E. laciniatum* var. *pulverulentum* (Cav.) Boiss., another sheet of this gathering in "BM" has three specimens of *E. gruinum* (L.) L'Hérit. only. This species is known only from the single specimen at Kew. Further collections of Kotschy 40 must be carefully verified before being assigned to *E. iranicum*. Figure 1 shows the convex caps from different views.

REFERENCES

- BOISSIER, E. (1867). *Flora orientalis*. Vol. 1, Genève & Bâle.
- BRUMHARD, P. (1905). *Monographische Besicht der Gattung Erodium*. Inaugural Dissertation, philosophischen Fakultät der Breslan. Königl. Universität Breslan.
- EIG, A. (1932). Revision of the *Erodium* species of Palestine. *Beih. Bot. Centralbl.* 50/2: 226-240.
- GUITTONNEAU, G. (1972). Contribution à l'étude biosystématique du genre *Erodium* L'Hérit. dans le bassin méditerranéen occidental. *Boissiera*: 20. Genève.
- SCHONBECK-TEMESY, E. (1970). Geraniaceae. In: K. H. RECHINGER, *Flora Iranica*. Graz.

