

**Zeitschrift:** Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

**Herausgeber:** Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

**Band:** 5 (1915)

**Heft:** 2

  

**Artikel:** Le coelastrum proboscideum Bohl. : étude de planctologie expérimentale

**Autor:** Rayss, Tscharna

**Kapitel:** Planches

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-821083>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Explication des planches.

### *Planches.*

1. Milieu à NaCl (0,2%) Petits cénobes souvent en dissociation. Types *Chlorella* et *Polyedrium*. Texte page 17.
  2. » NaCl (0,4%) Prédominance des cellules isolées. Multiplication des pyrénoides.
  3. » NaCl (0,6%)
  4. » NaCl (1%)
  5. » NaCl (2%)
  6. Milieu à glucose (1%) Voir une cellule couverte de perles. Tous les stades de désarticulation.
  7. » glucose (2%) Cénobes géants.
  8. » glucose (3%) Cellules monstres par déformation des cénobes.
  9. » glucose (5%) » » » »
  10. Influence de la température. Texte page 20.  $\frac{1}{3}$  Detmer additionné de sucre (2%) et maintenu au thermostat à 25°.  
11. Môme milieu maintenu à 33°.
  12. Influence de l'oxygène. Texte page 21. Culture anaérobie (sous une couche d'huile).
  13. » » Môme composition du milieu: Erlenmeyer à accès d'air normal. Voir dans le cénobe du centre comment s'attachent les cellules entre elles. De côté, un cénobe en dissociation complète.
  14. » » Texte page 22—23. Culture au fond d'un tube étroit contenant du Detmer sucré solidifié par l'agar-agar.
  15. Influence de l'oxygène. Milieu sucré solide: fond de l'éprouvette (2 fois plus près de la surface).
  16. » » Aspect de la colonie au-dessous de la surface au contact du milieu solide.
  17. » » Surface des colonies.
  18. Influence de la peptone. Texte page 26. Peptone à 1%. Cellules vacuolisées et remplies d'huile.
  19. Influence de l'agar sur les milieux peptonisés. 1% de peptone en milieu solide. Môme apparence des cellules, mais à contenu moins altéré. Texte page 29 et 32.
  20. Influence des acides. Texte page 37. 1,75% de phosphate acide de K. Petits cénobes à 8 cellules au maximum.
-







































