

Zeitschrift: Elemente der Mathematik
Herausgeber: Schweizerische Mathematische Gesellschaft
Band: 22 (1967)
Heft: 1

Artikel: Zur Zerlegung von Permutationen in elementfremde Zyklen
Autor: Rätz, J.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-25351>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Dann kommutiert die Figur für alle Urbilder von $n = 2$, nämlich für $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$. Für ein $n > 2$ seien Injektionen π von $\mu^{-1}\{1, 2, \dots, n-1\}$ in N und ϱ von $\alpha^{-1}\{1, 2, \dots, n-1\}$ in N sowie eine Bijektion φ von $\alpha^{-1}\pi\mu^{-1}\{1, \dots, n-1\}$ auf $\mu^{-1}\varrho\alpha^{-1}\{1, \dots, n-1\}$ so definiert, dass das Diagramm kommutativ ist. Hat dann n die Primfaktorzerlegung $n = \prod_{\nu} p_{\nu}^{q_{\nu}}$ mit paarweise verschiedenen Primzahlen p_{ν} , so existieren genau $m_n := \prod (q_{\nu} + 1)$ formal verschiedene Zerlegungen $n = a_{\nu} b_{\nu}$ in natürliche Zahlen a_{ν}, b_{ν} ($1 \leq \nu \leq m_n$). Wenn $N - \varrho\alpha^{-1}\{1, \dots, n-1\} =: \{c_1, c_2, \dots\}$ mit $c_1 < c_2 < \dots$ ist, dann definiere man $\varrho(1, n-1) := c_1$, $\varrho(2, n-2) := c_2, \dots$, $\varrho(n-2, 2) := c_{n-2}$.

Ferner setze man $\pi(a_1, b_1) := d_1, \dots, \pi(a_{m_n-1}, b_{m_n-1}) := d_{m_n-1}$, sofern $N - \pi\mu^{-1}\{1, \dots, n-1\} =: \{d_1, d_2, \dots\}$ mit $d_1 < d_2 < \dots$ gilt. Sodann wähle man $\pi(a_{m_n}, b_{m_n})$ aus $N - (\pi\mu^{-1}\{1, \dots, n-1\} \cup \{d_1, \dots, d_{m_n-1}\})$ so gross, dass

$$\pi(a_1, b_1) + \dots + \pi(a_{m_n}, b_{m_n}) - m_n \geq m_{\varrho(1, n-1)} + \dots + m_{\varrho(n-2, 2)} + 2$$

gilt. Da es beliebig grosse natürliche Zahlen l gibt, für die m_l einen vorgegebenen Wert ≥ 2 hat, kann man eine Zahl $\varrho(n-1, 1)$ aus $N - (\varrho\alpha^{-1}\{1, \dots, n-1\} \cup \{c_1, \dots, c_{n-2}\})$ mit der Eigenschaft

$$\pi(a_1, b_1) + \dots + \pi(a_{m_n}, b_{m_n}) - m_n = m_{\varrho(1, n-1)} + \dots + m_{\varrho(n-2, 2)} + m_{\varrho(n-1, 1)}$$

bestimmen. Dann haben die Mengen $\alpha^{-1}\pi\mu^{-1}(n)$ und $\mu^{-1}\varrho\alpha^{-1}(n)$ gleiche Elementzahl, und φ lässt sich fortsetzen zu einer Bijektion von $\alpha^{-1}\pi\mu^{-1}\{1, \dots, n\}$ auf $\mu^{-1}\varrho\alpha^{-1}\{1, \dots, n\}$. Auf diese Weise sind rekursiv Peano-Abbildungen π, ϱ und eine Bijektion φ von $N \times N$ auf sich mit der Eigenschaft $\mu\pi^{-1}\alpha = \alpha\varrho^{-1}\mu\varphi$ konstruiert. Nimmt man für τ schliesslich eine beliebige Peano-Abbildung und setzt $\sigma := \tau\varphi$, dann gilt $\mu\pi^{-1}\alpha\sigma^{-1} = \alpha\varrho^{-1}\mu\tau^{-1}$, womit auch der zweite Teil des Satzes bewiesen ist.

J. SPILKER, Freiburg i. Br.

LITERATUR

- [1] H. GAO, *Solution to a Problem of S. Ulam*, Sci. Sinica 13, 1005–1006 (1964).
- [2] K. KOPFERMANN, *Lösung eines Problems über Peano-Abbildungen*, Math.-Phys. Semesterber. 10, 273–275 (1964).
- [3] S. ULAM, *A Collection of Mathematical Problems*, Interscience, New York 1960.

Zur Zerlegung von Permutationen in elementfremde Zyklen

1. Definitionen und Bezeichnungen

Ausgehend von der Tatsache, dass jede Permutation φ abgesehen von der Reihenfolge auf genau eine Weise in elementfremde Zyklen zerfällt¹⁾, ordnen wir φ ihre *Zykelzahl* $z(\varphi)$ zu; hierbei sind die eingliedrigen Zyklen mitzuzählen. Eine Permutation φ von n Elementen mit $z(\varphi) = k$ nennen wir fortan eine (n, k) -Permutation, und es bezeichne $p(n, k)$ deren Anzahl. Die $(n, 1)$ -Permutationen werden auch «zyklisch» genannt, und im Falle $n \geq 2$ heissen die $(n, n-1)$ -Permutationen *Transpositionen*.

Es sollen in dieser Note die Zahlen $p(n, k)$ bestimmt und eine durch sie auf natürliche Weise induzierte Klassifikation der Permutationen betrachtet werden. Dabei beschränken wir uns auf die Behandlung des nichtentarteten Falles $1 \leq k \leq n$.

¹⁾ Vergleiche zum Beispiel [1], p. 10 oder [3], p. 28.

das heisst (e) $(j + 1 + k + 1, k + 1) \in S$. Aus (c) und $[(d) \Rightarrow (e)]$ folgt (f) $A_{j+1} \subset S$, und aus (a) und $[(b) \Rightarrow (f)]$ folgt $A_j \subset S$ für alle $j \geq 0$ ganz. Somit ist $A \subset S$ und nach der Definition von S sodann $A = S$, q.e.d.

Auf Grund von (5) besteht der folgende Zusammenhang der $p(n, k)$ mit den STIRLINGSchen Zahlen $s(n, k)$ erster Art²⁾:

$$p(n, k) = |s(n, k)| \quad [1 \leq k \leq n]. \quad (6)$$

3. Wertetabelle für $p(n, k)$

	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$	$k = 7$	$k = 8$	...
$n = 1$	1								
$n = 2$	1	1							
$n = 3$	2	3	1						
$n = 4$	6	11	6	1					
$n = 5$	24	50	35	10	1				
$n = 6$	120	274	225	85	15	1			
$n = 7$	720	1764	1624	735	175	21	1		
$n = 8$	5040	13068	13132	6769	1960	322	28	1	
.....									

4. Eine Klassifikation der Permutationen

Setzt man in der bekannten Identität

$$x(x+1) \cdots (x+n-1) = \sum_{k=1}^n c(n-1, n-k) x^k = \sum_{k=1}^n p(n, k) x^k \quad [n \geq 1] \quad (7)$$

$x = 1$ bzw. $x = -1$, so ergibt sich

$$n! = \sum_{k=1}^n p(n, k) \quad [n \geq 1] \quad (8)$$

bzw.

$$0 = \sum_{k=1}^n (-1)^k p(n, k) \quad [n \geq 2]. \quad (9)$$

(8) ist in trivialer Weise deutbar, und (9) führt zu einer Aufteilung aller Permutationen von n Elementen $[n \geq 2]$ in zwei gleichmächtige Klassen, wenn die in (9) mit positiven Posten gezählten Permutationen zu der einen, die übrigen zur anderen Klasse gehören sollen. Dass diese Klassifikation mit der wohl wichtigsten Klassifikation der Permutationen übereinstimmt, sagt

Satz 2. Eine (n, k) -Permutation $[n \geq 2]$ ist genau dann gerade, wenn gilt:

$$k \equiv n \pmod{2}.$$

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass für eine beliebige Permutation φ und eine beliebige Transposition τ die Beziehung

$$z(\tau \varphi) \equiv z(\varphi) \pmod{2} \quad (10)$$

besteht. Ist nämlich $(a_i a_j)$ der einzige zweigliedrige Zyklus von τ , so ist die Wirkung von τ auf φ bei der Bildung von $\tau \varphi$ die folgende: a) Die zu $(a_i a_j)$ disjunkten Zyklen von φ treten in $\tau \varphi$ unverändert auf. b) Gehören a_i, a_j in φ zum gleichen Zyklus, so wird dieser beim Übergang von φ zu $\tau \varphi$ in zwei Zyklen zerlegt. c) Gehören a_i, a_j zu verschiedenen Zyklen von φ , so werden diese beim Übergang von φ zu $\tau \varphi$ zu einem einzigen Zyklus vereinigt. Damit ist (10) sichergestellt. JÜRGEN RÄTZ, Bern

²⁾ Eine ausführliche Darstellung der Theorie dieser Zahlen findet sich etwa in [2], p. 142ff.

Nachtrag: Nach der Durchsicht der Fahne stellt Verf. fest, dass das Ergebnis von Satz 1 in anderer Weise durch J. RIORDAN, *An Introduction to combinatorial analysis* (Wiley, New York 1958) S. 71 erzielt wurde.

LITERATURVERZEICHNIS

- [1] L. BAUMGARTNER, *Gruppentheorie*, de Gruyter, Berlin 1958 (3. Aufl.).
- [2] CH. JORDAN, *Calculus of Finite Differences*, Chelsea, New York 1947 (2nd edition).
- [3] B. L. VAN DER WAERDEN, *Algebra I*, Springer, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1955 (4. Aufl.).

Kleine Mitteilungen

Zu einer Frage von E. Szekeres

Herrn Prof. Dr. W. SAXER zum 70. Geburtstag gewidmet

1. Einleitung und Antwort

In ihrem Beitrag «Eine Bemerkung zum Artikel: Wissenswertes um das Dreieck», *El. Math.* 21, 35–37 (1966), stellt ESTHER SZEKERES mit Recht fest, dass die Frage, welche Faktoren im allgemeinen Dreieck die Grössenbeziehung von ΣF und ΣI bestimmen würden, noch offen sei. In der vorliegenden Note versuche ich, die Angelegenheit zu klären, wobei wie bei E. SZEKERES O , I , F , H in dieser Reihenfolge Um- und Inkreismittelpunkt, Mittelpunkt des Feuerbachkreises und Höhenschnittpunkt des Dreiecks sei. Doch bedeute ΣP die Summe der in üblicher Weise *orientierten* Abstände des Punktes P von den Dreiecksseiten. Damit gelten die folgenden Resultate nicht nur für das spitzwinklige Dreieck. R und r bezeichnen Um- und Inkreisradius des Dreiecks.

Eine Normale zu OI ist nach PRIMROSE Ort der Punkte mit gleicher Seitenabstandssumme (Beweise in [1] und [2]). Es sei $O \neq I$. Die Dreiecksebene wird von der durch I laufenden Geraden $g \perp OI$ in zwei Halbebenen zerlegt, und wir brauchen einzig abzuklären, ob F und O in ein und derselben Halbebene liegen. Ist dies der Fall, so gilt $\Sigma F > \Sigma I$, da $\Sigma O = R + r > 3r = \Sigma I$. Ebenso ergibt sich $\Sigma F \leq \Sigma I$, je nachdem F in der O nicht enthaltenden Halbebene oder auf g liegt. Das bedeutet vorerst:

$$\nless OIF \less 90^\circ \text{ ist charakteristisch für } \Sigma F \less \Sigma I$$

oder

$$OI^2 + IF^2 \less OF^2 \Leftrightarrow \Sigma F \less \Sigma I.$$

Aus $OI = (R^2 - 2Rr)^{1/2}$, $IF = (R - 2r)/2$ und $OF = OH/2$ folgt damit

$$(R - 2r)(5R - 2r) \less OH^2 \Leftrightarrow \Sigma F \less \Sigma I, \quad (1)$$

wobei $O \equiv I$ ersichtlich miteinbezogen werden kann.

Ist ϱ der (mit Vorzeichen versehene) Inkreisradius des Höhenfusspunktdreiecks, so lässt sich die Äquivalenzrelation wegen $OH^2 = R^2 - 4R\varrho$ auf eine Form bringen, die auf der linken Seite nur noch Radien enthält:

$$R^2 - 3Rr + r^2 + R\varrho \less 0 \Leftrightarrow \Sigma F \less \Sigma I. \quad (2)$$

Soll die linke Seite neben R und r etwa den halben Dreiecksumfang s enthalten, so gewinnen wir aus (1) und der Identität $OH^2 = 9R^2 + 8Rr + 2r^2 - 2s^2$, deren Nachweis sich der Leser zurechtlegen mag, das merkwürdige Resultat

$$\frac{s^2}{Rr} + \frac{r}{R} - \frac{2R}{r} \less 10 \Leftrightarrow \Sigma F \less \Sigma I. \quad (3)$$

2. Zwei Spezialfälle

a) *Das Bezugsdreieck ist rechtwinklig*

Es gilt $\varrho = 0$ und (2) schreibt sich

$$R^2 - 3Rr + r^2 \less 0 \Leftrightarrow \Sigma F \less \Sigma I,$$