

# Kleine Mitteilungen

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Elemente der Mathematik**

Band (Jahr): **24 (1969)**

Heft 5

PDF erstellt am: **22.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*  
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>

$$F(n) = \binom{n-1}{2} + \binom{n}{4} - \frac{(n-2)(n-4)}{8} - E_3(n), \quad (43)$$

$$K(n) = \binom{n}{2} + 2 \binom{n}{4} - \frac{n(n-4)}{4} - 3 E_3(n) \quad (44)$$

mit

$$E_3(n) = \begin{cases} \frac{1}{48} n(n-2)(5n-38), & \text{wenn } n \equiv \pm 2 \pmod{12}, \\ \frac{1}{48} n(n-4)(5n-28), & \text{wenn } n \equiv \pm 4 \pmod{12}. \end{cases} \quad (45)$$

Ist  $n \equiv 0 \pmod{6}$ , so sind alle Punkte aus (25) und (36) Schnittpunkte von mindestens drei Diagonalen. Für  $n > 6$  treten Schnittpunkte von mehr als drei Diagonalen auf, wie sich zum Beispiel durch Einsetzen von  $a = 1$ ,  $b = (2n/3) - 1$ ,  $c = 3$ ,  $d = (5n/6) - 1$  und  $h = n/2$  in (12) und Beachten von (25) zeigt. (42), (43) und (44) mit  $E_3(n)$  aus (40) stellen also für diese regulären  $n$ -Ecke echte obere Schranken dar.

HEIKO HARBORTH, Braunschweig

#### LITERATURVERZEICHNIS

- [1] G. GENTILE, *Punti diagonali e poligoni di divisione di un  $n$ -gono piano convesso*, Boll. Mat. (4) 1, 71–74 (1940).  
 [2] Z. SCHNEIDER und B. STANKOVITSCH, *Über die Anzahl und Anordnung der Diagonalschnitte in einem regelmässigen  $n$ -Eck*, El. Math. 14, 6–11 (1959).  
 [3] H. T. CROFT and M. FOWLER, *On a Problem of Steinhaus About Polygons*, Proc. Cambridge philos. Soc. 57, 686–688 (1961).  
 [4] H. HEINEKEN, *Regelmässige Vielecke und ihre Diagonalen*, L'Enseignement math., II. sér. 8, 275–278 (1962).

*Bei der Korrektur:* Herr Dr. H. HEINEKEN teilte mir inzwischen mit, daß eine Arbeit von ihm zum gleichen Thema in den Rendiconti Sem. U. Padova erscheinen wird.

## Kleine Mitteilungen

### Ein einfacher Beweis der Stirlingschen Formel

Die bekannte Stirlingsche Formel, welche  $n!$  durch eine geeignete einfache Funktion von  $n$  abschätzt, soll hier aus zwei sehr elementaren Hilfssätzen (vgl. [1]) hergeleitet werden.

*Hilfssatz 1.* Für  $x > 0$  gilt  $e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+0,5}$ .

*Beweis.* Es ist

$$\begin{aligned} e^{1/(x+0,5)} &= 1 + \frac{1}{x+0,5} + \frac{1}{2(x+0,5)^2} + \sum_{\nu=3}^{\infty} \frac{1}{\nu!} \frac{1}{(x+0,5)^\nu} < 1 + \frac{2(x+0,5)+1}{2(x+0,5)^2} \\ &+ \frac{1}{6(x+0,5)^3} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{4^j(x+0,5)^j} = 1 + \frac{1}{x} \cdot \frac{6x^2+7,5x+2,5}{6x^2+7,5x+3+(3/8x)} < 1 + \frac{1}{x}. \end{aligned} \quad (1)$$

Nun setzen wir zur Abkürzung

$$n! e^n n^{-n-0,5} = \gamma_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \quad (2)$$

Es folgt

$$\frac{\gamma_{n+1}}{\gamma_n} = \frac{(n+1) e n^{n+0,5}}{(n+1)^{n+1,5}} = \frac{e}{(1+1/n)^{n+0,5}} < 1. \quad (3)$$

Die  $\gamma_n$  bilden eine streng monoton abnehmende Folge. Daraus ergibt sich

$$\gamma_1 = e > \gamma_2 > \gamma_3 \dots; n! < (n/e)^n \sqrt{n} e \quad \text{für } n = 2, 3, \dots \quad (4)$$

Weil die  $\gamma_n$  alle positiv sind, existiert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n! e^n n^{-n-0,5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = \gamma. \quad (5)$$

Jetzt soll  $\gamma$  auch nach unten abgeschätzt werden.

*Hilfssatz 2.* Für  $x > 0$  gilt  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+0,5-(1/4x)} < e$ .

*Beweis.* Wir haben für  $x \geq 0,5$  stets  $x + 0,5 - (1/4x) > 0$  und

$$1 + \frac{1}{x} < 1 + \frac{1}{x+0,5-(1/4x)} + \frac{1}{2(x+0,5-(1/4x))^2} < e^{1/(x+0,5-(1/4x))}, \quad (6)$$

weil

$$2\left(x+0,5-\frac{1}{4x}\right)^2 < 2x\left(x+0,5-\frac{1}{4x}\right) + x; \quad 1 < 4x. \quad (7)$$

Für  $0 < x < 0,5$  ist

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+0,5-(1/4x)} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e.$$

Hiernach ergibt sich aus (3)

$$\frac{\gamma_{n+1}}{\gamma_n} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1/4n}; \quad \gamma_2 = \frac{e^2}{2\sqrt{2}}; \quad \gamma_{n+1} > \frac{e^2}{2\sqrt{2}} \prod_{v=2}^n \left(1 + \frac{1}{v}\right)^{-1/4v}. \quad (8)$$

Führen wir die Bezeichnung

$$\prod_{v=2}^n \left(1 + \frac{1}{v}\right)^{1/v} = P_n \quad (9)$$

ein, dann wird

$$\log P_n = \sum_{v=2}^n \frac{1}{v} \log \left(1 + \frac{1}{v}\right) < \sum_{v=2}^n \frac{1}{v^2} < \frac{1}{4} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots = \frac{3}{4}. \quad (10)$$

Nach (8), (9) und (10) ist

$$\gamma_{n+1} > \frac{e^2}{2\sqrt{2}} e^{-3/16} = \frac{e^{29/16}}{2\sqrt{2}} > 2,12. \quad (11)$$

Damit ist die in (5) definierte Konstante  $\gamma$  abgeschätzt:

$$2,12 < \frac{e^{29/16}}{2\sqrt{2}} \leq \gamma < e < 2,72. \quad (12)$$

$n!$  besitzt die Größenordnung  $e^{-n} n^{n+0,5}$ .

Der wahre Wert von  $\gamma$  beträgt bekanntlich  $\sqrt{2\pi} \approx 2,5066$ . Durch etwas grösseren Rechenaufwand lässt sich  $\gamma$  elementar genauer als in (12) bestimmen.

H.-J. KANOLD, TU Braunschweig

#### LITERATURVERZEICHNIS

- [1] H.-J. KANOLD, *Einige neuere Abschätzungen bei Stirlingschen Zahlen, 2. Art.*, Erscheint in J. reine u. angew. Math.

**Die Wallaceschen Geraden und die Feuerbachschen Kreise  
in einem Sehnenviereck**


Die Punkte  $A_i (i = 1, 2, 3, 4)$  in der natürlichen Anordnung seien die Eckpunkte,  $\alpha_i$  die Innenwinkel eines Sehnenvierecks. Es seien weiter  $Q_i, Q'_i$  die Fusspunkte der Senkrechten, die vom Eckpunkt  $A_i$  auf die Seiten gefällt sind, die nicht durch den Eckpunkt  $A_i$  gehen.  $Q''_i$  seien die Fusspunkte der Senkrechten, die aus dem Eckpunkt  $A_i$  auf die Diagonale gefällt sind, die nicht durch diesen Eckpunkt geht. Die Punkte  $Q_i, Q'_i, Q''_i$  liegen, wie bekannt ist, auf der Wallaceschen Geraden  $s_i$ , die dem Eckpunkt  $A_i$  in bezug auf das Dreieck, das durch die drei übrigen Eckpunkte gebildet ist, zugehört. Dann gilt:

**Satz 1.** Die Wallaceschen Geraden  $s_i (i = 1, 2, 3, 4)$  schneiden einander in einem Punkte  $S$ .

**Satz 2.** Die drei Punktequadrupel  $\{Q_i\}, \{Q'_i\}, \{Q''_i\}$  liegen auf drei konzentrischen Kreisen mit  $S$  als Mittelpunkt, sie bilden die Ecken dreier Sehnenvierecke, die dem gegebenen Viereck  $\{A_i\}$  gegenseitig ähnlich sind. Die vier Strecken  $\overline{Q_i Q''_i}$  sind einander gleich.

Beweis: Da  $Q'_1$  und  $Q'_2$  auf dem Kreis über dem Durchmesser  $\overline{A_1 A_2}$  liegen, gilt

$$\sphericalangle A_2 Q'_1 Q'_2 = \sphericalangle A_2 A_1 A_3 = \sphericalangle A_2 A_4 A_3 \dots, \tag{1}$$



Figur 1

also  $Q'_1 Q'_2 \parallel A_3 A_4$  und ebenso

$$Q'_2 Q'_3 \parallel A_4 A_1, \quad Q'_3 Q'_4 \parallel A_1 A_2, \quad Q'_4 Q'_1 \parallel A_2 A_3 \dots ; \quad (2)$$

das Viereck  $\{Q'_1 Q'_2 Q'_3 Q'_4\}$  ist also gleichwinklig mit dem Viereck  $\{A_1 A_2 A_3 A_4\}$ , und da die Diagonale  $Q'_1 Q'_3$  mit  $Q'_1 Q'_2$  nach (1) den gleichen Winkel bildet wie die homologen Stücke  $A_1 A_3$  und  $A_1 A_2$ , so folgt der Hilfssatz: *Durch die Zuordnung  $A_i \rightarrow Q'_i$  ist eine gegensinnige Ähnlichkeitsabbildung der Ebene auf sich bestimmt.*

Es sei jetzt  $O$  der Mittelpunkt,  $r$  der Halbmesser des Umkreises des gegebenen Sehnenvierecks  $\{A_1 A_2 A_3 A_4\}$ .

Wir zeigen, dass den vier Geraden  $O A_i$  bei dieser Abbildung die vier Geraden  $s_i$  entsprechen. Nun ist der Winkel zwischen  $s_1$  und  $Q'_1 Q'_2$  nach (2) gleich dem Winkel zwischen  $s_1$  und  $A_4 A_3$  und damit (Sehnenviereck  $A_1 A_4 Q_1 Q'_1$ ) gleich dem Winkel  $A_4 A_1 Q'_1$ , der das Komplement von  $\sphericalangle A_1 A_4 A_2$  darstellt (der Hälfte des Zentriwinkels  $A_1 O A_2$ ). Die Gerade  $s_1$  bildet also mit der Seite  $Q'_1 Q'_2$  denselben Winkel, wie die Gerade  $A_1 O$  mit der Seite  $A_1 A_2$ .

Die Geraden  $s_i$  gehen also alle durch einen Punkt  $S$ , der in jener Abbildung dem Punkt  $O$  entspricht, womit Satz 1 bewiesen ist. Indirekt kann man auch die Umkehrung dieses Satzes beweisen.

Entsprechend (2) gelten


$$Q_1 Q_2 \parallel A_3 A_4, \quad Q_2 Q_3 \parallel A_4 A_1, \quad Q_3 Q_4 \parallel A_1 A_2, \quad Q_4 Q_1 \parallel A_2 A_3$$

und die analogen Relationen

$$Q''_1 Q''_2 \parallel A_3 A_4, \quad Q''_2 Q''_3 \parallel A_4 A_1, \quad Q''_3 Q''_4 \parallel A_1 A_2, \quad Q''_4 Q''_1 \parallel A_2 A_3.$$

Soweit es sich hier nicht um Identitäten handelt, sind sie wie (2) zu beweisen. Es gilt also der Satz 2.

**Satz 3.** *Der Schnittpunkt  $S$  der Wallaceschen Geraden  $s_i$  des Satzes 1 ist der gemeinsame Punkt der vier Feuerbachschen Kreise  $F_i$ , die durch die Dreiecke  $\{A_j A_k A_m\}$  bestimmt sind ( $i, j, k, m$  eine beliebige zyklische Permutation der Zahlen 1, 2, 3, 4).*



Figur 2

Beweis: Bezeichnen wir mit  $O_{ij}$  den Mittelpunkt der Seite  $\overline{A_i A_j}$ , mit  $F_i$  den Feuerbachschen Kreis des Dreiecks  $\{A_j A_k A_m\}$ , mit  $\Sigma_i$  seinen Mittelpunkt ( $i, j, k, m$  eine beliebige zyklische Permutation der Zahlen 1, 2, 3, 4).

Da z. B.  $Q'_2$  Höhenfusspunkt im Dreieck  $\{A_1 A_2 A_3\}$  ist, so ist der Kreis durch  $O_{12}, O_{23}, Q'_2$  der Feuerbachsche Kreis  $F_4$  dieses Dreiecks, sein Radius also gleich  $r/2$ . Um zu zeigen, dass  $S$  auf diesem Kreise liegt, dass also  $\sphericalangle Q'_2 S O_{23} = \sphericalangle Q'_2 O_{12} O_{23}$ , beachte man, dass der erstere als Hälfte des Zentriwinkels  $Q'_2 S Q'_3$  wegen der Ähnlichkeit der Vierecke  $\{A_i\}$  und  $\{Q'_i\}$  auch die Hälfte des homologen Zentriwinkels  $A_2 O A_3$ , also gleich dem Peripheriewinkel  $A_2 A_1 A_3 = \sphericalangle A_2 O_{12} O_{23} = \sphericalangle Q'_2 O_{12} O_{23}$  ist.

Bemerkung: Betrachten wir noch ein gegebenes Sehnenviereck  $\{A_i\}$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$ . Lassen wir z. B. die Eckpunkte  $A_1, A_2, A_3$  fest und auf dem Umkreise wählen wir statt des Eckpunktes  $A_4$  einen anderen Eckpunkt  $A'_4$ . Es sei  $S'$  der Schnittpunkt der Wallaceschen Geraden  $s'_i$  des Vierecks  $\{A_1 A_2 A_3 A'_4\}$ . Nach Satz 3 liegt dieser Schnittpunkt auf dem Kreise  $F'_4$ , der, weil die Punkte  $A_1, A_2, A_3$  fest sind, mit dem Feuerbachschen Kreis  $F_4$  identisch sein muss. Es gilt also

**Satz 4.** Wenn der Punkt  $A_4$  bei fest gegebenen Eckpunkten  $A_1, A_2, A_3$  den Umkreis dieses Dreiecks durchläuft, so beschreibt der Schnittpunkt  $S$  der Wallaceschen Geraden  $s_i$  des Vierecks  $\{A_i\}$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$ , den Feuerbachschen Kreis des gegebenen festen Dreiecks  $\{A_i\}$ ,  $i = 1, 2, 3$ .

Die Mittelpunkte  $\Sigma_i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) der Feuerbachschen Kreise  $F_i$  liegen offensichtlich auf dem Kreise um  $S$ , mit dem Halbmesser  $r/2$ .

Nach der Konstruktion ist

$$S O_{12} \perp \Sigma_3 \Sigma_4, \quad S O_{23} \perp \Sigma_4 \Sigma_1;$$

für die Grösse des Innenwinkels  $\sphericalangle \Sigma_4$  des Sehnenvierecks  $\{\Sigma_i\}$  erhalten wir

$$\sphericalangle \Sigma_4 = 2 R - \sphericalangle O_{23} S O_{12}.$$

Weiter gilt wieder nach der Konstruktion

$$\overline{O_{12} A_2} = \overline{O_{12} Q'_2}, \quad \overline{O_{23} A_2} = \overline{O_{23} Q'_2}$$

daraus folgt

$$\triangle O_{23} Q'_2 O_{12} \cong \triangle O_{23} A_2 O_{12} \quad (3. \text{ Kongruenzsatz})$$

und daher

$$\sphericalangle O_{23} Q'_2 O_{12} = \sphericalangle O_{23} A_2 O_{12} = \alpha_2.$$

Da die Punkte  $O_{23}, Q'_2, S, O_{12}$  auf dem Feuerbachschen Kreise  $F_4$  liegen, folgt augenblicklich

$$\sphericalangle O_{23} Q'_2 O_{12} = \sphericalangle O_{23} S O_{12} = \alpha_2.$$

Dann ist

$$\sphericalangle \Sigma_4 = 2 R - \sphericalangle O_{23} S O_{12} = 2 R - \alpha_2 = \alpha_4.$$

Ähnlich erhalten wir

$$\sphericalangle \Sigma_1 = \alpha_1, \quad \sphericalangle \Sigma_2 = \alpha_2, \quad \sphericalangle \Sigma_3 = \alpha_3.$$

Das Viereck  $\{\Sigma_i\}$  ist also dem Viereck  $\{A_i\}$  winkelgleich; dass dieses Viereck dem Vierecke  $\{A_i\}$  ähnlich ist, ergibt sich aber leicht, wenn man beachtet, dass nicht nur die homologen Seiten, sondern auch die homologen Diagonalen parallel sind (Ähnlichkeitsverhältnis =  $1/2$ ).

Es sei noch  $K$  der Kreis um  $S$ , der alle vier Feuerbachschen Kreise  $F_i$  in den Punkten  $T_i$  berührt. Man kann leicht zeigen, dass das Viereck  $\{A_i\}$  mit dem Viereck  $\{T_i\}$  kongruent ist:

$$\overline{S \Sigma_i} : \overline{S T_i} = 1 : 2; \quad \overline{\Sigma_i \Sigma_j} \parallel \overline{T_i T_j}, \quad \overline{T_i T_j} = 2 \overline{\Sigma_i \Sigma_j} = \overline{A_j A_i}.$$

Der Satz 2 kann also so erweitert werden:

Die Punktequadrupel  $\{Q_i\}, \{Q'_i\}, \{Q''_i\}, \{\Sigma_i\}, \{T_i\}$  liegen auf fünf konzentrischen Kreisen um  $S$ ; sie bilden die Ecken von fünf Sehnenvierecken, die dem gegebenen Viereck  $\{A_i\}$  ähnlich sind. Die vier Strecken  $\overline{Q_i Q''_i}$  sind einander gleich, die Vierecke  $\{A_i\}, \{T_i\}$  kongruent.

JOSEF BREJCHA, Brno

### Angles of a Parallelogram with Vertices in Lattice Points

In the book [1] the following theorem is proved (p. 9).

Let four lattice points be the vertices of a rhombus (being not a square) and  $\alpha$  – its angle. Then  $\alpha/\pi$  is an irrational number.

Here we prove the following generalization of this theorem:

*Let four lattice points be the vertices of a parallelogram and  $\alpha$  – its angle  $\leq \pi/2$ . Then  $\alpha/\pi$  is an irrational number or  $\alpha = 2\pi/n$ , where  $n = 4$  or  $8$ .*

Proof. The area  $S$  of such a parallelogram is given by the formula  $S = xy \sin \alpha$ , where  $x$  and  $y$  are the lengths of non-parallel sides of a parallelogram. It is known that the area of any polygon with vertices in lattice points is a rational number  $q$  (with denominator 1 or 2). Hence

$$q = xy \sin \alpha. \quad (1)$$

$x$  and  $y$  as the distances between lattice points are square roots of integers:  $x = \sqrt{r}$ ,  $y = \sqrt{s}$ . Substituting these values into (1) we get  $\sin \alpha = \sqrt{q^2/rs} = \sqrt{t}$ , where  $t$  is the rational number  $q^2/rs$  and we see that  $\sin \alpha$  is an algebraic number at most of the second degree.

Let  $\alpha$  be a rational multiplicity of  $\pi$ :  $\alpha = 2\pi k/n$ ,  $k, n$  – positive integers,  $(k, n) = 1$ ,  $1 \leq k \leq n/4$ . As follows from the theorem of LEHMER ([2], p. 37–38), for  $n \neq 4$  the number  $2 \sin 2\pi k/n$  is an algebraic integer of degree  $\varphi(n)$ ,  $\varphi(n)/4$  or  $\varphi(n)/2$  according as  $(n, 8) < 4$ ,  $(n, 8) = 4$  or  $(n, 8) > 4$ . We must find all values of  $n$  such that  $\sin 2\pi k/n$  is an algebraic number of degree 1 or 2, i.e.  $\xi = 2 \sin 2\pi k/n$  is an algebraic integer of degree 1 or 2.

1. Suppose  $2 \nmid n$ . Then  $(n, 8) = 1 < 4$  and  $\xi$  is an algebraic integer of degree  $\varphi(n)$ . The only odd integers  $n$  such that  $\varphi(n) = 1$  or  $2$  are 1 and 3.

2. Suppose  $2 \mid n$  and  $4 \nmid n$ . Then  $(n, 8) = 2 < 4$  and  $\xi$  is an algebraic integer of degree  $\varphi(n)$ . The only integers  $n$  such that  $2 \mid n$ ,  $4 \nmid n$  and  $\varphi(n) = 1$  or  $2$  are 2 and 6.

3. Suppose  $4 \mid n$  and  $8 \nmid n$ . Then  $(n, 8) = 4$  and  $\xi$  is an algebraic integer of degree  $\varphi(n)/4$ . The only integers  $n$  such that  $4 \mid n$ ,  $8 \nmid n$  and  $\varphi(n) = 4$  or  $8$  are 12 and 20.

4. Suppose  $8 \mid n$ . Then  $(n, 8) = 8 > 4$  and  $\xi$  is an algebraic integer of degree  $\varphi(n)/2$ . The only integer  $n$  divisible by 8 and satisfying  $\varphi(n) = 2$  or  $4$  is 8.

Because it must be  $n \geq 4$ , it remains to consider only the cases  $n = 4, 6, 8, 12, 20$ .

Evidently  $n = 4$  is possible, because  $\alpha = 2\pi/4$  is an angle of the unit square. Similarly,  $n = 8$  is possible as the acute angle of the parallelogram with vertices  $(0, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(1, 2)$  is equal to  $2\pi/8$ .

Now we exclude the values  $n = 6, 12$  and  $20$ . Suppose that  $(0, 0)$ ,  $(x, z)$ ,  $(y, t)$  and  $(x+y, z+t)$  are the vertices of a parallelogram with the angle  $2\pi/6$  at the vertex  $(0, 0)$ ;  $x, y, z, t$  are integers (evidently  $x^2 + z^2 > 0$ ,  $y^2 + t^2 > 0$ ). Then

$$\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{6} = \frac{xy + zt}{\sqrt{x^2 + z^2} \sqrt{y^2 + t^2}}.$$

Hence

$$x^2 y^2 + x^2 t^2 + y^2 z^2 + t^2 z^2 = 4x^2 y^2 + 8xyz t + 4z^2 t^2$$

or

$$x^2 t^2 - 2xyz t + y^2 z^2 = 3(x^2 y^2 + 2xyz t + z^2 t^2)$$

and  $(xt - yz)^2 = 3(xy + zt)^2$ . This implies

$$xt - yz = 0, \quad xy + zt = 0.$$

We multiply both sides of the first equation by  $x$ , both sides of the second by  $z$  and add; we obtain  $(x^2 + z^2)t = 0$ . Similarly, multiplying by  $-z$  and  $x$ , we get  $(x^2 + z^2)y = 0$ .

Because  $x^2 + z^2 > 0$ , we get  $t = y = 0$ , which is impossible. The angle  $2\pi/12$  is also impossible, because if  $(0, 0)$ ,  $(a, c)$ ,  $(b, d)$ ,  $(a + b, c + d)$  are vertices of a parallelogram with the angle  $2\pi/12$  at the vertex  $(0, 0)$ , then the parallelogram with vertices  $(0, 0)$ ,  $(c, -a)$ ,  $(b, d)$ ,  $(b + c, d - a)$  has an angle  $2\pi/6$ , which has been shown to be impossible.  $n = 20$  is impossible, because  $\sin 2\pi/20 = (\sqrt{5} - 1)/4$ , which is not of the form  $\sqrt{t}$  for rational  $t$ .

We observe that the theorem may be stated in the following equivalent form:

*If  $\alpha = 2\pi k/n$  ( $k, n$  - positive integers,  $n \geq 4$ ,  $k \leq n/4$ ,  $(k, n) = 1$ ) is an angle between two straight lines passing through a lattice point and on each of them there are other lattice points (evidently, infinitely many), then  $n = 4$  or  $8$ ,  $k = 1$ , i.e.  $\alpha = 90^\circ$  or  $45^\circ$ .*

It is evident that the hypothesis, that the straight lines have one lattice point in common, is not essential (we may translate one line).

ANDRZEJ MAKOWSKI, Warsaw, Poland

REFERENCES

- [1] H. HADWIGER und H. DEBRUNNER, *Kombinatorische Geometrie in der Ebene*, Monographies de «l'Enseignement Mathématique» No. 2 (1960).
- [2] I. NIVEN, *Irrational Numbers*, The Carus Mathematical Monographs No. 11 (1956).

**On Hall's Third Definition of Group**

MARSHALL HALL, JR. in [1], p. 6, gave a definition of group in the terms of operation / defined on the pairs of elements of the set S. This operation satisfies the axioms

- L 1.  $a/a = b/b$                       L 2.  $a/(b/b) = a$
- L 3.  $(a/a)/(b/b) = c/b$               L 4.  $(a/c)/(b/c) = a/b$ .

It may be observed that L 3 is superfluous: L 4 and L 1 imply L 3. We put in L 4  $c = a$ :

$$(a/a)/(b/a) = a/b;$$

in virtue of L 1  $a/a = d/d$ , therefore

$$(d/d)/(b/a) = a/b,$$

which is L 3.

Now we prove that any of L 1, L 2, L 4 is independent of the others.

Let  $S = [0, 1]$  and we define operation / by the following tables:

1. $\begin{array}{c cc} & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$	2. $\begin{array}{c cc} & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{array}$	4. $\begin{array}{c cc} & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$ .
---	---	---

The operation defined by the table  $n$  ( $n = 1, 2, 4$ ) does not satisfy L  $n$  and satisfies the remaining two axioms. For  $n = 1$  and 2 it is evident. In the case  $n = 4$  it is also evident that L 1 and L 2 are satisfied; if we put in L 4  $a = c = 0$ ,  $b = 1$  the left-hand side is equal to  $(0/0)/(1/0) = 1/1 = 1$  and the right-hand side is equal to  $0/1 = 0$ .

A. MAKOWSKI, Warsaw

REFERENCE

- [1] MARSHALL HALL, JR., *The Theory of Groups* (Macmillan, New York 1959).