

Bibliographie

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **66 (1973)**

Heft 3

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

s'est produite vers la fin du «range» du genre, la probabilité que les *Nejdia* arabo-malgaches aient un âge Toarcien inférieur paraît très forte.

Dans le schéma de la texte-fig. 4, nous résumons les données biostratigraphiques tirées de la littérature ainsi que la corrélation entre le Toarcien de Madagascar et les standards zonaux NW-européens.

Conclusion

Sur le plan paléontologique nous avons été amené à définir 11 espèces nouvelles et un genre nouveau (*Taffertia* gen. n.). Sur le plan biostratigraphique, nous avons passé en revue les données essentielles que la littérature fournit sur les successions de faunes d'ammonites du Toarcien inférieur méditerranéen. Nous avons constaté qu'une zonation différente de celle utilisée en Europe était nécessaire pour subdiviser ce sous-étage dans les séries méditerranéennes. Pour cette raison, nous avons proposé 2 zones et 3 sous-zones nouvelles identifiables au Maroc, en Algérie en Péninsule Ibérique, en Italie, en Grèce et au Tyrol.

Les sous-zones sont corrélées avec les zones standards européennes (DEAN et al. 1961; GABILLY et al. 1967, 1971).

Nous avons en outre fait état d'arguments nouveaux pour préciser la corrélation entre le Toarcien malgache et NW-européen.

BIBLIOGRAPHIE

- ARKELL, W. J. (1952): *Jurassic Ammonites from Jebel Tuwaiq, Central Arabia*. Phil. Trans. R. Soc. London, ser. B, 236.
- (1957): *Jurassic Geology of the World*. Oliver & Boyd, London.
- ATROPS, F., et ELMI, S. (1971): *Les divisions chronostratigraphiques de l'Oranie occidentale (Algérie) et leurs corrélations*. C. r. Acad. Sci. Paris 273, sér. D.
- ATROPS, F., et al. (1970): *La limite Domérien-Toarcien et l'apparition de la sédimentation marneuse dans le Lias des Monts Rhar-Roubane (Ouest algérien)*. Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord LXI/3-4.
- BEHMEL, H., et GEYER, O. (1966): *Stratigraphie und Fossilführung im Unterjura von Albarracin*. N. Jb. Geol. Pal. Abh. 124/1.
- BLAISON, J. (1967): *Etudes biométriques et révision de l'espèce Protogrammoceras madagascariense (Thevenin) 1908*. Ann. Sc. Uni. Besançon, 3^e Sér. Géol. 3.
- BUCKMAN, S. S. (1909-1930): *Yorkshire Type Ammonites, I-VII*. Wheldon & Wesley.
- CALLOMON, J. H. (1968): *Dimorphism in Jurassic Ammonites*. Dans: *Sexual Dimorphism in Fossil Metazoa*. Schweitzerbart, Stuttgart.
- CANTALUPPI, G. (1968): *Il limite paleontologica Domeriano Toarciano a Molvina (Est di Brescia)*. Atti Soc. It. Sc. Nat. 107/2.
- CANTALUPPI, G., et SAVI, A. (1968): *Le ammoniti di Molino Grasso d'Olona (Varesotto)*. Atti. Soc. Ital. Sci. Nat., Milano, CVII, 3.
- CANTALUPPI, G., et MONTANARI, L. (1969): *La serie domeriana della Val Ceppelline (Alta Brianza)*. Atti Soc. It. Sc. Nat. Milano 109/3.
- COLLIGNON, M. et al. (1959): *Le Lias et le Jurassique moyen de Kandrehu*. B.S.G.F. I, 7.
- COLO, G. (1961): *Contribution à l'étude du Jurassique du Moyen-Atlas Septentrional*. Notes Mém. Serv. Géol. Maroc Mém. 139.
- DEAN, W. T., et al. (1961): *The Liassic Ammonites Zones*. Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol. 4.
- DONOVAN, D. T. (1958): *Ammonites Zones of the Toarcian of Southern Switzerland and Italy*. Eclogae geol. Helv. 51.
- DUBAR, G. (1952): *Succession des faunes d'ammonites de types italiens, au Lias moyen et inférieur, dans le Haut-Atlas marocain*. Congr. Geol. Int. C. r. 19^e s. Sect. 13, fasc. 15. Alger.
- DUBAR, G., et al. (1970): *Remarques sur le Toarcien d'Albarracin et sur sa faune de Bouleiceras*. C.r. Somm. S.G.F. 162/5.

- ELMI, S. (1967): *Le Lias supérieur et le Jurassique moyen de l'Ardèche*. Doc. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon 19.
- FERRETTI, A. (1967): *Il limite Domeriano-Toarciense alla Colma di Domaro (Brescia), stratoripo del Domeriano*. Riv. Ital. Pal. 73/3.
- (1970): *Il limite Domeriano-Toarciense nei gruppi montuosi del Nerone e del Catria (Appennino Marchigiano)*. Riv. Ital. Pal. 76/3.
- FISCHER, R. (1966): *Die Dactylioceratidae der Kammerker*. Verl. bay. Akad. Wiss. Münch. Abh. [N.F.] 126.
- FUCINI, A. (1919): *Il Lias superiore di Taormina ed i suoi fossili*. Pal. Ital. XXV.
- (1920–1935): *Fossili domeriani dei Dintorni di Taormina*. Pal. Ital. XXVI–XXXV.
- GABILLY, J. (1964): *Le Jurassique inférieur et moyen sur le littoral vendéen*. Trav. Inst. Géol. Anthrop. Fac. Sci. Poitiers V.
- GABILLY, J., et al. (1967): *L'étage Toarcien. Zones et sous-zones d'ammonites*. Colloque Jurassique II, Préprint.
- (1971): *Toarcien*. Dans: *Les Zones du Jurassique en France*. C.r. Somm. S.G.F. 6.
- GALLITELLI, M. F. (1969): *Ammonite e stratigrafia del Toarciense umbromarchigiano*. Boll. Soc. Pal. Ital. 8.
- GECZY, B. (1966–1967): *Ammonoïdes jurassiques de Csernye*. Geol. Hung. Ser. Pal. 34–35.
- GUEX, J. (1968): *Note préliminaire sur le dimorphisme des Hildocerataceae*. Bull. Lab. Géol. Uni. Lausanne 173.
- (1971): *Sur la classification des Dactylioceratidae du Toarcien*. Eclogae geol. Helv. 64/2.
- (1972a): *Répartition biostratigraphique des ammonites du Toarcien moyen de la bordure sud des Causses (France) et révision des ammonites décrites et figurées par Monestier (1931)*. Eclogae geol. Helv. 65/3.
- (1972b): *Sur l'âge et la position systématique du genre Nejdia (Arkel)*. Bull. Lab. Géol. Uni. Lausanne 201.
- HAAS, O. (1913): *Die Fauna von mittleren Lias von Ballino in Südtirol*. Beitr. Pal. Geol. Österreich-Ungarns XXVI/II.
- HOWARTH, M. K. (1962): *The Jet Rock Series and Alum Shale Series of the Yorkshire Coast*. Proc. York. Geol. Soc. 33/4.
- KOTTEK, A. (1966): *Die Ammonitenabfolge des griechischen Toarcium*. Ann. Géol. Pays Hellen. XVII, le sér.
- MEISTER, E. (1914): *Zur Kenntnis der Ammonitenfauna des portugiesischen Lias*. Z. Dt. Geol. Ges. 65.
- MOUTERDE, R. (1953): *Une forme d'affinité arabo-malgache, Bouleiceras, dans le Toarcien inférieur de Coimbra*. B.S.G. Portugal XI.
- (1955): *Le Lias de Peniche*. Comm. Serv. Geol. Portugal XXXVI.
- (1967): *Le Lias du Portugal. Vue d'ensemble et division en Zones*. Comm. Serv. Geol. Portugal III.
- (1971): *Une coupe du Lias à Obon aux confins des provinces de Terruel et de Saragosse*. Jurásico de España. Colloque, Madrid.
- MOUTERDE, R., et al. (1964): *Coupe du Lias au Sud de Condeixa*. Comm. Serv. Geol. Portugal XLVIII.
- (1971): *Le Domérien supérieur dans le Subbétique Central (Andalousie)*. Jurásico de España. Colloque, Madrid.
- PINNA, G. (1968): *Ammoniti del Lias superiore (Toarciense) dell'Alpe Turati*. Mem. Soc. Ital. Sci. Nat. Museo Milano XVII.
- RENZ, C. (1912): *Stratigraphische Untersuchungen im portugiesischen Lias*. N. Jb. Min. Geol. Pal. Bd. I.
- SPATH, L. F. (1913): *On Jurassic Ammonites from Jebel Zaghuwan (Tunisia)*. Quart. J. Geol. Soc. LXIX.
- THEVENIN, A. (1908): *Paléontologie de Madagascar, fossiles liasiques*. Ann. Pal. III.

Remerciements

Ce travail a été réalisé grâce à la maison Burrus qui m'a alloué sa Bourse 1972, et qui voudra bien trouver dans ces lignes l'expression de ma reconnaissance. Je remercie également MM. A. Boudda, R. du Dresnay et G. Suter pour leur sympathique accueil au Service Géologique du Maroc, MM. les Professeurs H. Badoux et R. Trümpy qui ont bien voulu lire et critiquer cette note, ainsi que MM. A. El Kadiri, H. Millischer et A. Kandili (Service des Eaux et Forêts) grâce auxquels j'ai bénéficié de grandes facilités sur le terrains.

Manuscrit déposé le 1^{er} mars 1973.