

# Coleoptera: Fam. Histeridae

Autor(en): **Thérond, Jean**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Entomologica Basiliensia**

Band (Jahr): **1 (1975)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-980395>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel

### Coleoptera: Fam. Histeridae

par Jean Théron

**Abstract:** A list is given of 16 species of Histeridae collected in Bhutan.

1. **Abraeomorphus** sp. nov.?

Bhoutan : Gelakha, 1700 m alt., 1 exemplaire le 29 avril.

2. **Coomanister scrobipygum** (Coom.)

*Xestipyge scrobipygum* de Cooman, Bull. Soc. Ent. France, 1932, p. 202; —  
*Coomanister scrobipygum* Kryshanovskij, Ent. Scand., 1972, p. 21.

Répartition connue : l'espèce est décrite du Vietnam.

Bhoutan : sur la route de Thimphu, à 87 kilomètres de Phuntsholing, 1700 m alt. ; 1 exemplaire le 22 mai.

3. **Paromalus omineus** Lew. ?

*Paromalus Omineus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), IX, 1892, p. 36.

Répart. : décrit du Japon.

Bouthan : Thimphu, 1 exemplaire le 14 mai ; — sur la route qui va à Thimphu, à 87 kilom. de Phuntsholing, 1 ex. le 22 mai ; — Gidaphu, 2300 m alt., 1 ex. le 2 juin ; — Nobding, à 41 kilomètres à l'Est de Wangdiphodrang, sur la route de Tongsa, 10 exemplaires le 17 juin.

Ces exemplaires répondent assez bien à la description de *P. omineus* Lew., que je ne connais pas de visu. Il se pourrait, pourtant, qu'il s'agisse là d'une espèce méconnue.

4. **Parepieirus** n. sp.

Bhoutan : à 87 kilomètres de Phuntsholing, sur la route de Thimphu, 1 exemplaire le 22 mai.

Par l'extrême longueur de la deuxième strie dorsale et l'absence de cinquième dorsale et de suturale, cette espèce ne ressemble à aucune de celles que je connais.

5. **Tribalus** nov. sp.

Bhoutan : Samchi, 300 m alt., 1 ex. du 7 au 11 mai.

Très proche de *T. horni* Lew. (décrit de Ceylan et retrouvé dans l'Inde centrale), dont il présente les caractéristiques sauf que, au pronotum, sur le tiers médian de la base, la série de carinules longitudinales est remplacée par une rangée de points ronds.

6. **Apobletes nirvana** Lew.

*Apobletes nirvana* Lewis, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 2, XII, 1891, p. 20.

Répart. : décrit de Birmanie, retrouvé dans Sumatra

Bhoutan : Tongsa, 2150 m alt. 1 exemplaire le 24 juin.

7. **Apobletes schauvi** Mars.

*Apobletes schauvi* Marsoul, Monogr. Hister., Supplmt., 1860, p. 857.

Répartition : Birmanie, d'où il est décrit, Inde, Ceylan, Vietnam, Malaya, Philippines, Bornéo, Java, Sumatra.

Bhoutan : Samchi, 300 m. alt. 1 exemplaire du 7 au 11 mai.

8. **Eurylistes silvestris** (Schm.)

*Platysoma silvestre* Schmidt, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 2, XXXVII, 1897, p. 291. — *Eurylistes silvestre* Bickhardt, Entom. Blatt. 1919, p. 213.

Répartition : Sumatra, Malaya, I. Nias, Inde, Vietnam.

Bhoutan : Phuntsholing, à 87 km sur la route de Thimphu, 1 exemplaire le 22 mai.

9. **Eurylistes duplicans** Coom.

*Platysoma (Eurylistes) duplicans* de Cooman, Rev. franç. d'Entom. XXII, 1955, p. 479.

Répartition : décrit du Vietnam. Je ne pense pas qu'il ait été signalé d'ailleurs.

Bouthan : Khala, à 5 kilom. à l'Est de Phuntsholing, 200—400 m alt., 1 ex. le 25 avril.

10. **Platysoma brahmani** Lew.

*Platysoma brahmani* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), VI, 1910, p. 31.

Répartition ; décrit du Bengale

Bhoutan : Samchi, 300 m alt. 1 ex. du 7 au 11 mai.

11. **Platysoma coomani** Thér.

*Platysoma Coomani* Thérond, Rev. franç. d'Ent. XXII, 1955, p. 124.

Répart. : décrit du Vietnam.

Bhoutan : sur la route de Thimphu, à 87 kilomètres de Phuntsholing, 700 m alt., 8 exemplaires le 22 mai ; — à 21 kilomètres de Wangdiphodrang, sur la route qui va à Tongsa, 1700—2000 m alt. 3 ex. le 17 juin.

12. **Platysoma scalptum** Lew.

*Platysoma scalptum* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), X, 1902, p. 226.

Répartition : décrit de l'Inde. Trouvé aussi au Vietnam.

Bhoutan : Samchi, 300 m alt. 1 exemplaire du 7 au 11 mai.

13. **Platylister strialis** (Mars.)

*Platysoma striale* Marsoul, l'Abeille, I, 1864, p. 301 ; — *Platysoma suturale* Lewis, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 2, VI, 1898, p. 634 ; — *Platysoma (Platylister) striale* Desbordes, Ann. Soc. Ent. France, 18, LXXXV, 1916, p. 397.

Répartition : décrit des I. Célèbes et de Birmanie. Connue aussi du Népal, Vietnam, Bornéo, Sumatra et I. Sumba.

Bhoutan : 300 m alt. 1 exemplaire du 7 au 11 mai.

14. **Platylister cambodjensis** (Mars.)

*Platysoma cambodjense* Marsoul, l'Abeille, I, 1864, p. 300 ; — *Platysoma (Platylister) cambodjensis* Bickhardt, Rec. Indian Mus., 1913, p. 122, et Entom. Mitteil., II, 1913, p. 169 ; — *Platysoma (Platylister) cambodjense* Reichardt, Sborn. entom. odd. Nar. Mus. Praze, X, 1932, p. 115.

Répartition : Cambodge, Vietnam, Inde, Assam, Taïwan, Thaïlande, Tennasserim.

Bouthan : Samchi, 300 m alt., 1 ex. du 7 au 11 Mai.

15. **Grammostethus indicus** (Lew.)

*Hister indicus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), XVI, 1885, p. 209 ; — id. Lewis, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 2, XII, (XXXII); 1891 ; p. 26 ; — *Grammostethus indicus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), XVIII, 1903, p. 400.

Répartition : Birmanie, Inde, Assam.

Bouthan : sur la route de Thimphu, à 87 kilomètres de Phuntsholing, 1700 m alt., 11 exemplaires, le 21 mai ; — Thimphu, 2 ex. le 31 mai.

**16. *Hister coracinus* Er.**

*Hister coracinus* E r i c h s o n , Jahrb. Insect., in Klug, 1834, p. 146; — id. M a r -  
s e u l , Monogr. Hister., 1854, p. 307.

Répartition : Inde, Ceylan.

Bhoutan : Wangdiphodrang, 1300 m alt., 1 exemplaire du 1 au 3 juin ;  
— Punakha, 1400 m alt., 1 ex. le 7 juin.

Adresse de l'auteur :

Jean Thérond, 41, rue Séguier, N î m e s (France)