

Actualité

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Hebamme.ch = Sage-femme.ch = Levatrice.ch = Spendrera.ch**

Band (Jahr): **104 (2006)**

Heft 11

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Thèmes 2007

Avez-vous des suggestions?

Voici les thèmes que «Sage-femme.ch» traitera l'an prochain:

- Janvier: **Dystocie des épaules** (avant le 25 novembre)
- Février: **Les pleurs précoces du nouveau-né** (avant le 20 décembre)
- Mars: **Varia** (avant le 25 janvier)
- Avril: **Bilan de santé fœtale** (avant le 25 février)
- Mai: **Doulas** (avant le 25 mars)
- Juin: **Problèmes de contractions durant un accouchement normal** (avant le 25 avril)
- Juillet/août: **Congrès Olten 2007**
- Sept.: **Qu'apporte l'assurance maternité aux femmes?** (avant le 25 juillet)
- Octobre: **Préparation à la grossesse** (avant le 25 août)
- Nov.: **Allaitement prolongé** (avant le 25 septembre)
- Déc.: **Prise de conscience de son corps de femme aujourd'hui** (avant le 25 octobre)

- Etes-vous inspirée par un des thèmes? Faites-nous signe bien avant le dernier délai indiqué entre parenthèses...
- Connaissez-vous un expert, une expérience, un projet précis? Faites-le-nous savoir...
- Avez-vous des idées sur plusieurs thèmes? Alors, rejoignez sans attendre notre conseil rédactionnel!
- N'hésitez pas à contacter Josianne Bodart Senn, rédactrice romande, par téléphone au 022 364 24 66 ou 079 755 45 38, ou par mail: j.bodartsenn@sage-femme.ch

Enfants allaités

Face aux ruptures, moins d'anxiété

Dans les situations stressantes, les enfants qui ont été allaités seraient mieux armés contre l'anxiété. C'est ce que montre les résultats d'une étude basée sur la «Cohorte anglaise de 1970», une cohorte de près de 9'000 enfants suivis depuis leur naissance, entre autres à 5 ans et à 10 ans. Leur anxiété a été mesurée régulièrement sur une échelle de 1 à 50 par l'intermédiaire de

leurs enseignants. Leurs parents ont été interviewés sur les événements familiaux majeurs.

Résultats: Les enfants nourris au biberon vivent le divorce ou la séparation des parents avec un stress 9,4 fois plus élevé tandis que les enfants allaités vivant la même situation avec un stress 2,2 fois plus élevé (par rapport aux enfants continuant à vivre avec leurs parents).

Pour les chercheurs, l'allaitement en lui-même ne serait pas directement lié au fait de mieux résister au stress, mais il serait un bon marqueur de l'attitude maternelle, plus spécialement d'une interaction parent-enfant qui favorise la résilience de l'enfant.

Source: S.M. Montgomery et al.: Breastfeeding and resilience against psychosocial stress. In: Archives of Disease in Childhood, Aug. 2006.

Glasgow, du 1^{er} au 5 juin 2008

28^e congrès triennal ICM


Au programme: «La profession de sage-femme: un engagement mondial envers les femmes et les nouveaux-nés».

Le cadre unique de ce programme permet diverses activités parmi lesquelles les traditionnels exposés revus par les pairs, des débats sur le travail en cours, des ateliers et des approches innovantes telles que l'art de conter, les réflexions philosophiques, l'art et le théâtre.

Ce programme de qualité offre des possibilités de participation active pendant toute sa durée.

Le thème principal a pour objectif de souligner l'importance de renforcer le métier de sage-femme à l'échelle nationale, locale et communautaire dans différents systèmes de santé.

Cela ne pourra se faire sans un leadership fort, une législation efficace et un partenariat avec les femmes pour mettre en place des services



réactifs et adaptés aux circonstances locales.

Pour en savoir plus: www.midwives2008.org

Contraception masculine

Méthode efficace et réversible

Une revue des essais cliniques menés sur la contraception hormonale masculine indique qu'il suffit de quelques mois après l'arrêt du traitement pour observer un retour à une concentration normale en spermatozoïdes. Ainsi, la moitié des hommes retrouvaient en trois mois et demi une concentration en spermatozoïdes compatible avec un retour à la fertilité.

Ces résultats ont été publiés dans la revue médicale anglaise «The Lancet». Les auteurs de cette étude, le Dr Peter Liu et ses confrères de «l'Hormonal Male Contra-

ception Summit Group» rappellent que la contraception masculine hormonale permet d'obtenir une azoospermie ou une oligospermie sévère (définie par une concentration en spermatozoïdes inférieure à 3 millions par ml de sperme) suffisante dans un but contraceptif.

En procédant à l'examen couplé des données de 30 études sur le sujet, ces auteurs ont recueilli les données de plus de 1500 hommes qui avaient reçu un traitement contraceptif hormonal. Il apparaît ainsi que le retour à la spermatogène-

se après l'arrêt du traitement permet de retrouver une fertilité en quatre ou cinq mois.

«La probabilité typique de retrouver une concentration en spermatozoïdes de 20 millions/ml était de 67% en six mois, 90% en un an, 96% en 16 mois et 100% en deux ans», écrivent les auteurs. Par ailleurs, parmi les facteurs associés à un retour plus rapide à la normale on retrouvait un âge plus avancé, une origine asiatique et une durée de traitement plus courte.

Source: The Lancet, 2006, 367, 1412-20.

Congrès Olten 2007

Présentez vos posters!

Le Poster est un moyen de plus en plus reconnu pour diffuser les résultats d'une étude non publiée ou une innovation clinique. Le Congrès Olten 2007 vous invite à présenter sous forme de Poster un aspect intéressant de votre pratique professionnelle. Ce Poster sera affiché tout au long du Congrès. Les deux meilleurs Posters seront récompensés par SWICA.

Les critères du jury sont:

- Importance et pertinence pour l'activité de la sage-femme ou valorisation de votre propre champ professionnel
- Mise en œuvre professionnelle d'un moyen/outil (méthodologie de la recherche, méthodologie du projet)
- Présentation graphique/Layout
- Conception du Poster (concepts clés, illustration)



Le format idéal est 120 x 180 cm

Le titre du Poster, les auteurs, l'adresse de contact ainsi qu'un résumé en allemand, français ou italien (max. 250 mots) devront parvenir jusqu'au 28 février 2007 à Antoinette Schefer: antoinette_schefer@hotmail.com.

Antoinette Schefer

26 novembre 2006

Votation fédérale sur les allocations familiales

Si elle est acceptée, la nouvelle loi fédérale fixera l'allocation pour enfant à 200 francs par mois au minimum et l'allocation de formation professionnelle à 250 francs au moins. Auraient droit aux allocations familiales toutes les personnes exerçant une activité lucrative salariée ainsi que – et c'est une nouveauté – les indépendants (sans limite de revenu).

Les personnes sans activité lucrative auraient également droit aux allocations familiales, sous réserve toutefois d'éventuelles limites de revenu fixées au niveau cantonal; celles-ci ne seraient cependant pas inférieures à la li-

mite inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).

Par ailleurs, le montant des allocations familiales ne serait pas réduit en cas d'activité lucrative à temps partiel.

Les allocations seraient financées par les employeurs et les indépendants, qui devraient s'affilier auprès d'une caisse de compensation pour allocations familiales. Les cantons pourraient en outre introduire une cotisation obligatoire pour les salariés. Les allocations familiales versées aux petits paysans et aux ouvriers agricoles ne seraient pas concernées par ce projet de loi.

Pour en savoir plus: www.travailsuisse.ch

Prophylaxie de la carie

Deux nouveaux flyers

La Société suisse d'odontostomatologie (SSO) propose deux nouvelles brochures d'information à l'intention des futures mères et jeunes parents. Un groupe de travail interdisciplinaire de l'Association suisse de pédiodontie (ASP) a compilé des informations essentielles concernant un sujet qui mériterait davantage d'attention: une bonne hygiène bucco-dentaire est aussi importante pour la future maman que pour son bébé. Et la prophylaxie de la carie commence dès la première dent de lait!

Deux feuillets d'information, complémentaires l'un à

l'autre, attirent l'attention des futurs parents sur l'importance des soins bucco-dentaires durant la grossesse et les premières années de la vie.

Editées en trois langues officielles du pays (allemand, français et italien), les nouvelles brochures «Des dents saines pour la femme enceinte et son bébé» et «Pour des dents de lait saines» sont des guides pratiques indispensables pour les parents et ceux qui sont en instance de le devenir.

Les sages-femmes, infirmières spécialisées, gynécologues, pédiatres et méde-

cins dentistes sont appelés dès à présent à distribuer ces feuillets qui peuvent être commandés gratuitement (50 exemplaires au minimum) avec la mention



Croyance populaire

Travail déclenché

Certaines croyances populaires le prétendent encore: il suffirait de faire l'amour en fin de grossesse pour provoquer l'accouchement... Le Dr. Jonathan Schaffir et son équipe (université de l'Etat de l'Ohio, USA) ont voulu en avoir le cœur net. Entre juillet 2004 et juillet 2005, ils ont recruté 93 femmes menant une grossesse normale, interrogées durant la 37^e semaine et n'attendant pas de jumeaux.

Résultats: 47 de ces femmes (50,5%) ont déclaré avoir eu des rapports sexuels durant la dernière semaine. Les dates de leur accouchement (39,9 semaines) ne diffèrent cependant guère de celles des femmes qui affirment ne pas avoir eu de rapports sexuels (39,3 semaines): elles ont même accouché un peu plus tard...

Source: J. Schaffir: Sexual intercourse at term and onset of labor. In: Obstetrics and Gynecology, June 2006, 1310.1314.



«Sage-femme» auprès de: SSO-Shop, Postgasse 19, case postale, 3000 Berne 8, répondeur téléphonique: tél. 031 310 20 81, fax 031 310 20 82, mail: info@ssso.ch