

Zeitschrift: Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich

Herausgeber: Geriatriischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

Band: - (2002-2003)

Heft: 78

Rubrik: Altersmythos CII : Qualitätskontrollen verbessern die Pflegequalität in Pflegeheimen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

AHV schon seit Jahrzehnten bewiesen haben. Der Sozialstaat bleibt zudem bezahlbar und muss nicht in wesentlichen Teilen zu einem Fürsorgestaat zurückgebaut werden.



ALTERSMYTHOS CII

Qualitätskontrollen verbessern die Pflegequalität in Pflegeheimen.

Wirklichkeit

Die staatlich vorgeschriebene Einführung von RAI-RUG in amerikanischen Pflegeheimen veränderte die Häufigkeit von Decubital Ulcer nicht.

Begründung

Bei 2'336 Pflegeheimpatient/innen, die mehr als 100 Tage im Heim lebten, vor und bei 2'343 nach Einführung von RAI-RUG-Assessment in 92 Heimen in 22 US-Staaten wurde die Häufigkeit von Decubital Ulcer durch direkte Befragung der Pflegenden erhoben.

- Dekubiti zeigten 8,5% zu beiden Zeitpunkten. Dekubiti im Stadium 2 oder höher (d.h. Ulcer) zeigten 5,3% vs. 5.6% ($P=0.6$).
- Die Kontrollen für die Dekubitus-Risikofaktoren Inkontinenz, Immobilität, Mangelernährung und s.p. Dekubitus, veränderten die Resultate nicht, d.h. die Einführung des verordneten Qualitätsassessmentinstruments RAI-RUG hat die klinisch relevante, eindeutig identifizierbare Outcome-Qualität Dekubitus-Prävalenz nicht beeinflusst.

E.A. Coleman et al: Pressure Ulcer Prevalence in Long-Term Nursing Home Residents Since the Implementation of OBRA '87.