

Zeitschrift: Mémoires de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel
Band: 4.2 (1874)

Artikel: Recherches géologiques et paléontologiques dans le Jura neuchâtelois
Kapitel: Tableau général de répartition des espèces des terrains jurassiques supérieurs du jura neuchâtelois
Autor: Tribolet, Maurice de
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-100111>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

III. TABLEAU GÉNÉRAL

DE

RÉPARTITION DES ESPÈCES DES TERRAINS JURASSIQUES SUPÉRIEURS

DU

JURA NEUCHATELOIS

C espèces observées ou inscrites dans les collections.
 O » simplement indiquées dans les ouvrages.
 P » seulement probables.

ABBREVIATIONS. — Spongilien : S. — Zone des calcaires hydrauliques : Z. — Pholadomien : Ph. — Corallien inférieur : Cl. — Corallien supérieur : CS. — Séquanien inférieur : SI. — Séquanien supérieur : SS. — Pterocérien inférieur : PI. — Pterocérien supérieur : PS. — Virgulien : V.¹ — Portlandien : P.

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	Cl.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.
REPTILES.												
Mosasaurus	Grosjeani, Grepp.	C
Plesiochelys	Jaccardi, (Pict.) Rüt.	C
	Solodurensis, Rüt.	C	C	.	.
Polyptychodon	sp. ?	?	C
Teleosaurus	Picteti, Trib.	P	P	.	C
Thalassemys	Hugii, Rüt.	C
Thaumatosauros	sp. ?	C
POISSONS.												
Asteracanthus	sp. ?	O
Gyrodus	affinis, Pict.	C
Hybodus	sp. ?	O
Lepidotus	Couloni, Trib.	C
Lepidotus	crassus, Nic.	?	C
	lævis, Ag.	O	O	.	C
Odontaspis	macer, (Qu.) Pict.	O
Oxyrhina	Bressaucourtina, Et.	C
Pycnodus	affinis, Nic.	C
	contiguidens, Pict.	O

¹ Vu nos connaissances encore incomplètes de ce terrain, nous avons été obligé de faire ici abstraction de sa faune (voy. p. 87). Nous espérons cependant y revenir plus tard.

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	CI.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.	
Ammonites	callicerus, Opp.	C	P	C	
	canaliculatus, Mü.	C	P	C	
	Chapuisi, Opp.	O	
	chloroolithicus, Gumb.	C	
	Contejeani, Th.	O	
	crenatus, Brug.	C	
	Edwardsi, Orb.	C	
	Erato, Orb.	C	
	Erinus, Orb.	O
	Eupalus, Orb.	O
	flexuosus, Buch	O
	Gessneri, Opp.	C
	gigas, Ziet.	C
	Gmelini, Opp.	C
	Gravesi, Orb.	O
	Hiemeri, Opp.	O
	hispidus, Opp.	C
	Irius, Orb.	O
	Kapffi, Opp.	.	.	C
	Lestocqui, Th.	O	.	.	.
	lingulatus-canalıs, Qu.	C
	longispina, Sow.	C
	Manfredi, Opp.	O
	Martelli, Opp.	C	P	P	C
	oculatus, Phill.	O	?	.
	Oegir, Opp.	C
	orthoceras, Orb.	O	O	.	.
	plicatilis, Sow.	C	C	C
	politus, Opp.	C
	polyplocus, Rein.	C
rotundus, Sow.	O	
semiplanus, Opp.	O	
stenorhynchus, Opp.	C	
subclausus, Opp.	O	
tenuiserratus, Opp.	O	
tortisulcatus, Orb.	C	
transversarius, Qu.	C	
trimarginatus, Opp.	C	
Yo, Orb.	O	.	.	
Aptychus	crassicauda, Gf.	C	
	lævis, Mey.	C	
	lamellosus, Qu.	C	
Belemnites	excentralis, Y. et B.	O	
	Fraasi, May.	C	
	hastatus, Blv.	C	C	C	P	.	C	
	semihastatus, Blv.	.	.	C	
	semisulcatus, Mü.	.	.	.	C	
Nautilus	unicanaliculatus, Ziet.	O	
	aganiticus, Schl.	C	
	giganteus, Orb.	O	P	O	.	.	.	

GASTÉROPODES.

Acteonina	Couloni, Trib.	C	?	.
-----------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	CI.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.	
Nerinea	Bruckneri, Th.	C	C	P	P	.	C	
	Bruntrutana, Th.	C	.	C	
	Carpathica, Zeusch.	O	O	P	C	.	.	
	Castor, Orb.	C	P	P	P	.	C	
	Chopardi, Coq.	O	
	Clio, Orb.	O	
	cylindrica, Voltz	O
	Defrancei, Desh.	O	P	P	P	P	.	C
	depressa, Voltz.	C	O	O	C	.	C
	Desvoidyi, Orb.	O	.	.
	elator, Orb.	O
	elegans, Th.	O
	Elsgaudiæ, Th.	C	P	O	C	.	C
	Erato, Orb.	O
	Goodhalli, Sow.	O
	Gosæ, R.	C	C	P	C	.	C
	grandis, Voltz	O
	inornata, Orb.	O
	Kohleri, Et.	O
	Laufonensis, Th.	O
	Mandelslohi, Brng.	O	P	P	P	C	.	C
	Marcoui, Orb.	O
	Mustoni, Ctj.	C
	nodosa, Voltz	C	.	C
	Rinaldi, Et.	O
	Rœmeri, Phill.	O	?	.
	Rœmeri, Qu.	C
	Salinensis, Orb.	O
	subpyramidalis, Mü.	C	.	C
	Suprajurensis, Voltz	C	C	.	.
	tabularis, Ctj.	C	C
	trinodosa, Voltz.	C
	turriculata, Orb.	C
	umbilicata, Voltz	C	P	C	.	.
vaginata, Th.	C	O	
Visurgis, Orb.	O	
(Itieria) Renevieri, Lor.	C	
Nerita	Jurensis, R.	C	
	pulla, R.	C	
	sp. ?	.	.	.	C	
Neritopsis	Suprajurensis, Th.	C	
Patella	Mosensis, Buv.	C	
	Sequana, Mer.	C	
	Varennensis, Buv.	C	
Phasianella	striata, Orb.	.	.	C	C	.	C	P	P	P	.	O	
	acutecarinata, Gf.	C	
Pleurotomaria	Antoniæ, Et.	.	.	C	C	
	bijuga, Qu.	C	
	Monasteriensis, Th.	C	
	Münsteri, R.	.	.	C	
	Philea, Orb.	.	.	.	C	.	C	
	sublineata, Gf.	C	
Pseudomelania	Delia, (Orb.) Lor.	O	

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	Cl.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.	
Anatina	Helvetica, Desh.	.	.	C	P	.	C	P	P	P	.	C	
	latissima, (Ag.) Trib.	.	.	C	
	Portlandica, Grepp.	0	
	siliqua, (Ag.) Trib.	.	.	C	P	.	P	P	C	.	.	.	
	spatulata, (Ag.) Trib.	.	.	C	P	.	C	
	striata, (Ag.) Orb.	.	.	C	C	.	P	P	C	.	.	.	
Anomia	versicosta, Buv.	.	.	C	
	Astartina, Trib.	C	
Arca	numismalis, Mœsch	.	.	C	
	æmula, Phill.	C	0	C	
	bipartita, R.	.	.	C	C	0	
	Choffati, Th.	0	
	concinna, Phill.	.	.	C	
	Contejeani, Et.	.	.	C	
	Couloni, Trib.	.	.	.	C	
	granulata, Mü.	.	.	C	
	Hecabe, Orb.	.	.	C	
	Janira, Orb.	0	
	lanceolata, R.	C	
	Langi, Th.	0	0	.	.	
	Laufonensis, Et.	0	
	Mosensis, Buv.	.	.	.	0	
	oblonga, Ziet.	.	.	C	C	
	spinicosta, Trib.	C	
	sublata, Orb.	0	.	.	.	
	subpectinata, Phill.	.	.	.	0	
	subterebrans, Trib.	.	.	.	C	?	
	subtexta, Et.	.	.	C	P	.	P	P	P	P	.	C	
	texta, R.	.	.	.	C	.	C	
	Thurmanni, Ctj.	.	.	.	0	
	trisolcata, Et.	.	.	.	0	
	Astarte	communis, Z. et G.	.	.	C	C
		Couloni, Trib.	.	.	C
		crassitesta, Buv.	.	.	C
		Crozotensis, Trib.	C
Duboisii, Orb.		0	C	C	.	C	
Georgii, Trib.		.	.	C	
integra, Mü.		.	.	C	
Mayeri, Trib.		.	.	C	
patens, Ctj.		0	
percrassa, Et.		0	
Pesolina, Ctj.		C	
pseudolævis, Orb.		0	
robusta, Et.		0	P	C	
socialis, Orb.		C	
subclathrata, Th.		0	P	.	0	
Supracorallina, Orb.		.	.	.	C	.	C	C	
Suprajurensis, Orb.		C	C	.	.	
Atreta	Vocœtica, Mœsch	.	C	C	
	imbricata, Et.	C	
Avicula	Argoviensis, Mœsch	.	.	C	
	gervilleoides, Ctj.	0	
	Gessneri, Th.	C	C	.	C	

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	Cl.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.
Avicula	Mülleri, Mœsch	C
	sp. ?	.	.	.	G
Cardita	Astartina, Th.	O	O
	Bernensis, Et.	O
	extensa, Gf.	C
	Moreaui, Buv.	.	.	.	C
	Ogerieni, Trib.	C
	squamicarina, Buv.	O	P	C
	tetragona, Et.	C
Cardium	Banneianum, Th.	C	C	.	C
	Bernouilense, Lor.	C
	chordotonum, Mü.	.	.	.	C
	collineum, Buv.	.	.	C
	Corallinum, Leym.	C	C
	corbicula, Trib.	.	.	C
	delibatatum, Lor.	C	P	.	C
	dissimile, Sow.	C
	Dufrenoyi, Buv.	C	.	C
	eduliforme, R.	.	.	.	C	.	C	P	P	P	.	C
	fontanum, Et.	.	.	.	C	.	C
	frausum, Lor.	C
	intextum, Mü.	.	.	C	P	.	P	P	P	P	.	C
	Morinicum, Lor.	C
	septiferum, Buv.	C	C
	Verioti, Buv.	C	P	P	P	.	O
	Pesolinum, Ctj.
sp. ?	.	C	?	.
	(Unicardium) gibbosum, (Sow.)
	Trib.	.	.	C
	» globosum, (Ag.)
	Trib.	.	.	C
Ceromya	comitata, Ctj.	O
	excentrica, (Voltz) Ag.	C	C	.	C
	globosa, Buv	O
Corbicella	Barrensis, (Buv.) Lor.	C
	Corbula	O
Cyprina	fallax, Ctj.	O
	Mosensis, Buv.	C
	affinis, Orb.	O
	Brongniarti, (R.) Pict. et Rnv..	C	P	P	P	.	C
	caudata, Pict.	C
Cyrena	curta, Trib.	C
	lineata, Ctj.	C
	Münsteri, Et.	C	P	P	P	.	C
	saxatilis, (Ctj.) Trib.	C
	tenuirostris, Et.	O
Diceras	rugosa, (Sow.) Lor.	.	.	.	C	.	P	P	P	C	.	C
	Münsteri, Gf.	O	C
Fimbria	Suprajurensis, Th.	C	P	C	.	.
	Ursicina, Th.	C	.	.
	sp. ?	.	.	.	C	C
	Collardi, (Et.) Trib.	.	.	.	C	O	C
	concentrica, (Buv.) Trib.	O	C	C	.	C

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	Cl.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.
Lima	pygmæa, Th.	C
	rhomboidalis, Ctj.	O	.	.	.
	rigida, Sow.	.	.	C	C	.	G
	Salzgowiæ, Et.	.	.	.	O
	semicircularis, Gf.	C	P	P	C
	semielongata, Et.	.	.	.	C
	spectabilis, Ctj.	O	.	.	.
	Streitbergensis, Orb.	C	P	C	C
	Suprajurensis, Ctj.	O	.	.	.
	tumida, R.	.	.	G	C	.	G
	vicinalis, Th.	.	.	.	O
	Virgulina, Th.	C	P	.	C
Lithodomus	anticus, Buv.	C
	oviformis, Buv.	G
	socialis, Th.	.	.	.	C
	Sowerbyi, Th.	O
Lucina	Buvignieri, Et.	C
	cardinalis, Ctj.	C	.	.
	Delia, Orb.	O
	Goldfussi, Desh.	C
	Lyauteyi, Coq.	O
	Mosensis, Buv.	.	.	.	C
	plebeia, Ctj.	C
	pseudo-Wabrensis, Lor.	C	.	.
	rogosa, (R.) Orb.	.	.	G	P	.	G	P	C	C	.	C
	Ruppellensis, Orb.	O
	substriata, R.	.	.	G	C	.	C	P	C	C	?	C
	turgida, Et.	C
Vernieri, Et.	C	
Wabrensis, Buv.	.	.	.	C	
Machomya	Dunkeri, (Orb.) Lor.	C	.	.	.
	ovata, Orb.	C	P	.	C
Mactra	perlonga, Et.	.	.	C
	Myoconcha
Mutilus	bipartitus, Sow.	C
	Boloniensis, Lor.	C
	Georgii, Trib.	.	.	C
	Gresslyi, Trib.	.	.	G
	Hillanus, Sow.	G	G	.	.
	Icaunensis, Lor.	C
	imbricatus, Orb.	.	.	C	C
	inæquuplicatus, Gf.	C	.	.	.
	Jurensis, Mer.	C	G	.	.
	longævus, Ctj.	.	.	C	P	.	C	P	P	P	.	C
	Morrisi, Sharpe	C
	perplicatus, Et.	.	.	.	C	.	C	P	C	P	.	C
	Rauracicus, Grepp.	.	.	.	C
	solenoides, Orb.	.	.	C
	striatus, Gf.	.	.	C	C
	subæquuplicatus, Gf.	.	.	C	C	.	C	G	O	O	.	.
	subpectinatus, Orb.	.	.	.	C	.	G
	Virgulinus, Et.	C
Neæra	Portlandica, Lor.	C
Nucula	Dewalquei, Opp.	C	P	C	C

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	Cl.	CS.	SI.	SS.	PL.	PS.	V.	P.
Nucula	elliptica, Phill.	.	.	G
	Menkei, R.	C	P	C	C	.	.
Opis	Quenstedti, Mœsch	C	P	C
	semilunulata, Et.	O	.	O
Ostræa	alligata, Et.	.	.	C	P	.	C
	auriformis, Gf.	.	.	.	C	.	C	P	C	.	.	.
	Birmensdorfensis, Mœsch	C
	Blandina, Orb.	C
	Bruntrutana, (Th.) Orb.	C	C	.	C
	Contejeani, Et.	C
	cotyledon, Ctj.	C
	Crozotensis, Trib.	C
	difformis, Schl.	C	.	.	.
	dilatata, Sow.	O	P	C	C
	Dubiensis, Ctj.	C
	Ermontiana, Et.	C	C	C	.	.
	gregaria, Sow.	.	.	C	C
	Greppini, Trib.	C
	hastellata, Schl.	C	P	P	C
	Jaccardi, Trib.	.	.	.	O	O
	Kunkeli, Sow.	C	C	.	.
	multiformis, K. et D.	.	.	C	C	.	C
	nana, Et.	.	.	C	C	.	C	C	C	P	.	C
	pulligera, Gf.	C	C	.	.
	quadrata, Et.	.	.	.	C	O
	rastellaris, Mü.	.	.	C
	Sequana, Th.	C	.	.	.	?	.
	solitaria, Sow.	O	C	C	.	.
	spiralis, (Gf.) Orb.	.	.	C	C
	subnana, Et.	C	P	C	C	O	C	P	P	P	.	C
	suborbicularis, R.	.	.	.	C	O	C
	Thurmanni, Et.	O	P	C	.	.
	ungula, Mer.	C
	virgula, (Defr.) Orb.	C	C	C
Palæomya	Autissiodorensis, Cott.	C
Pecten	articulatus, Schl.	.	.	C	C	O	C	O
	Astartinus, Et.	C
	Banneianus, Et.	C	.	.	.
	Beaumonti, Buv.	C	O
	Benedicti, Ctj.	C	.	.	.
	Buchi, R.	C	P	P	C	.	C
	cingulatus, Gf.	.	.	.	C
	circularis, Ctj.	C
	Contejeani, Trib.	C
	Couloni, Trib.	.	.	C
	Delessei, Et.	C	C	.	C
	dentatus, Sow.	.	.	C
	Desori, Trib.	C
	Ducreti, Grepp.	.	.	.	C
	fibrosus, Sow.	.	C
	Flamandi, Ctj.	C	P	.	C
	Georgii, Trib.	C
	globosus, Qu.	C

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	Cl.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.
Trigonia	spinifera, Orb.	.	.	.	C
	Suprajurensis, Ag.	C	0	C	P	.	C
	truncata, Ag.	C
	variegata, Credn.	C
	Voltzi, Ag.	.	.	.	C
Venus	Jurensis, R.	C	.	.	.	?	.
	nuculæformis, R.	C
	parvula, R.	C	C	.	.
	Suevica, Gf.	C
	trapeziformis, R. sp. ?	.	.	C
BRACHIOPODES.												
Crania	aspera, Gf.	C
	porosa, Mü.	C
Rhynchonella	acarus, Mer.	0	P	0	0
	Arolica, Opp.	C	P	C
	concinna, Sow.	C
	Helvetica, Schl.	C	P	C	C	.	C	0	C	P	.	C
	lacunosa, Schl.	C
	pectunculoïdes, Et.	.	.	C	C	.	C
	sparsicosta, Opp.	C
	spinosa, Dav.	C	P	C
	spinulosa, Opp.	.	.	.	C
	striocincta, Opp.	C
	strioplicata, Qu.	C
	sublentiformis, Et.	C
	Thurmanni, Voltz	C	P	C	C	.	C
triloboïdes, Qu.	C	
Terebratella	Fleuriausa, Orb.	C	P	0	0
	loricata, Schl.	C	P	P	0
	runcinata, Opp.	C	?	.
Terebratula	(Megerlea) pectunculus, Orb.	C
	Bauhini, Et.	C	0
	bicanaliculata, Ziet.	C
	Birmensdorfensis, Escher	C
	Biskidensis, Zeusch.	C
	bisuffarcinata, Schl.	C	P	C
	Bourgueti, Et.	C
	bucculenta, Ziet.	.	.	C	C	.	C
	bullata, Ziet.	.	.	.	C
	fallax, Bachm.	C
	Gagnebini, Et.	C	.	C	.	.	.
	Galliennei, Orb.	.	.	C	C	.	C
	Gessneri, Et.	C
	gutta, Qu.	C
	indentata, Qu.	.	.	C
	insignis, Schübl.	C	P	P	C	.	C
	intermedia, Ziet.	C
	Kurri, Opp.	C
	Moravica, Glock.	C	0
	nucleata, Schl.	C
nutans, Mer.	.	.	.	C	

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	CI.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.
Terebratula	orbis, Qu.	C
	pentagonalis, Mandelsl.	C
	perovalis, Sow.	C
	Suprajurensis, Th.	.	.	.	C	.	C	C	C	C	.	C
	(Terebratulina) substriata, Schl.	C	?	.
	(Waldheimia) Delemontana, Opp.	.	.	.	C
	humeralis, R.	.	.	C	C	.	C
Thecidium	impressa, Bronn	.	o
	Viridumense, Buv.	o

BRYOZOAIRES.

Alecto	sp. ?	.	.	C
Berenicia	densata, Et.	.	.	C	P	.	P	P	P	C	.	.
	foliacea, Trib.	.	.	C
	orbiculata, Gf.	.	.	C
	sparsicellula, Trib.	.	.	C	?	.
	Thurmanni, Et.	C	.	.
Ceriopora	clavata, Gf.	C
	radiciformis, Gf.	C
Heteropora	tenuissima, Et.	C
	Virgulina, Et.	C	.	.

ECHINODERMES.

Acrocidaris	formosa, Ag.	C	C	
	nobilis, Ag.	.	.	.	C	.	C	
Acrosalenia	angularis, (Ag.) Des.	C	
Apiocrinus	echinatus, Qu.	.	.	.	C	
	Roissy, Orb.	C	o	
	rosaceus, Gf.	.	.	.	C	
	subteres, Gf.	C	P	C	C	.	C	
Ceriocrinus	Milleri, R.	.	.	.	C	
Cidaris	Blumenbachi, Mü.	.	.	.	C	.	C	
	cervicalis, Ag.	.	.	.	O	
	coronata, (Schl.) Gf.	C	P	C	P	.	O	
	cucumifera, Ag.	O	
	florigemma, Phill.	.	C	C	C	.	C	O	
	læviuscula, Ag.	C	?	.	
	lineata, Cott.	O	
	Mœschi, Lor.	C	
	propinqua, Mü.	C	
	spinosa, Ag.	C	
	Tschokkei, Des.	C	
	Clypeus	sp. ?	O	.	O	.	.	.
		Collyrites	bicordata, Leske	.	.	.	C
capistrata, Gf.			C	P	C	
carinata, Leske	C		O		
Comatula	Gresslyi, Et.	C	
	scrobiculata, Gf.	C	
Diplopodia	planissima, Et.	O	.	.	.	
	subangularis, M'Coy	C	P	O	C	.	C	

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	CI.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.
Dysaster	granulosus, (Gf.) Ag.	C	P	C
Echinobrissus	Bourgueti, Des.	C
	sp. ?	0	.	.	.
Eugeniocrinus	caryophyllatus, Gf.	C
	compressus, Gf.	C
	Hoferi, Mü.	C
	Moussoni, Des.	C
	nutans, Gf.	C
Glypticus	hieroglyphicus, Ag.	.	.	.	C	0	P	C
	integer, Des.	C
Hemicidaris	Cartieri, Des.	.	.	.	C	.	C
	crenularis, Lk.	.	.	C	C	.	C
	intermedia, (Fleming) Forbes.	.	.	.	C	.	C
	mitra, Ag.	C	P	C	.	.	.
	pepo, Des.	C
Hemidiadema	Gagnebini, Des.	C
	stramonium, (Ag.) Des.	C
Holectypus	Corallinus, Orb.	C
Hypodiadema	florescens, Des.	C
Magnosia	decorata, Ag.	C
Millericrinus	conicus, Orb.	C
	inæquispinosus, Trib.	C
	inflatus, Orb.	C
Pedina	sublævis, Ag.	C	P	C	P	.	C
Pentacrinus	cingulatus, Mü.	C	P	C	C	.	C
	Desori, Th.	C
Pentetagonaster	Astartinus, Th.	C	.	.	.	?	.
	Jurensis, Gf.	C	P	C	P	.	C
	nodosus, Trib.	.	.	C
	Sequanus, Grepp.	C
	tabulatus, Gf.	C
Polycyphus	sp. ?	0
Pseudocidaris	ararica, Des.	0
	Thurmanni, (Ag.) Et.	0	P	C	P	.	C
Pseudodiadema	æquale, (Ag.) Des.	C
	areolatum, Des.	C
	hemisphæricum, (Ag.) Des.	C
	Langi, Des.	C
	placenta, (Ag.) Des.	C
	sp. ?	.	.	0
Pygaster	Gresslyi, Ag.	C
	patelliformis, Ag.	.	.	.	C	.	C
	Desori, Et.	C
	tenuis, Ag.	C
Pygurus	Blumenbachi, Ag.	C
	Jurensis, Marc.	C	.	.
	sp. ?	0	0	.	.	.
Rhabdocidaris	Caprimontana, Des.	C	P	C
	spatula, Des.	C
	sp. ?	.	.	.	C
Solanocrinus	Sequanus, Mer.	C
Stomechinus	lineatus, Des.	C
	perlatus, (Desmar.) Des.	.	.	.	C	.	C

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	Cl.	CS.	Sl.	SS.	PI.	PS.	V.	P.
Tetracrinus	moniliformis, Mü.	c	?	.
POLYPIERS.												
Anomophyllum	Münsteri, R.	.	.	.	C
Aplophyllia	dichotoma, Orb.	.	.	.	C
Aplosmilia	aspera, Orb.	C
Astrocœnia	pentagonalis, Orb.	C
Calamophyllia	Stokesi, E. et H.	.	.	.	C	.	C	C
	articulata, (Mich.) Trib.	C
	dichotoma, (Orb.) Trib.	C
Caryophyllia	vasiformis, Mich.	C
Gentastrea	granulata, Orb.	.	.	.	C
Cladophyllia	Suprajurensis, Et.	C
	sp ?	.	.	.	o
Clausastrea	parva, E. et H.	C
Comoseris	sp. ?	.	.	.	o
Confusastræa	Burgundiæ, Orb.	C
	Mosensis, Orb.	.	.	.	C
Ellipsosmilia	Thurmanni, Et.	.	.	.	C
Enallohelia	Gresslyi, Et.	C
Goniocora	socialis, Et.	.	.	.	C	.	P	C
Isastræa	explanata, E. et H.	.	.	.	C	.	C
	favulus, Et.	.	.	.	C
	grandiflora, Et.	C
	Greenhoughi, E. et H.	.	.	.	C
	Gresslyi, Et.	C	.	.	.	?	.
Leptophyllia	depressa, Et.	C
Microsolena	expansa, Et.	.	.	.	C
	irregularis, Orb.	.	.	.	C
Montlivaltia	Astartina, Et.	C
	cuneata, Et.	o	C	.	.	.
	dilatata, E. et H.	.	.	.	C	.	C
	elongata, E. et H.	C
	subcylindrica, E. et H.	.	.	.	C
	Waldeckensis, Et.	C.
Pleurosmilia	gracilis, Et.	.	.	.	C
	Marcoui, Et.	.	.	.	C
Prionastræa	helianthoides, Orb.	.	.	.	C
Rhabdophyllia	flabellum, Et.	C	C
	sp. ?	.	.	.	o
Stiboria	Suprajurensis, Et.	C
Stylina	Bernardi, Et.	C	o
	decipiens, Et.	.	.	.	C	.	C
	Girodi, Et.	C
	lobata, Orb.	.	.	.	C
	minima, (Et.) Trib.	C	C
	octosepta, Et.	C
	ramosa, Et.	C
	semitumularis, Et.	C
	tubulifera, E. et H.	.	.	.	C	.	C	C
	Waldeckensis, Et.	C
Stylosmilia	Michelini, Et.	C

GENRES.	ESPÈCES.	S.	Z.	Ph.	Cl.	CS.	SI.	SS.	PI.	PS.	V.	P.
Synastræa	Moreaui, Orb.	C	.	.	.
	rotata, Orb.	.	.	.	O
Thamnastræa	agaricites, Gf.	.	.	.	G
	arachnoides, E. et H.	C
	Bouri, From.	C
	concinna, Et.	.	.	.	C	.	P	P	C	.	.	.
	microconos, Et.	.	.	.	C
Thecosmilia	Suprajurensis, Et.	C	.	.	.	?	.
	crassa, Orb.	C
	irregularis, Et.	C
	magna, Et.	C
	sublævis, Et.	.	.	.	C
Zoanth.	trichotoma, E. et H.	.	.	.	C	.	P	C
	apor. astr. indet.	C	C	.	.
	apor. madrep. indet.	C	.	.

POLYTHALAMES.

Cristellaria	Contejeani, Et.	C
	Thurmanni, Et.	C	.	.	.	?	.
Goniolina	geometrica, (R.) Buv.	O
	micraster, Buv.	C

SPONGIAIRES.

Chenendopora	rugosa, Gf.	C
Cribrospongia	cancellata, Gf.	C
	clathrata, Gf.	C
	Lochensis, Qu.	C
	obliqua, Gf.	C
	propinqua, Gf.	C
	reticulata, Gf.	C
	Schweiggeri, Opp.	C
	subtexturata, Orb.	C
	texturata, Gf.	C	?	.
	Cupulospongia	patella, Gf.	C
pezizoïdes, Gf.		C
Hippalimus	bipartitus, Qu.	C
	cylindricus, Gf.	C
	rugosus, Gf.	C
	verrucosus, Gf.	C
Porospongia	sp. ?	C	
Stellispongia	pertusa, Et.	C	.	.	.	

CYCADÉES.

Zamites	Feneonis, Brng.	.	C	?	.
	formosus, H.	.	C

FUCOIDES.

Nulliporites	Argoviensis, Mæsch	C
	Cartieri, (H.) Trib.	?	C
	Langi, (H.) Trib.	C

