

# Aflatoxin M - ein krebserregendes Mykotoxin - ist in Schweizer Milch ein vernachlässigbares Risiko?

Autor(en): **Strebel, Karl**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen aus Lebensmitteluntersuchungen und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène**

Band (Jahr): **96 (2005)**

Heft 6

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-981972>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Aflatoxin M<sub>1</sub> – ein krebserregendes Mykotoxin – ist in Schweizer Milch ein vernachlässigbares Risiko?\*

Karl Strebel  
Kantonales Labor Zürich

## Einleitung

Aflatoxin M<sub>1</sub> (AFM<sub>1</sub>) wird nicht von Schimmelpilzen gebildet, sondern im menschlichen oder tierischen Organismus aus Aflatoxin B<sub>1</sub> metabolisiert, wenn dieses mit verschimmelten Nahrungs- resp. Futtermittel aufgenommen wird. Wiederkäuer scheiden zwischen 1–5 % des aufgenommenen Aflatoxin B<sub>1</sub> als Aflatoxin M<sub>1</sub> mit der Milch aus (1, 2, 6).



AFM<sub>1</sub> ist toxisch und wirkt auf Nieren und Leber karzinogen. Aus diesem Grunde sind folgende Grenzwerte festgelegt worden: 50 ng/kg für Milch und Milchprodukte, 20 ng/kg für Säuglings- und Kindernährmittel und 250 ng/kg für Käse (3).

Nicht jedes verschimmelte Futter muss zwangsläufig aflatoxinhaltig sein! Die Schimmelpilze *Aspergillus flavus* und *Aspergillus parasiticus* bilden Aflatoxine erst bei ausreichender Wärme und Feuchte; natürlicherweise in tropischen oder subtropischen Klimazonen. Bei unsachgemäßer Lagerung von Mais kann es aber auch in unserem Lande zur Aflatoxin-Bildung kommen (4).

Vor über 20 Jahren wurde klar, dass Aflatoxine hauptsächlich über importierte aflatoxinhaltige Rohstoffe ins Futter gelangen. Werden Milchkühe mit Futtermischungen gefüttert, die aflatoxinhaltige Rohstoffe oder Produkte davon enthalten,

\*Poster präsentiert an der 117. Jahresversammlung der SGLUC vom 8./9. September 2005

so scheiden sie Aflatoxin  $M_1$  über die Milch aus. Erdnussschrot, Erdnussmehl und Import-Mais im Ergänzungsfutter für Milchkühe wurden bald als wichtigste Aflatoxin-Quellen erkannt. Solche Futtermischungen enthielten nicht selten über 500  $\mu\text{g}/\text{kg}$   $\text{AFB}_1$ . Als konsequente Massnahme wurden Erdnussprodukte für Milchviehfutter verboten. Nach diesem Verbot stellte die Lebensmittelkontrolle einen massiven Rückgang von aflatoxinbelasteter Konsummilch fest.

Das Verbot wurde später durch Höchstgehalte für Aflatoxin  $B_1$  in Futtermitteln abgelöst (5). Damit der Grenzwert von 50  $\text{ng}/\text{kg}$   $\text{AFM}_1$  in Konsummilch nicht überschritten wird, wurde beim Ergänzungsfutter für Milchvieh ein Höchstgehalt von 5  $\mu\text{g}/\text{kg}$  festgelegt.

Die Einhaltung dieses Höchstgehalts bei importierten Futtermitteln wird seither von Agroscope Liebefeld-Posieux anhand von Stichproben regelmässig überprüft.

## Material und Methoden

Für das  $\text{AFM}_1$ -Monitoring in Milch- und Milchprodukten wählte das Kantonale Labor Zürich 1992 eine immunochemische Analyseverfahren, und zwar den Enzymimmunoassay (EIA). Dieses Test-System erlaubt sehr effizient eine grosse Probenzahl mit ausreichender Empfindlichkeit auf  $\text{AFM}_1$  zu screenen.

1993 wurde ein eigener EIA am Kantonalen Labor entwickelt. Für die Erzeugung der Antikörper zum Nachweis von  $\text{AFM}_1$  reichte die Immunisierung von einem Kaninchen aus. Die damals gewonnenen Antikörper, als auch das mit Peroxidase konjugierte Aflatoxin, reagieren bis heute im Test mit unverminderter Aktivität und Empfindlichkeit (Bestimmungsgrenze: 10  $\text{ng}/\text{l}$ ).

Jährlich werden etwa 250 Proben Milch und Milchprodukte auf  $\text{AFM}_1$  untersucht. Dabei erfolgt gleichzeitig ein EIA-Screening auf sieben relevante Antibiotika, die mit dem üblichen Hemmstofftest nicht oder kaum erfasst werden. Da die verschiedenen EIA's ähnlich aufgebaut und in der Reaktionszeit aufeinander abgestimmt sind, können pro Tag ohne instrumentelle Automatisierung über 150 Proben gescreent werden.

Von den 250 Proben sind ca. 200 Stallmilchproben, die vom MIBD (Milchwirtschaftlicher Inspektions- und Beratungsdienst) im Kanton Zürich gefasst werden. Im Unterschied zu einer Sammelmilchprobe aus einer Genossenschaft oder einem Tankwagen, handelt es sich bei einer Stallmilchprobe um die unvermischte Milch eines einzelnen Milchproduzenten.

Das  $\text{AFM}_1$ -Monitoring von Stallmilchproben erlaubt indirekt die Fütterungspraxis beim Milchvieh bezüglich  $\text{AFB}_1$  auf einfache Weise zu überwachen.

## Resultate und Diskussion

Aus Daten der Kantonalen Lebensmittelkontrolle, die von der Eidgen. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft und der Eidgen. Forschungsanstalt für Nutztiere 1999 publiziert wurden, ist ersichtlich, dass von rund 4200 Proben, welche im

Zeitraum von 1990 bis 1997 analysiert wurden, lediglich 3 von 2666 Milch-, 2 von 932 Käse- und 1 von 50 Milchpulverproben den Grenzwert überschritten haben (6).

Von den ca. 1000 Stallmilch- und Sammelmilchproben, die in den Jahren 2000–2005 untersucht wurden, hat keine den Grenzwert überschritten. Sowohl die vom Kantonalen Labor Zürich untersuchten Stallmilchproben als auch die jährlich im Rahmen des nationalen Fremdstoffuntersuchungsprogramms vom Bundesamt für Veterinärwesen untersuchten Sammelmilch-Proben (ca. 50 pro Jahr) lagen mit ganz wenigen Ausnahmen unter 10 ng/kg und damit deutlich unter dem Grenzwert von 50 ng/kg.

### **Schlussfolgerung**

Die Testergebnisse aus diesen Kontrollen bestätigen: Aflatoxin M<sub>1</sub> ist in Schweizer Milch und Milchprodukten ein vernachlässigbares Risiko. Aufgrund der Bedeutung von Milch und Milchprodukten als Grundnahrungsmittel und vor dem Hintergrund eines sich stetig verändernden Warenverkehrs (importierte Futtermittel) ist ein AFM<sub>1</sub>-Monitoring dieser Produkte in einem angemessenen Rahmen weiterhin erforderlich.

### **Zusammenfassung**

Anhand geschichtlicher Fakten und auf Grund von Analysenergebnissen der Lebensmittelkontrolle in der Schweiz wird aufgezeigt, weshalb das krebserregende Aflatoxin M<sub>1</sub> in Schweizer Milch ein vernachlässigbares Risiko ist. Die Erkenntnis über den Zusammenhang zwischen dem Aflatoxin M<sub>1</sub>-Gehalt in der Milch und dem Aflatoxin B<sub>1</sub>-Gehalt im Futter, sowie die entsprechende Reglementierung des Milchviehfutter für Aflatoxin B<sub>1</sub> haben zu einer nachhaltigen Verbesserung geführt.

Zur Überwachung der Konsummilch auf Aflatoxin M<sub>1</sub> hat das Kantonale Labor Zürich ein immunchemisches Analysesystem gewählt, mit dem sehr effizient eine grosse Probenzahl mit ausreichender Empfindlichkeit gescreent werden kann. Seit 1993 werden für diesen EIA eigene Antikörper und eigenes peroxidase-markiertes Aflatoxin eingesetzt. Dieser Test reagiert bis heute mit unverminderter Aktivität und Empfindlichkeit (10 ng/L).

### **Résumé**

Selon les faits historiques et les résultats d'analyses du contrôle officiel des denrées alimentaire en Suisse, on constate que la présence de l'aflatoxine M<sub>1</sub> cancérigène dans le lait suisse est un risque négligeable. Les connaissances acquises sur le lien entre la teneur en aflatoxine M<sub>1</sub> dans le lait et la teneur en aflatoxine B<sub>1</sub> dans les aliments pour animaux, ainsi que la réglementation correspondante pour l'aflatoxine B<sub>1</sub> dans les aliments pour vaches laitières ont conduit à une amélioration durable.

Le laboratoire cantonal de Zurich a choisi une méthode immuno-chimique (EIA) pour contrôler l'aflatoxine M<sub>1</sub> dans le lait de consommation. Cette méthode permet le criblage sensible d'une grande quantité d'échantillons d'une manière très

efficace. Depuis 1993, on utilise pour cet EIA un système avec nos propres anticorps et de l'aflatoxine conjuguée à une peroxydase. Jusqu'à aujourd'hui, ce test fonctionne sans diminution d'activité et de sensibilité (10 ng/ml).

### **Summary "Aflatoxin M<sub>1</sub> – a cancerogenic mycotoxin – is a negligible risk in Swiss Milk"**

Based on historical facts as well as analytical results of the official food control of Switzerland it can be shown that the cancerogenic aflatoxin M<sub>1</sub> in Swiss milk is a very small risk nowadays. The knowledge about the correlation between the aflatoxin M<sub>1</sub> contamination of milk and the amount of aflatoxin B<sub>1</sub> in milk cattle feed and the resulting regulation of milk cattle feed regarding aflatoxin B<sub>1</sub> leads to a lasting improvement concerning the aflatoxin M<sub>1</sub> situation.

In order to monitor consumer milk for aflatoxin M<sub>1</sub> a immunochemical test (EIA) was chosen which allows the sensitive screening of a large amount of samples in a very efficient way. Since 1993 this EIA test system with housemade antibodies and peroxidase conjugated aflatoxin is working without any reduction regarding activity and sensitivity (10 ng/ml).

### **Key words**

Aflatoxin M<sub>1</sub>, Swiss Milk, Enzymimmunoassay, Mycotoxin, Monitoring

### **Literatur**

- 1 *Pittet A.*: Natural occurrence of mycotoxins in foods and feeds – an updated review, *Revue Méd. Vét.* **149**, 479–492 (1998)
- 2 *Van Egmond H.P.*: Mycotoxins in dairy products, Elsevier Applied Science, London and New York, 1998
- 3 *Eidgenössisches Departement des Innern*: Verordnung des EDI über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln vom 26. Juni 1995, Stand am 21. Mai 2002, (SR 817.021.23)
- 4 *Steiner W., Pacciarelli B. und Battaglia R.*: Aflatoxin B<sub>1</sub>, BGY-Fluoreszenz und Kojisäure in Maiskörnern: Eine Untersuchung auf Mais schweizerischer Herkunft. *Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg.* **82**, 457–474 (1991)
- 5 *Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement*: Über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, Zusatzstoffen für die Tierernährung, Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln vom 10. Juni 1999, Stand am 15. Februar 2005, Anhang 10, (SR 916.307.1)
- 6 *Spahr U., Walther B., Sieber R., Gafner J.-L. und Guidon D.*: Vorkommen von Mykotoxinen in Futtermitteln und Carry over in Milch: eine Übersicht. *Mitt. Lebensm. Hyg.* **90**, 575–609 (1999)

Korrespondenzadresse: Karl Strebel, Kantonales Laboratorium Zürich,  
Fehernstrasse 15, Postfach, CH-8032 Zürich, E-Mail: [karl.strebel@klzh.ch](mailto:karl.strebel@klzh.ch)