

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern  
**Herausgeber:** Naturforschende Gesellschaft Bern  
**Band:** - (1844)  
**Heft:** 15-23

**Artikel:** Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grösstentheils in der Umgebung von Thun gesammelt worden sind  
**Autor:** Trog, J.G.  
**Register:** Classis II. Discomycetes : Scheibenschwämme  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-318165>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 03.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

554. *Tremella mesenterica* Pers. Hall. 2261. Schæff. t. 168! An faulenden Stämmen, im Winter und Frühling.  
555. » *miniata* Trog. Rasenförmig, wellig, gelbroth, mit ganzem Rande. An der Rinde von Laubholz, im Winter.  
556. » *albida* Huds. Bull. t. 386. f. A. Auf faulenden Aestchen von Quercus, im Winter und Frühling.  
557. » *sarcoides* With. Nees f. 143. An der Rinde von gefällten Nussbäumen, im Spätherbst und Winter.

GENUS XL. EXIDIA Fr. *Lappenschwamm.*

558. *Exidia Auricula* Fr. Hall. 2220. Bolt. f. 107! An alten Hölunderstämmen, im Herbst und Winter.  
559. » *recisa* Fr. Nees Syst. f. 141! Auf Weiden und andern Bäumen, im Winter.  
560. » *glandulosa* Fr. Bull. t. 420. f. 1. An Stämmen von Laubholz, im Herbst und Winter.  
561. » *saccharina* Fr. Auf Buchenholz, im Spätherbst.  
562. » *repanda* Fr. Auf faulendem Laubholz, im Herbst und Winter.

GENUS XLI. DACRYMYCES Nees. *Tropfenpilz.*

563. *Dacrymyces stillatus* Nees. Syst. f. 90! Hall. 2257. Auf faulendem Tannholz, im Winter.

GENUS XLII. AGYRIUM Fr. *Glattpilz.*

564. *Agyrium nigricans* Fr. Auf abgef. Aestchen, im Winter.  
565. » *nigrum*? — Abart der vorigen?

---

Classis II. DISCOMYCETES. *Scheibenschwämme.*

Ordo I. HELVELLEI. *Mütsenschwämme.*

GENUS I. MORCHELLA Dill. *Morchel.*

566. *Morchella esculenta*  $\beta$ . *vulgaris* Pers. Hall. 2247, a. (die gemeine Morchel). Krombh. t. 16. f. 5, 6! Auf Wiesen, im April.

567. *Morchella conica* Pers. Hall. 2247, g. (die Spitzmorchel).  
Krombh. t. 16. f. 7—10! In Wäldern, vorzüglich auf Anhöhen, im Mai.
568. „ *semilibera* DeCand. Krombh. t. 15. f. 19, 20. Auf Wiesen, im Mai.

GENUS II. HELVELLA Linn. *Mützenschwamm. Lorchel.*

569. *Helvella crispa* Fr. Hall. 2240. (die Herbstlorchel). Krombh. t. 19. f. 27—29! In feuchten Waldungen, im Herbst. Heimgbergwald.
570. „ *lacunosa* Holmsk. Schæff. t. 162! (die Grubenlorchel). In Wäldern, im Herbst. Kandergrien.
571. „ *Infula* Schæff. t. 159! In Tannwäldern, im Herbst. Grüsisberg.
572. „ *elastica* Bull. t. 242. In feuchten Wäldern, im Herbst.

GENUS III. MITRULA Fr. *Mützenschwamm.*

573. *Mitrula spathulata* Fr. *Spathularia flavida* Pers. Schæff. t. 149!  
In Wäldern, auf Tannadeln, im Herbst.
574. „ *cucullata* Fr. Batsch. f. 132! Auf Tannadeln, fast das ganze Jahr.
575. „ *paludosa* Fr. In Sümpfen, auf faulenden Blättern, im Sommer.

GENUS IV. PEZIZA. *Becherschwamm.*

SUBGENUS I. ALEURIA.

576. *Peziza Acetabulum* Linn. Bull. t. 485. f. 4. In schattigen Wäldern. Bei Genf.
577. „ *venosa* Pers. Jacq. Austr. t. 17. f. 1. In Gärten, zwischen den Buchseinfassungen, im April.
578. „ *badia* Pers. Bolt. t. 99! In Gebüsch, im Frühling.
579. „ *abietina* Pers. In Tannwäldern, im Herbst.
580. „ *leporina* Batsch. f. 117! In Tannwäldern und auf Viehweiden.
581. „ *aurantia* Fl. Dan. Hall. 2222. Schæff. t. 148! In Wäldern.
582. „ *umbrina* Pers. Bull. t. 154. f. 2. In schattigem Gebüsch an der Erde.

583. *Peziza alutacea* Pers. Schæff. t. 155! In Wäldern, im Sommer und Herbst.  
584. » *repanda* Pers. Icon. pict. t. 20. f. 3! In lichten Wäldern, an der Erde, Sommer.  
585. » *cerea* Sow. t. 3. Auf faulendem Holz, im Sommer und Herbst.  
586. » *Marsupium* Pers. In Wäldern, an der Erde.  
587. » *bufonia* Pers. In Wäldern und an feuchten Orten.  
588. » *Macropus* Pers. Hall. 2227. Schæff. t. 166! An faulen Stöcken, im Herbst.  
589. » *tuberosa* Bull. t. 485. f. 2, 3. Auf schattigen Wiesen, im Frühling.  
590. » *violacea* Pers. An Baumstämmen, im Winter.  
591. » *purpurascens* Pers. M. E. t. 12. f. 10! In Wäldern, an der Erde.  
592. » *granulata* Bull. t. 438. f. 3. Auf Kuhmist, Sommer und Herbst.  
593. » *leucoloma* Rebent. Nees Syst. f. 268! An Tannstöcken, im Herbst.  
594. » *hæmastigma* Fr. An sandiger Erde, im Spätherbsf.  
595. » *spurcata* Pers. In Wäldern.  
596. » *fascicularis* Alb. et Schw. t. 12. f. 2! An faulen Baumstämmen.

SUBGENUS II. LACHNEA Fr.

597. *Peziza coccinea* Jacq. Nees f. 288! In Wäldern, zwischen Moos, im Herbst.  
598. » *nigrella* Pers. Hall. 2230. In Tannwäldern, im Spätherbst.  
599. » *brunnea* Alb. et Schw. t. 9. f. 8! Auf faulendem Holz, Sommer und Herbst.  
600. » *hirta* Schum. Auf sandiger Erde, nach Regenwetter.  
601. » *involuta* Trog. Strunklos, gesellig fast rasenförmig; Becher fast kugelig, an der Basis mit langen, striegelförmigen Haaren bekleidet. Auf Aestchen von Eichenholz.  
602. » *umbrorum* Fr. Michel. t. 86. f. 19! An der Erde, auf faulendem Laub.  
603. » *crinita* Bull. t. 416. f. 2. Auf faulenden Aestchen.  
604. » *livida* Schum. Batsch. f. 154! An faulenden Stämmen von *Salix* und *Populus*, im Frühling.  
605. » *setosa* Nees. f. 275! An verfaulten Baumstämmen, im Herbst.  
606. » *virginea* Batsch. Hall. 2239. Mich. t. 36. f. 15! Auf Rinde, Holz etc., das ganze Jahr.

607. *Peziza nivea* Hedw. Bull. t. 416. f. 5. Auf abgefallenen Aestchen, im Herbst.
608. » *patula* Pers. Nees Syst. f. 285! Auf Blättern und Holz, im Herbst und Frühling.
609. » *calycina*  $\beta$ . *Abietis* Fr. An abgef. Aestchen von *Pinus Abies*.
610. » *bicolor*. Bull. Nees Syst. f. 284! An Zäunen, im Frühling.
611. » *cerinea* Pers. Nees Syst. f. 283! An Hecken und schattigen Orten, im Herbst und Frühling.
612. » *calyculæformis* Schum. Auf faulendem Holz, im Herbst.
613. » *clandestina* Bull. Auf Rinde von *Sambucus*, im Frühling.
614. » *albo-violascens* Alb. et S. t. 8. f. 4! Auf Aestchen von *Crataegus*, im Winter.
615. » *corticalis* Pers. Auf Tannen- und anderm Holz, ausdauernd.
616. » *hispidula* Schrad. Auf abgefallenen Aestchen, im Frühling.
617. » *spadicea* Pers. An Aesten von *Populus tremula*, im April.
618. » *varicolor* Fr. Pers. icon. et descr. t. 8. f. 4, 5. Auf angeschwemmtem Holz, durchs ganze Jahr.
619. » *Nidulus* Schm. et Kunze. Auf Stengeln grösserer Pflanzen, im Frühling.
620. » *anomala* Pers. Sowerb. t. 369. f. 3. Auf abgefallenen Aestchen, ausdauernd.
621. » *cæsia* Pers. Nees Syst. f. 272! Auf abgef. Aestchen, im Herbst und Frühling.
622. » *Mayadis* Kramer. Auf Blättern von *Zea* Mais.

SUBGENUS II. PHIALEA.

623. *Peziza firma* Pers. Bolt. t. 105. f. 1! Auf faulenden Aestchen, im Winter.
624. » *serotina* Pers. Bolt. t. 98. f. 2! An Tannenholz, im Spätherbst.
625. » *lutescens* Alb. et Schw. Fl. Dan. t. 1440. f. 1. An Tannästchen, im Frühling.
626. » *cyathoidea* Bull. Nees Syst. f. 294! Auf Baumästchen und Pflanzenstengeln, durchs ganze Jahr.
627. » *strobilina* Fr. An den Schuppen der Tannzapfen, ausdauernd.
628. » *Calyculus* Sow. t. 116. Auf eichenen Aestchen, im Herbst.
629. » *æruginea* Fl. Dan. Grev. t. 241! In Wäldern, auf faulem Holz, im Sommer und Herbst.
630. » *pallescens* Pers. Hoffm. Fl. g. crypt. t. 13. f. 5! Auf abgefallenen Aestchen, im Herbst.

631. *Peziza lenticularis* Bull. t. 300. f. a, c. An faulenden Baumstämmen, im Herbst.
632. » *salicella* Fr. Auf faulenden Aesten von *Salix*, vom Herbst bis in den Frühling.
633. » *luteo-virens* Fr. An buchenen Stämmen, im Herbst.
634. » *carnea* Fr. Auf abgefallenen Aestchen, im Herbst.
635. » *imberbis* Bull. t. 467. f. 2. An feuchtem Tannholz, im Herbst.
636. » *herbarum* Pers. An faulenden Halmen von *Carex pendula*, im Herbst und Winter.
637. » *chrysocoma* Bull. t. 376. f. 2. An Tannenholz, durchs ganze Jahr.
638. » *vinosa* Pers. An Stengeln von *Urtica dioica*, Herbst bis Frühling.
639. » *rubella* Pers. An halbverfaultem Holz, im Herbst, in Wäldern.
640. » *atro-virens*.  $\beta$ . *seriata* Fr. Auf Eichenholz.
641. » *uda* Pers. Hall. 2243. An feuchten Aestchen, vom Herbst bis Frühling.
642. » *cinerea* Batsch. f. 137! Hall. 2244. Auf Aestchen von *Alnus*, vom Herbst bis Frühling.
643. » *vulgaris* Fr. Auf Stengeln und Aestchen, im Winter. Grünsberg.
644. » *acicola* Schmidt. Auf der untern Seite von Tannadeln.
645. » *livido-fusca* Fr. Auf Zapfen von *Pinus sylv.*, vom Herbst bis Frühling.
646. » *atrata* Pers. Nees Syst. f. 266! An Weidenstämmen, im Winter und Frühling.
647. » *laevigata* Fr. An dürren Stengeln grösserer Pflanzen, im Frühling.

### SUBGENUS III. HELOTIUM.

648. » *Peziza pithya* Pers. Nees Syst. f. 287! Auf Aestchen von *Pinus picea*, im Winter und Frühling.
649. » *aurea* Fr. An abgeschältem Holz, im Winter und Frühling.
650. » *alba* Fr. An Blättern von *Carex pendula*, im Herbst.

### GENUS IV. ASCOBOLUS. Schlauchwerfer.

651. *Ascobolus furfuraceus* Pers. Grev. Scot. 6. t. 307! Auf Kuhmist, nach Regenwetter.

652. *Ascobolus porphyrosporus* Fr. Auf Kuhmist, zu allen Jahreszeiten.  
653. » *glaber*. Pers. Nees Syst. f. 297! Auf Kuhmist.

## **Ordo II. BULGARIEL.**

### GENUS V. LEOTIA Fr. Der Nagelschwamm.

654. *Leotia circinans* Pers. Icon. descr. t. 5. f. 5–7. In Tannwäldern, im Herbst.  
655. » *lubrica* Pers. Nees Syst. f. 162! In Wäldern und auf Torf-land, im Sommer und Herbst.  
656. » *atro-virens* Pers. M. E. t. 9. f. 1–3! In Wäldern, an feuchten Stellen.

### GENUS VI. BULGARIA Fr.

657. *Bulgaria inquinans* Fr. Hall. 2219. Krombh. t. 5. f. 49! Auf Eichenholz, im Herbst und Winter.  
658. » *pura* Fr. An tannenem Spaltenholz, im Herbst und Winter.  
659. » *sarcoides* Fr. Hall. 2221. Batsch. f. 53! An Laubholzstämmen, im Herbst und Winter.

## **Ordo III. DERMEL. Lederbecherschwämme.**

### GENUS VII. DITIOLA Fr. Flockenpilz.

660. *Ditiola radicata* Fr. Hall. 2241. Nees Syst. f. 161! An faulendem Tannenholz, im Frühling.

## **Ordo IV. PATELLARIEL. Tellerpilzartige.**

### GENUS VIII. PATELLARIA. Tellerpilz.

661. *Patellaria atrata* Fr. Nees Syst. f. 265! Auf Aestchen von Tilia.

### GENUS IX. CENANGIUM Fr. Leerschüsselpilz.

662. *Cenangium Cerasi* Fr. Pers. Icon. pict. t. 20. f. 1! Auf Aestchen von Cerasus, ausdauernd.

663. *Cenangium Prunastri* Pers. Auf Aestchen von Prunus.  
664. » *pithyum* Fr. Obs. t. 5. f. 4! Auf Schuppen der Zapfen von  
Pinus sylvestris. Kandergrien.  
665. » *quercinum* Fr. Nees Syst. f. 300! Auf Aestchen von Quercus.

GENUS X. EXCIPULA Fr. *Schäälchenschwamm.*

666. *Excipula aspera* Fr. An Stengeln von Osmunda.  
667. » *Angelicae* Trog. Punktförmig, aufgeschwollen, schwarz,  
Scheibe geöffnet, grauschwarz. Auf Stengeln von Ang. sylv.

**Ordo V. PHACIDIACEI. Linsenpilzartige.**

GENUS X. HYSTERIUM Tode. *Ritzenpilz.*

668. *Hysterium pulicare* Pers. Grev. 3. t. 167! Auf Aestchen.  
669. » *angustatum* Pers. Grev. 3. t. 167! Auf Eichenholz.  
670. » *graphicum* Fr. Sturm. Flor. t. 32. An der Rinde von Pinus  
sylvestris, Herbst bis Frühling.  
671. » *varium* Fr. An Eichenholz, im Herbst.  
672. » *elatinum* Pers. Auf Tannrinde; ausdauernd.  
673. » *degenerans* Fr. Auf Aestchen von Vaccinium uliginosum.  
674. » *Rubi* Pers. Grev. 1. t. 24! Auf Aestchen von Rubus.  
675. » *pinastri* Schrad. Grev. 1. t. 60! Auf Tannnadeln.  
676. » *juniperinum* Pers. Grev. 1. t. 26! Auf Blätter von Juniperus.  
677. » *melaleucum* Fr. Obs. mycol. t. 2. f. 1! Auf Blättern von Vac-  
cinium.  
678. » *commune* Fr. Auf Stengeln von Pteris aquilina etc.  
679. » *arundinaceum* Schrad. Journ. t. 3. f. 3. Auf Halmen von  
Arundo phragmites.  
680. » *Ilicis?* Auf Bl. von Ilex aquifolium.

GENUS XII. PHACIDIUM Fr. *Linsenpilz.*

681. *Phacidium alneum* Fr. Auf Aestchen von Alnus.  
682. » *Pini* Schmidt. Nees Syst. f. 399! Auf Aestchen von Pinus  
sylvestris.  
683. » *multivalve* Schmidt. Greville t. 253! Auf Blättern von Ilex.  
684. » *dentatum* Fr. Auf Eichenblättern.  
685. » *repandum* Fr. A. et Schw. t. 4. f. 6! Auf Stengeln von An-  
gelica sylv.



GENUS XIII. RHYTISMA Fr. *Ritzblattschorf.*

686. *Rhytisma Andromedæ* Fr. Auf Bl. von *Andromeda polifolia*,  
Sommer und Herbst.  
687. » *Vaccinii* Fr. Auf Bl. von *Vaccinium vitis idea*.  
688. » *salicinum* Fr. Grev. t. 118! Auf Bl. von *Salix*.  
689. » *acerinum* Fr. Grev. t. 118! Auf Ahornblättern.  
690. » *punctatum* Fr. Auf Bl. von *Acer pseudo-platanus*.

**Ordo VI. STICTEL. *Punktpilzartige.***

GENUS XIV. STICTIS Pers. *Punktpilz.*

691. *Stictis Pupula* Fr. Auf Aestchen.  
692. » *radiata* Pers. Nees f. 294! Auf abgefallenen Aestchen, vom  
Herbst bis in Frühling.  
693. » *tenuis* Fr. Auf dürren Aestchen.  
694. » *bullata* Pers. Auf abgef. Aestchen.  
695. » *parallela* Fr. Auf altem Holz, ausdauernd.

---

Classis III. PYRENOMYCETES. *Kernschwämme.*

**Ordo I. SPHÆRINI. *Kugelschwammartige.***

GENUS I. SPHÆRIA. *Kugelpilz.*

A. COMPOSITÆ.

SECT. I. PERIPHERICÆ.

696. *Sphæria capitata* Holmsk. Pers. M. E. t. 10. f. 1 — 4! Wächst  
parasitisch auf der Hirschtrüffel, im Herbst.  
697. » *ophioglossoides* Ehrh. Pers. M. E. t. 10. f. 5, 6! In Wäldern,  
wie die vorige, auf der Hirschtrüffel.  
698. » *digitata* Ehrh. Nees f. 304! An eichenen Wandstöcken, aus-  
dauernd.  
699. » *polymorpha* Pers. Nees f. 307! An buchenen Stöcken, in  
Wäldern, vom Frühling bis im Herbst.