

Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern**

Band (Jahr): - **(1854)**

Heft 321-322

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

**R.J.Shuttleworth, Beiträge zur näheren
Kenntniss der Land- und Süßwasser-
Mollusken der Insel Portorico.**

(Schluss.)

(Vorgelegt den 3. Juni 1854.)

58. Cyclostoma (Megalomastoma) croceum (Gmel.) Desh.

Syn. *Helix cylindracea glabra*, etc. Chemn. C. Cab. IX. Pars 2.
p. 166, tab. 135, f. 1233.

„ *crocea* Gmel. p. 3655, N^o 243.

Cyclostoma flavula Lam. Enc. Meth. tab. 461, f. 6.

„ „ „ An. s. V. t. VI, 2de p., p. 146,
N^o 13.

„ *crocea* Desh. in Lam. ed. 2, t. VIII, p. 357 in
ann.

Megalomastoma cylindraceum Pf. Mon. Pneum. p. 124, N^o 1.
Alt. 38 mill.; Diam. 12.

Var. minor, costulato-striata, sutura paululum profundiore et
anfr. ultimo ad aperturam lateraliter minus producto.
Alt. 19 ad 22 mill. et supra; Diam. 7—8 mill.

Hab. Sub ligno et foliis delapsis vulgaris, prope San Juan, Hu-
macao, Luquillo etc.

Obs. Iterum coacti sumus denominationem Gmelinianam contra im-
mutationem el. Pfeifferi vindicare. Chemnitzius, loco citato et
in ipsissima pagina, vocabulum „cylindraceum“ in designa-
tionibus specificis bis adhibet; nempe 1^o „*Helix cylindracea
glabra, ex aurantio flavescens, apice obtuso,*“ etc. = *Cy-
clostoma croceum*: et 2^o „*Helix cylindracea acuta, testa
alba, glaberrima, apice valde acuto,*“ etc. = *Bulimus la-
biosus* (Müll.) Brug.

Variat colore pallide flavescente, vel croceo, versus ba-
sin sæpe saturatius violaceo; apertura interne lutea vel cro-
cea, peristomate semper aureo-nitente. Testæ, etiam juve-
nes, fere semper detritæ, rarissime epidermide tenui, cornea,
nitidula indutæ. Varietas forma paululum discedit et sculp-
tura cum icone Encycl. Meth. supra laudata melius convenit,
sed specimina magnitudine et characteribus intermedia non
desunt.

(Bern. Mittheil. Juni 1854.)