

Häuptsächlichste Litteratur über die Rhätischen Schichten

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern**

Band (Jahr): - **(1869)**

Heft 684-711

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

| | Num. | Tafel u. Fig. |
|--|-------|---------------|
| <i>Plicatula spinosa</i> Sow. var. | 89. | IV, 22. |
| <i>Pseudomelania usta</i> Renev. | 13. | I, 13. |
| <i>Rhabdophyllia longobardica</i> Stopp. | 111. | |
| <i>Rhynchonella furcillata</i> d'Orb. | 97. | |
| <i>Sargodon tomicus</i> Plien. | 2. | I, 2. |
| <i>Saurichthys acuminatus</i> Ag. | 1. | I, 1. |
| <i>Schizodus Ewaldi</i> Born. | 25. | II, 21. |
| „ <i>alpinus</i> Winkl. | 16. | II, 22. |
| „ <i>isocelus</i> Stopp. | 27. | II, 25. |
| <i>Serpula flaccida</i> Goldf. | 8. | I, 8. a. b. |
| „ <i>circinalis</i> Goldf. ? | 8, b. | I, 8. c. |
| „ <i>Olifex</i> Quenst. | 9. | I, 9. |
| <i>Spiriferina uncinata</i> Schafh. | 98. | |
| „ <i>Münsteri</i> Dav. | 99. | |
| <i>Tæniodon præcursor</i> Schlönb. | 28. | II, 24. |
| <i>Tancredia Sinemuriensis</i> Mart. | 53. | II, 8. |
| <i>Tellina Bavarica</i> Winkl. | 22. | II, 23. |
| <i>Terebratula gregaria</i> Süss | 100. | |
| „ <i>pyriformis</i> Süss | 101. | |
| „ <i>subovoides</i> Münst. | 102. | |
| <i>Trigonia</i> , siehe <i>Myophoria</i> | | |
| <i>Trochus</i> sp. | 17. | I, 17. |
| <i>Turritella</i> sp. | 11. | I, 11. |
| „ „ | 12. | I, 12. |

Hauptsächlichste

Litteratur über die Rhätischen Schichten.

Alphabetisch geordnet.

-
- Cappelini.** Fossile Infraliasici dei dintorni del golfo della Spezia. Bologna, 1866—67, 4^o, mit 10 Tafeln.
- Credner.** Notiz im N. Jahrb. d. Min. u. Geolog., 1860, p. 308, c. fig.
- Dieulafait.** 1re Notice sur le *Rhätien* im Bulletin de la Soc. Géol. de France, 2de Sér., XXIII, p. 309.
- Idem.* 2de notice, l. c., p. 467.
- Idem.* 3me notice, l. c., XXIV, p. 601 (1867).

- Dumortier.** *Infralias* du bassin du Rhône, avec 30 planches, 1864. Paris.
- NB.* Das Register davon befindet sich im „Lias inférieur“ desselben Autors, der als Fortsetzung oder Ergänzung des vorigen zu betrachten ist. Paris, 1867.
- Idem.* Lettre, vid. Bullet. Soc. Géol., 2de Sér., XXIII, p. 145.
- Dittmar.** Die Contortazone. München, 1864, 4^o, mit 3 Tafeln.
- Ebray.** Notice sur le Rhætien. Voyez Bullet. Soc. Géol., 2de sér., XXIII, p. 549.
- Emmerich.** Geogn. Beobachtungen der Östlichen Alpen. Siehe K. K. Reichsanstalt, IV, p. 80, 326 (1853).
- Gümbel.** Geogn. Beschreibung des Bairischen Alpengebirges. München, 1861.
- v. Hauer.** Ueber Fossilien aus dem Dolomit vom Monte Salvatore bei Lugano, mit 1 Tafel, 8^o. In d. K. K. Acad., Sitzungsbericht, XV. Märzheft, 1855, p. 407.
- Idem.* Choristoceras. Eine neue Cephalopodensippe aus den Kössner Schichten. K. K. Acad., Sitzungsber., LII. (Dec. 1865), mit 1 Tafel.
- Idem.* Note in d. K. K. Reichsanst., IV, p. 715. (Gliederung der Alpenkalke in d. Ostalpen.)
- Leymerie.** Mémoire sur la partie inférieure du Système secondaire du département du Rhône. In Mém. Soc. Géol. de France, 1re sér., III, p. 313. 1840, c. fig.
- Le Vallois.** Couche de jonction du Trias et Lias. Im Bullet. Soc. Géol. d. France, 2de sér., XXI, p. 374, avec une planche.
- Idem.* Sur le Rhætien, l. c., XXIII, p. 64.
- Loccard.** 2 Bonebeds. Im Bull. Soc. Géol. d. France, 2de sér., XXIII, pag. 80.
- J. Martin.** *Infralias* de la Côte-d'Or. In Mém. Soc. Géol. d. France, 2de sér., VII, mit Tafeln. 1860, 4^o.
- Idem.* Zone à *Avicula contorta* ou *Étage Rhætien*, avec 3 planches, 8^o. Paris, 1865 (im 12ten Band der Mém. de l'Acad. de Dijon).
- Merian.** Siehe Escher's von der Linth Geolog. Bemerkungen über Vorariberg in N. Denkschrift. d. Schweiz. naturf. Ges., XIII, 1853. Mit 8 Tafeln.
- Magnan.** Sur la Zone à *Avicula contorta* in Bullet. Soc. Géol. d. France. 2de sér., XXIV, p. 721.
- Moore.** Rhætic beds and fossils. Siehe Journ. of Geol. Soc. of London, 1861, XVII, p. 483. Mit 2 Tafeln (XV u. XVI).
- Oppel und Süss.** Ueber die muthmasslichen Aequivalente der Kössner Schichten in Schwaben. Aus dem Juliheft 1866 der K. K. Akad. Sitzungsberichte, XXI, p. 535, mit 2 Tafeln.

- Oppel** (Dr. Alb.). Weitere Nachweise der Kössner Schichten in Schwaben und Luxemburg. Octoberheft 1857 der K. K. Acad. Sitzungsber., XXVI, p. 7.
- Pellet.** Sur le Rhætien. *Bullet. Geol. de France*, 2de sér. XXIII, pag. 66.
- L. Pflücker** (von Rico aus Peru), z. Z. in Göttingen. Das *Räth* in der Umgegend von Göttingen, mit 1 Taf. Aus d. *Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges.*, XX, 2tes Heft, p. 397 (1868), tab. VII.
- E. Renevier.** Infralias et Zone à *Avicula contorta* (Ét. Rhætien) des Alpes vaudoises. Im *Bullet. de la Soc. vaudoise des Sciences nat.*, VIII, p. 39—97, mit 3 Tafeln. 1864.
- Rolle** (Dr. Fried.). Ueber einige an der Grenze von Keuper und Lias in Schwaben auftretende Versteinerungen. K. K. Acad. Sitzungsber., Oct. 1857, XXVI, p. 13. Mit 1 Tafel.
- Schafhäütl.** Beschreib. und Abbildungen verschiedener Petrefacten aus d. Bairischen Alpen. (Beiträge zur nähern Kenntniss ders.)
N. Jahrb. d. Min. u. Geol., 1851, p. 458, Taf. VII.
N. „ „ „ 1852, p. 283, Taf. III.
N. „ „ „ 1854, p. 555, Taf. VIII.
- Schlönbach.** Das Bonebed u. s. w. im Hannöver'schen.
N. Jahrb. d. Min. u. Geol., 1860, p. 513 u. 525, fig.
- Stoppani** (abbé Ant.). Couches à *Avicula contorta* en Lombardie (*Paléontologie Lombard.*, 3me sér.), 4^o, mit 60 Tafeln. 1860—65.
- Stur** (D.). Die Kössner Schichten im Nordwestlichen Ungarn. 1859, K. K. Acad. Sitzungsber., XXXVIII, p. 1006.
- Tawney und Duncan.** Rhetic beds an Sutton stores. *Geol. Quarterly Journ.*, XXII, 1866, p. 69, mit 2 Tafeln.
- Winkler.** Die Schichten der *Avicula contorta*. München, 1859, mit 2 Tafeln.
- Idem.* Der Oberkeuper in den Bairischen Alpen, in der *Zeitschrift der deutsch. Geol. Gesellsch.*, XIII, p. 459; 1861. Mit 4 Tafeln.
- Wright.** Lower Lias and bonebed. *Quart. Journ. geol.*, XVI, p. 374. Ohne Tafeln.

Ferner zu consultiren :

- Quenstedt.* Der Jura, p. 25—37, und Taf. I—V.
- Neues Jahrbuch* für Mineralogie, Geologie und Paleontologie, von Leonhard.
- Sitzungsberichte* der K. K. Akademie in Wien.
- Jahrbuch* der Geol. Reichsanstalt in Wien.
- Zeitschrift* der deutschen Geologischen Gesellschaft in Berlin.
- Bulletins* de la Soc. Géologique de France, seconde série.
-