

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern
Band: - (1906)
Heft: 1609-1628

Artikel: 2 Kreissysteme am Dreieck
Autor: Schenker, O.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-319162>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

O. Schenker.

2 Kreissysteme am Dreieck.

(Eingereicht den 9. April 1906).

1. **Satz:** Die drei Kreise durch die bezw. Dreiecksecken A, B u. C, deren Mittelpunkte A', B' u. C' erhalten werden, indem man die Normalen A'A, B'B u. C'C in den Ecken A, B u. C zu den Umkreisradien AM, BM u. CM mit den Gegenseiten in A', B' bzw. C' zum Schnitt bringt,
2. gehen durch dieselben zwei Punkte O und O' im Endlichen und schneiden sich unter dem unveränderlichen Winkel von 120° .




Fig. 1.

3. Diese drei Kreise gehen ausserdem durch die bezw. Schnittpunkte B''' u. B'' | C''' u. C'' | A''' u. A'' der äussern und innern Winkelhalbierenden mit den Gegenseiten (siehe Figur 1).

Hist. Bemerkung: Dieses Kreissystem wird dem Apollonius von Perga (in Pamphylien) mit dem Beinamen des grossen Geometers zugeschrieben, der um 200 v. Chr. zu Alexandria lebte und ein Werk über die Kegelschnitte (De Sectionibus conicis) schrieb.

Beweis zu 1. Am einfachsten rechnen wir in trimetrischen Koordinaten, indem wir einen beliebigen Punkt P durch seine Abstände x_1, x_2, x_3 von den bezw. Dreiecksseiten $BC = s_1, CA = s_2$ und $AB = s_3$ bestimmen, wobei x_1, x_2 u. x_3 durch die Beziehung verbunden sind:

$$\underline{x_1 \cdot s_1 + x_2 \cdot s_2 + x_3 \cdot s_3 = s_1 \cdot s_2 \cdot \sin C = s_2 \cdot s_3 \cdot \sin A = s_3 \cdot s_1 \cdot \sin B}$$

Bezeichnet d den Durchmesser vom Umkreis des Fundamentaldreiecks (ABC), so folgt aus der Figur:

$$s_1 = d \cdot \sin A, s_2 = d \cdot \sin B, s_3 = d \cdot \sin C, \text{ also}$$

$$\underline{x_1 \cdot \sin A + x_2 \cdot \sin B + x_3 \cdot \sin C = d \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C}$$

Der Abstand zweier Punkte x_1', x_2', x_3' u. x_1'', x_2'', x_3'' wird durch den Ausdruck gegeben:

$$\sqrt{\frac{s_1 \cdot s_2 \cdot s_3}{s_1^2 \cdot s_2^2 \cdot \sin^2 C} \left[(x_1' - x_1'')^2 \cdot s_1 \cdot \cos A + (x_2' - x_2'')^2 \cdot s_2 \cdot \cos B + (x_3' - x_3'')^2 \cdot s_3 \cdot \cos C \right]}$$

oder indem man $s_1 = d \cdot \sin A, s_2 = d \cdot \sin B, s_3 = d \cdot \sin C$ einführt

$$\text{durch } \sqrt{\frac{1}{2 \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C} \left[(x_1' - x_1'')^2 \sin 2A + (x_2' - x_2'')^2 \sin 2B + (x_3' - x_3'')^2 \sin 2C \right]}$$

Anmerkung: Die Formel ergibt sich folgendermassen (s. Fig. 2). Bezeichnen $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'$ resp. $\mathfrak{A}'', \mathfrak{B}'', \mathfrak{C}''$ die Fusspunkte der Senkrechten aus P' und P'' auf die Dreiecksseiten, so ist:

$$\overline{P'P''^2} = \overline{\mathfrak{A}'\mathfrak{A}''^2} + (P'\mathfrak{A}' - P''\mathfrak{A}'')^2 \text{ oder da}$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{U}'\mathfrak{U}'' &= B\mathfrak{U}'' - B\mathfrak{U}' = \frac{x_3'}{\sin B} + \frac{x_1' \cdot \cos B}{\sin B} - \frac{x_3''}{\sin B} - \frac{x_1'' \cdot \cos B}{\sin B} \\ &= \frac{x_3' - x_3'' + (x_1' - x_1'') \cos B}{\sin B} \text{ ist} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{P'P''^2} &= \left[\frac{x_3' - x_3'' + (x_1' - x_1'') \cos B}{\sin B} \right]^2 + (x_1' - x_1'')^2 \\ &= \left[(x_3' - x_3'')^2 + (x_1' - x_1'')^2 + 2(x_3' - x_3'')(x_1' - x_1'') \cos B \right] : \sin^2 B \end{aligned}$$

da aber $x_1' \cdot \sin A + x_2' \cdot \sin B + x_3' \cdot \sin C = d \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C$ u.

$x_1'' \cdot \sin A + x_2'' \cdot \sin B + x_3'' \cdot \sin C = d \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C$ ist,

also $(x_1' - x_1'') \sin A + (x_2' - x_2'') \sin B + (x_3' - x_3'') \sin C = 0$,

so folgt durch quadrieren: $2(x_3' - x_3'')(x_1' - x_1'')$

$$= \frac{(x_2' - x_2'')^2 \sin^2 B - (x_1' - x_1'')^2 \sin^2 A - (x_3' - x_3'')^2 \sin^2 C}{\sin A \cdot \sin C}$$

$$\begin{aligned} \text{also } \overline{P'P''^2} &= \left\{ \sin C (x_3' - x_3'')^2 (\sin A - \cos B \sin C) \right. \\ &\quad \left. + \sin A (x_1' - x_1'')^2 (\sin C - \cos B \sin A) \right. \\ &\quad \left. + \sin^2 B \cos B (x_2' - x_2'')^2 \right\} : \sin A \cdot \sin^2 B \cdot \sin C \end{aligned}$$

$$= \left\{ \sin A (x_1' - x_1'')^2 \cos A \cdot \sin B + \sin B (x_2' - x_2'')^2 \cos B \cdot \sin B \right.$$

$$\left. + \sin C (x_3' - x_3'')^2 \cos C \cdot \sin B \right\} : \sin A \cdot \sin^2 B \cdot \sin C$$

$$= \left\{ (x_1' - x_1'')^2 \sin 2A + (x_2' - x_2'')^2 \sin 2B + (x_3' - x_3'')^2 \sin 2C \right\}$$

$$: \underline{2 \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C} \text{ w. z. b. w.}$$




Fig. 2.

Sei nun ABC (Fig. 1) das gegebene Dreieck, das man als Fundamentaldreieck wählt, M der Umkreismittelpunkt; BB' stehe zum Radius MB senkrecht und treffe die Verlängerung von AC in B' , so ist nach dem Sinussatz im $\angle ABB'$:

$$AB' = d \cdot \sin^2 C : \sin(C - A) \text{ u. im } \angle CBB' : CB' = d \cdot \sin^2 A : \sin(C - A),$$

$$\text{somit sind die Koordinaten von } B' \left| \begin{array}{l} x_1 = -\frac{d \cdot \sin^2 A \cdot \sin C}{\sin(C - A)}; x_2 = 0 \\ x_3 = \frac{d \cdot \sin^2 C \cdot \sin A}{\sin(C - A)} \end{array} \right| \text{ und der Kreis durch } B \text{ mit } B' \text{ zum Zentrum}$$

$$\text{hat offenbar die Gleichung:}$$

$$d^2 \left\{ \left[\frac{\sin^2 A \cdot \sin C}{\sin(C - A)} \right]^2 \sin 2A + (\sin A \cdot \sin C)^2 \cdot \sin 2B + \left[\frac{\sin^2 C \cdot \sin A}{\sin(C - A)} \right]^2 \sin 2C \right.$$

$$= \left[x_1 + \frac{d \sin^2 A \cdot \sin C}{\sin(C - A)} \right]^2 \cdot \sin 2A + x_2^2 \cdot \sin 2B$$

$$+ \left[x_3 - \frac{\sin^2 C \cdot \sin A}{\sin(C - A)} \right]^2 \cdot \sin 2C$$

$$\text{da ja die Koordinaten der Ecke } B \left| \begin{array}{l} x_1 = 0, x_2 = d \cdot \sin A \cdot \sin C \\ x_3 = 0 \end{array} \right.$$

$x_3 = 0$ sind. Durch Vereinfachung wird die Kreisgleichung

$$d^2 \cdot \sin^2 A \cdot \sin^2 C \cdot \sin 2B = \frac{2x_1 \cdot d \cdot \sin 2A \cdot \sin^2 A \cdot \sin C}{\sin(C - A)}$$

$$- \frac{2x_3 \cdot d \cdot \sin 2C \cdot \sin^2 C \cdot \sin A}{\sin(C - A)} + x_1^2 \cdot \sin 2A + x_2^2 \cdot \sin 2B + x_3^2 \cdot \sin 2C.$$

Die entsprechende Gleichung für den Kreis durch die Ecke C erhält man durch Vorrücken der Buchstaben und Indices:

$$d^2 \cdot \sin^2 B \cdot \sin^2 A \cdot \sin 2C = \frac{2x_2 \cdot d \cdot \sin 2B \cdot \sin^2 B \cdot \sin A}{\sin(A - B)}$$

$$- \frac{2x_1 \cdot d \cdot \sin 2A \cdot \sin^2 A \cdot \sin B}{\sin(A - B)} + x_1^2 \cdot \sin 2A + x_2^2 \cdot \sin 2B + x_3^2 \cdot \sin 2C.$$

Die gemeinsame Sehne dieser beiden Kreise bzw. deren Gleichung erhält man durch Subtraktion der beiden Kreisgleichungen:

$$d^2 \cdot \sin^2 A \cdot \sin^2 C \cdot \sin 2B - d^2 \cdot \sin^2 B \cdot \sin^2 A \cdot \sin 2C = 2dx_1 \cdot \sin 2A \cdot \sin^2 A$$

$$\cdot \left\{ \frac{\sin(A - B) \sin C + \sin(C - A) \cdot \sin B}{\sin(A - B) \cdot \sin(C - A)} \right\} - \frac{2dx_2 \cdot \sin 2B \cdot \sin^2 B \cdot \sin A}{\sin(A - B)}$$

$$- \frac{2dx_3 \sin 2C \cdot \sin^2 C \cdot \sin A}{\sin(C - A)} \text{ oder durch Vereinfachung:}$$

$$d \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C \cdot \sin(C - B)$$

$$= x_1 \sin 2A \cdot \sin A \left[\frac{\cos 2B - \cos 2A + \cos 2A - \cos 2C}{\sin(A - B) \cdot \sin(C - A)} \right]$$

$$- \frac{2x_2 \cdot \sin 2B \cdot \sin^2 B}{\sin(A - B)} - \frac{2x_3 \cdot \sin 2C \cdot \sin^2 C}{\sin(C - A)} \text{ oder}$$

$$d \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = \frac{2x_1 \sin 2A \cdot \sin^2 A}{\sin(A - B) \cdot \sin(C - A)}$$

$$+ \frac{2x_2 \cdot \sin 2B \cdot \sin^2 B}{\sin(B - C) \cdot \sin(A - B)} + \frac{2x_3 \cdot \sin 2C \cdot \sin^2 C}{\sin(C - A) \cdot \sin(B - C)} \text{ oder wegen}$$

$d \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = x_1 \sin A + x_2 \sin B + x_3 \sin C$ wird die Gleichung der Sehne:

$$\begin{aligned} & \frac{(x_1 \sin A + x_2 \sin B + x_3 \sin C) \sin(A - B) \cdot (B - C) \cdot \sin(C - A)}{\quad} \\ & \quad - \frac{2x_1 \sin 2A \cdot \sin^2 A \sin(B - C) - 2x_2 \sin 2B \cdot \sin^2 B \sin(C - A)}{\quad} \\ & \quad - \frac{2x_3 \sin 2C \cdot \sin^2 C \sin(A - B)}{\quad} = 0 \end{aligned}$$

Durch Vorrücken der Buchstaben und Indices wird diese Gleichung nicht geändert, d. h. unsere drei Kreise haben eine gemeinsame Sehne im Endlichen, gehen also durch zwei feste Punkte O u. O' im Endlichen w. z. b. w.

Beweis zu 2. Nach dem Cosinussatz ergibt sich (Fig. 1) $\overline{C'B'}^2 = \overline{C'O}^2 + \overline{B'O}^2 - 2\overline{C'O} \cdot \overline{B'O} \cdot \cos(C'OB')$ und anderseits $\overline{C'B'}^2 = \overline{AB'}^2 + \overline{AC'}^2 - 2\overline{AB'} \cdot \overline{AC'} \cdot \cos A$ od. da aus $\triangle ABB'$ folgt: $AB' = d \cdot \sin^2 C : \sin(C - A)$ u. $B'O = B'B = \frac{d \cdot \sin A \cdot \sin C}{\sin(C - A)}$ und aus $\triangle ACC'$: $AC' = d \cdot \sin^2 B : \sin(B - A)$ u.

$C'O = CC' = d \cdot \sin B \cdot \sin A : \sin(B - A)$ (nach dem Sinussatz)

$$\begin{aligned} & \frac{d^2 \cdot \sin^4 C}{\sin^2(C - A)} + \frac{d^2 \cdot \sin^4 B}{\sin^2(A - B)} + \frac{d^2 \cdot 2 \cdot \sin^2 C \cdot \sin^2 B \cdot \cos A}{\sin(C - A) \cdot \sin(A - B)} \\ & = d^2 \left[\frac{\sin A \cdot \sin C}{\sin(C - A)} \right]^2 + d^2 \left[\frac{\sin B \cdot \sin A}{\sin(A - B)} \right]^2 \\ & \quad + \frac{2d^2 \cdot \sin^2 A \cdot \sin B \cdot \sin C \cdot \cos(C'OB')}{\sin(C - A) \cdot \sin(A - B)} \end{aligned}$$

od. durch Vereinfachung:

$$\begin{aligned} & \frac{\sin^2 C (\sin^2 C - \sin^2 A)}{\sin^2(C - A)} + \frac{\sin^2 B (\sin^2 B - \sin^2 A)}{\sin^2(A - B)} \\ & + \frac{2\sin^2 C \cdot \sin^2 B \cdot \cos A}{\sin(C - A) \cdot \sin(A - B)} = + \frac{2\sin^2 A \cdot \sin B \cdot \sin C \cdot \cos(C'OB')}{\sin(C - A) \cdot \sin(A - B)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{od.} \quad & \frac{\sin^2 C \cdot \sin B}{\sin(C - A)} - \frac{\sin^2 B \cdot \sin C}{\sin(A - B)} + \frac{2\sin^2 C \cdot \sin^2 B \cdot \cos A}{\sin(C - A) \cdot \sin(A - B)} \\ & = + \frac{2\sin^2 A \cdot \sin B \cdot \sin C \cdot \cos O}{\sin(C - A) \cdot \sin(A - B)} \quad \text{oder} \end{aligned}$$

$$\frac{\sin C}{\sin(C-A)} - \frac{\sin B}{\sin(A-B)} + \frac{2\sin C \cdot \sin B \cdot \cos A}{\sin(C-A) \cdot \sin(A-B)} \\ = \frac{+ 2\sin^2 A \cdot \cos O}{\sin(C-A) \cdot \sin(A-B)}$$

woraus: $\sin C \cdot \sin(A-B) - \sin B \cdot \sin(C-A) + 2\sin C \cdot \sin B \cdot \cos A$
 $= + 2\sin^2 A \cdot \cos O$ oder

$$\sin C(\sin A \cdot \cos B - \cos A \cdot \sin B) - \sin B(\sin C \cdot \cos A - \cos C \cdot \sin A) \\ + 2\sin C \cdot \sin B \cdot \cos A = + 2\sin^2 A \cdot \cos O \quad \text{oder} \quad \sin^2 A = 2\sin^2 A \cdot$$

$\cos O$, also $\underline{\cos O = + \frac{1}{2}}$ d. h. $\angle C'OB' = 60^\circ$; in gleicher
 Weise ist $\angle A'OC' = 120^\circ$ u. $\angle B'OA' = 60^\circ$ w. z. b. w.

Beweis zu 3 (Fig. 1). Sind BB'' u. BB''' die innern
 und äussern Winkelhalbierenden in $\triangle ABC$ an der Ecke B, so
 ist:

$$\angle B''BC = \frac{B}{2}; \quad \angle CBB' = A, \quad \text{also} \quad \angle B''BB' = A + \frac{B}{2},$$

ferner ist $\angle BB''B' = A + \frac{B}{2}$, als Aussenwinkel des Dreiecks
 ABB'' , darum $\angle B''BB' = \angle BB''B'$, somit

$$\underline{B'B = B'B''} \quad \text{w. z. b. w.}$$

Gleicherweise ist $\angle B'BB''' = 90 - A - \frac{B}{2}$ nach dem
 vorigen u. $\angle BB'''B' = 90 - A - \frac{B}{2}$ als Folge
 des vorangegangenen, somit

$$\angle B'BB''' = \angle BB'''B', \quad \text{d. h.}$$

$$\underline{B'B = B'B'''} \quad \text{w. z. b. w.}$$

Satz: Im rechtwinkligen Dreieck ABC (Fig. 3) ist
 die Verbindungslinie der Kathetenmitten Radical-
 axe (P_1P_2) eines Kreissystems, bestehend aus drei
 Kreisen, wozu der Umkreis (M) gehört. Dieser ent-
 hält die Mittelpunkte M_1 und M_2 der beiden andern
 Kreise, welche durch die Berührungspunkte des
 innerlich berührenden Kreises an den Katheten

bezw. durch seinen Berührungspunkt an der Hypothenuse gehen.

Beweis: Wir legen ein rechtwinkliges Koordinatensystem zu Grunde mit Umkreismittelpunkt M zum Anfangspunkt, dessen positive Axenrichtungen Mx u. My parallel den Kathetenrichtungen CB und CA sind. Ist sodann M_1MM_2 in M zur Hypothenuse senkrecht mit M_1 u. M_2 zu Schnittpunkten am Umkreise, so sind M_1 , M u. M_2 die Zentren unseres Kreissystems mit der Verbindungslinie der Kathetenmitten zur gemeinsamen Sehne.




Fig. 3.

Bedeutet P_1 und P_2 die Schnittpunkte dieser Radikalaxe mit dem Umkreis, A_1 , B_1 , C_1 die bezüglichen Berührungspunkte des Inkreises (Zentrum O), so wird behauptet:

$$\underline{M_1P_1 = M_1A_1 = M_1B_1} \quad \text{u.} \quad \underline{M_2P_1 = M_2C_1}$$

Die Koordinaten von M_1 , M_2 , A_1 , B_1 , C_1 u. P_1 sind, wenn wiederum d den Umkreisdurchmesser vorstellt:

$$\text{von } M_1 \left| \begin{array}{l} x = \frac{d \cdot \cos A}{2} \\ y = \frac{d \cdot \cos B}{2} \end{array} \right. ;$$

$$\text{von } M_2 \left| \begin{array}{l} x = -\frac{d \cdot \cos A}{2} \\ y = -\frac{d \cdot \cos B}{2} \end{array} \right. ;$$

$$\text{von } A_1 \left| \begin{array}{l} x = d \frac{\sin B - 1}{2} \\ y = -\frac{\sin B \cdot d}{2} \end{array} \right. ;$$

$$\text{von } B_1 \left| \begin{array}{l} x = -\frac{\sin A \cdot d}{2} \\ y = \frac{\sin A - 1 \cdot d}{2} \end{array} \right. ;$$

$$\text{von } C_1 \left| \begin{array}{l} x = d \sin A \frac{\sin B - \sin A}{2} ; y = d \sin B \frac{\sin A - \sin B}{2} \end{array} \right.$$

$$\text{von } P_1 \left| \begin{array}{l} x = d \left[-\sin^2 B \cdot \cos B \pm \cos B \sqrt{\cos^2 B + \sin^4 B} \right] : 2 \\ y = d \left[-\cos^2 B \sin B \mp \sin B \sqrt{\cos^2 B + \sin^4 B} \right] : 2 \end{array} \right.$$

denn der Radius r des Inkreises ist ja :

$$\begin{aligned} r &= d^2 \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C : d (\sin A + \sin B + \sin C) \\ &= 8d \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \cdot \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2} \\ &\quad : 4 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2} = 2d \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \\ &= d \frac{\cos A + \cos B + \cos C - 1}{2} = \frac{\sin A + \sin B - 1}{2} \cdot d \text{ für} \end{aligned}$$

unsern Fall von $C = 90^\circ$; woraus für A_1 u. B_1 die angegebenen Werte folgen (Fig. 3).

Für C_1 ergeben sich daraus die Koordinaten:

$$\begin{aligned} x &= d \frac{\sin B - 1}{2} + \frac{d \sin A + \sin B - 1}{2} \cdot \cos A \\ &= d \frac{\sin A \cdot \sin B + \sin^2 B - 1}{2} = d \sin A \frac{\sin B - \sin A}{2} \\ y &= -\frac{d \cdot \sin B}{2} + d \cdot \frac{\sin A + \sin B - 1}{2} \cdot \sin A + d \frac{\sin A + \sin B - 1}{2} \\ &= d \frac{\sin^2 A + \sin A \cdot \sin B - 1}{2} = d \cdot \sin B \cdot \frac{\sin A - \sin B}{2} \text{ wie an-} \\ &\text{gegeben.} \end{aligned}$$

Für $P_1 P_2$ aber besteht die Gleichung:

$$y + \frac{\sin B}{2} \cdot d = -x \operatorname{tg} B \text{ und für den Umkreis } x^2 + y^2 = \frac{d^2}{4},$$

woraus für P_1 und P_2 folgt:

$$x^2 + \frac{\sin^2 B (\cos \cdot d + 2x)^2}{4 \cdot \cos^2 B} = \frac{d^2}{4} \quad \text{oder}$$

$$4x^2 + 4 \cdot \sin^2 B \cdot \cos B \cdot d \cdot x - d^2 \cdot \cos^2 B + d^2 \cos^2 B \cdot \sin^2 B = 0$$

$$\text{od. } 4x^2 + 4 \sin^2 B \cdot \cos B \cdot d \cdot x - d^2 \cdot \cos^4 B = 0, \text{ woraus}$$

$$x_{P_1|P_2} = \left\{ -\sin^2 B \cdot \cos B \cdot d \pm d \cdot \cos B \sqrt{\cos^2 B + \sin^4 B} \right\} : 2$$

$$y_{P_1|P_2} = \left\{ -\cos^2 B \sin B \cdot d \mp d \cdot \sin B \sqrt{\cos^2 B + \sin^4 B} \right\} : 2$$

wie angegeben.

Hiernach ergibt sich:

$$\begin{aligned} \overline{M_1 P_1}^2 &= \left[\cos A + \sin^2 B \cdot \cos B \mp \cos B \sqrt{\cos^2 B + \sin^4 B} \right]^2 \frac{d^2}{4} \\ &\quad + \left[\cos B + \cos^2 B \cdot \sin B \pm \sin B \sqrt{\cos^2 B + \sin^4 B} \right]^2 \frac{d^2}{4} \\ &= \left[1 + \sin^2 B \cdot \cos^2 B + \cos^2 B + \sin^4 B + 2 \sin A \cdot \sin B \right] \frac{d^2}{4} \\ &= \frac{d^2}{2} \left(1 + \sin A \cdot \sin B \right), \text{ ferner} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{M_1 A_1}^2 &= \left[\cos A - \sin B + 1 \right]^2 \frac{d^2}{4} + \left[\cos B + \sin B \right]^2 \frac{d^2}{4} \\ &= \frac{d^2}{2} \left(1 + \sin A \cdot \sin B \right) \text{ u.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{M_1 B_1}^2 &= \left(\cos A + \sin A \right)^2 \cdot \frac{d^2}{4} + \left[\cos B - \sin A + 1 \right]^2 \cdot \frac{d^2}{4} \\ &= \frac{d^2}{2} \left(1 + \sin A \cdot \sin B \right) \text{ also:} \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{M_1 P_1 = M_1 A_1 = M_1 B_1 = M_1 P_2}} \text{ w. z. b. w.}$$

weiter:

$$\begin{aligned} \overline{M_2 P_1}^2 &= \left[-\cos A + \sin^2 B \cdot \cos B \mp \cos B \sqrt{\cos^2 B + \sin^4 B} \right]^2 \cdot \frac{d^2}{4} \\ &\quad + \left[-\cos B + \sin B \cdot \cos^2 B \pm \sin B \sqrt{\cos^2 B + \sin^4 B} \right]^2 \cdot \frac{d^2}{4} \\ &= \frac{d^2}{4} \left[1 + \sin^2 B \cdot \cos^2 B + \cos^2 B + \sin^4 B - 2 \sin B \cdot \cos B \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{d^2}{2} (1 - \sin A \cdot \sin B) \text{ u.}$$

$$\begin{aligned} \overline{M_2 C_1}^2 &= \left[-\cos A - \sin A (\sin B - \sin A) \right]^2 \cdot \frac{d^2}{4} \\ &\quad + \left[-\cos B - \sin B (\sin A - \sin B) \right]^2 \cdot \frac{d^2}{4} \\ &= \frac{d^2}{4} \left[1 + (\sin A - \sin B)^2 \right] = \frac{d^2}{2} (1 - \sin A \cdot \sin B) \end{aligned}$$

woraus folgt:

$$\underline{M_2 P_1 = M_2 C_1 = M_2 P_2. \text{ w. z. b. w.}}$$
