

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern

Band: - (1927)

Artikel: Die Alpenpflanzenkolonien des Napfgebietes und die Geschichte ihrer Entstehung

Autor: Lüdi, Werner

Kapitel: [Karten]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-319340>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 13.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Kartenskizze des Oberen Emmagebietes.

Zeigt die Verbreitung der "Napf pflanzen" in den zwischen der Napfkette und den Voralpen gelegenen Gebieten.

- subalpine Arten der Felsfluren, Frischwiesen, Hochstauden, Wälder u. Geb.
- subalpine Arten der Zwergebüsche, Heidewiesen
- † dem Napf fehlende, in den südlichen Gebieten neu hinzukommende Arten.

- d. Hauptkette d. Napfes
- B. Brandsegg
 - Bu. Buchenhausfluh
 - E. Enzischwand
 - F. Farnli-Esel
 - He. Hengstfluh 1374
 - Ho. Hohmatt
 - K. Kampenknubel 1264
 - Kr. Kröschenbrunnen

Abkürzungen.

- L. Lushütte
- Pf. Pfeifer
- R. Rathausenegg
- R.E. Romooser-Enzi
- Sch. Schwesternboden
- Schi. Schinenzinggen
- St. Stächelegg
- Ste. Steinboden
- T. Tomesboden




Abb. 1. Eiflüh, Nordseite. Im Hintergrund Napfgrat.




Abb. 2. Blick von oben in die Hengstflüe.




Abb. 3. Geissgratfluh. Nordseite.




Abb. 4. Hodenzi und Napf von Südwesten.



Abb. 5. *Blechnum spicant*, Schwertlahoden.




Abb. 6. Buchenwald mit Hochstauden, Napf.



Abb. 7. Felssvegetation an der Einfühl.



Abb. 8. *Dryas octopetala*, Städellegg.