

Zeitschrift: Mémoires de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 4 (1931-1934)
Heft: 3

Artikel: Contribution à l'étude des Stromatopores secondaires
Autor: [s.n.]
Anhang: [Planches]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-250699>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>




Fig. 1. *Actinosfroma rhodaclada*.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 2. *Actinosfroma rhodaclada*.
Coupe transversale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 3. *Actinosfroma Jeanneti*. Echantil. B.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.N.)




Fig. 1. *Actinosstroma Jeanneti*. Echantil. A.
Coupe transversale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 2. *Actinosstroma Jeanneti*. Echantil. A.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 3. *Actinosfromaria Lugeoni*.
Echantillon original de Dehorne.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)

ACTINOSTROMARIA LUGEONI



*Fig. 3. Echantillon E.
Coupe transversale. Gross. 6 fois. (M.L.)*






Fig. 2. Même coupe que la précédente.




*Fig. 1. Echantillon A.
Coupe transversale. Gross. 6 fois. (M.L.)*

ACTINOSTROMARIA LUGEONI



*Fig. 3. Echantillon A.
Coupe longitudinale dans le bas et oblique
dans le haut. Gross. 6 fois. (M.L.)*



*Fig. 2. Echantillon B.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)*



*Fig. 1. Echantillon A.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois.
(M.L.)*

ACTINOSTROMARIA




Fig. 3. *A. dasycana*. Echantillon A.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 2. *A. stellata*. Echantillon A.
Coupe transversale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 1. *A. stellata*. Echantillon B.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.N.)

ACTINOSTROMARIA




Fig. 3. *A. lepfocana*. Echantillon A.
Coupe transversale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 2. *A. lepfocana*. Echantillon B.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 1. *A. dasycana*. Echantillon B.
Coupe transversale. Gross. 6 fois. (M.N.)

STOMATOPORA




Fig. 3. *Str. loxola*. Echantillon E.
Coupe transversale au rameau montrant les
deux zones axiale et périphérique.
Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 2. *Str. loxola*. Echantillon E.
Coupe longitudinale à l'axe d'un rameau.
Les deux zones (axiale à droite périphérique
à gauche) sont moins marquées.
Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 1. *Str. loxola*. Echantillon C.
Coupe transversale à l'axe d'un rameau,
montrant les deux zones axiale et périphérique.
Gross. 6 fois. (M.L.)

STOMATOPORA




Fig. 3. *Str. mecosola*. Echantillon C.
Coupe oblique, montrant une astorhize
tabulée. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 2. *Str. mecosola*. Echantillon A.
Coupe longitudinale, montrant des tubes
zoïdaux particulièrement longs.
Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 1. *Str. mecosola*. Echantillon A.
Coupe parallèle aux piliers à gauche, oblique
à droite en bas, et montrant de nombreuses
tabulae dédoublées. L'astorhize est tabulée
également. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 1. *Stromatopora mecosola*.
Echantillon A. Coupe longitudinale montrant des tabulae zooidales et astrobisales dédoublées et très développées. Gross. 6 fois.
(M.L.)




Fig. 2. *Milleporidium variocellatum*.
Echantillon D. Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 3. *Milleporidium variocellatum*.
Echantillon E. Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 1. *Milleporidium variocellatum*.
Echantillon A. Coupe transversale. Les
pores zooïdaux sont de calibre assez régulier.
Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 2. *Milleporidium variocellatum*.
Echantillon A. Coupe transversale. Les
pores sont plus variables que dans la figure
précédente. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 3. *Milleporidium variocellatum*.
Echantillon A. Coupe longitudinale dans le
haut, oblique dans le bas. Les tubes zooïdaux
sont très irréguliers. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 1. *Milleporidium variocellatum*
Echantillon C. Coupe longitudinale.
Gross. 9 fois. (M.L.)




Fig. 2. Même échantillon que la précédente.
Coupe transversale. Gross. 9 fois (M.L.)




Fig. 3. *Milleporidium variocellatum*.
Echantillon B. Coupe transversale.
Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 1. *Siphostroma Arzieri*.
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)




Fig. 2. *Siphostroma Arzieri*.
Coupe transversale. Gross. 6 fois. (M.L.)



Fig. 3. *Burgundia Trinorchii*. Echantillon
original de Dehorne provenant du Risou, Jura
Coupe longitudinale. Gross. 6 fois. (M.L.)



Fig. 1. *Milleporidium variocellatum*. Echantillon A. Face inférieure.
Les divisions de la cote mesurent 1 cm. (M.L.)






Fig. 2. *Actinostroma Jeanneti*. Echantil. A.
Coupe longitudinale, montrant la structure
radiale du squelette. Gross. 80 fois. (M.L.)



*Fig. 1. Stromatopora mecosola. Echantillon A. Type d'échantillon digité.
Les divisions de la cote mesurent 1 cm. (M.L.)*



*Fig. 2. Milleporidium variocellatum. Echantillon B. Colonie mamelonnée.
Les divisions de la cote mesurent 1 cm. (M.L.)*

