

Meteorologische Tabellen und landwirtschaftliche Beobachtungen vom Julius, August, September, Oktober, November und December 1763

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Abhandlungen und Beobachtungen durch die Ökonomische
Gesellschaft zu Bern gesammelt**

Band (Jahr): **5 (1764)**

Heft 2

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

VIII.

Meteorologische

T a b e l l e n

und

landwirthschaftliche

B e o b a c h t u n g e n

vom

Julius, August, September, Oktober,
November und December

1 7 6 3.

II. Stük 1764.

2

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fifth block of faint, illegible text in the lower section.

Sixth block of faint, illegible text near the bottom of the page.

Meteorologische Beobachtungen.

Julius 1763.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt:

	zoll.	lin.
zu Bern den 2.	26.	$9\frac{1}{2}$
zu Orbe den 2. 3. und 6.	26.	$10\frac{3}{4}$
zu St. Cergue den 2. und 3.	24.	$10\frac{1}{4}$
zu Cottens den 2. und 3.	26.	$6\frac{3}{4}$
zu Losane den 3.	26.	$7\frac{1}{4}$
zu Vivis den 2. 3. 5. und 6.	26.	$7\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 2.	26.	2.
zu Kilchberg den 2. und 3.	26.	$8\frac{1}{2}$

Sein niedrigster Standpunkt:

	zoll.	lin.	Veränd.
zu Bern den 23. und 30ten	26.	4.	$5\frac{1}{2}$
zu Orbe den 14.	26.	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{4}$
zu St. Cergue den 30.	24.	6.	$4\frac{1}{4}$
zu Cottens den 30.	26.	2.	$4\frac{3}{4}$
zu Losane den 14.	26.	2.	$5\frac{1}{4}$
zu Vivis den 14.	26.	$1\frac{1}{2}$	6.
zu Trachselwald den 30.	25.	8.	6.
zu Kilchberg den 23.	26.	3.	$5\frac{1}{2}$

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt:

	grad.
zu Bern den 12ten	$16\frac{1}{2}$
zu Orbe den 13.	16.
zu St. Cergue den 12.	11.
zu Cottens den 14. und 23.	13.
zu Losane den 13. und 14.	$14\frac{1}{2}$
zu Vivis den 11. 14. und 23.	15.
zu Trachselwald den 13.	$13\frac{1}{2}$
zu Kilchberg den 12. und 13.	14.

164 Meteorologische Tabellen

	Sein niedrigster Standpunkt:	Veränd. grad. grad.
zu Bern den 11ten	4	20 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 30.	3	16 $\frac{3}{4}$
zu St. Cergue den 27.	5	16.
zu Cottens den 15. 16. und 30.	$\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 25.	$\frac{1}{4}$	14 $\frac{1}{4}$
zu Vivis den 31.	1	14.
zu Trachselwald den 3.	4	17.
zu Kilchberg den 21. und 22.	0	14.

	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme:			der Graden der Kälte		
	Morg.	Mitt.	Abend.	Morgen.	Mit.	Ab.
zu Bern	55.	330 $\frac{1}{2}$	102.	25.	-	1 $\frac{1}{2}$
zu Orbe	102 $\frac{1}{4}$	293 $\frac{1}{2}$	132 $\frac{1}{4}$	-	$\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{4}$
zu St. Cergue	31 $\frac{1}{4}$	149.	40 $\frac{1}{4}$	31 $\frac{1}{2}$	-	22 $\frac{3}{4}$
zu Cottens	109 $\frac{1}{4}$	264 $\frac{3}{4}$	148 $\frac{1}{4}$	-	-	-
zu Losane	115 $\frac{1}{2}$	307 $\frac{3}{4}$	168.	-	-	-
zu Vivis	148.	323.	230 $\frac{1}{2}$	-	-	-
zu Trachselwald	49.	251 $\frac{1}{2}$	82 $\frac{1}{2}$	23.	1.	8.
zu Kilchberg	159.	289.	153.	-	-	-

Regenwasser so gefallen:						
	zoll. lin. punkt					
zu Bern	.	.	.	5.	5.	4.
zu Orbe	.	.	.	3.	8.	1 $\frac{1}{2}$
zu St. Cergue	.	.	.	5.	6.	-
zu Cottens	.	.	.	3.	7.	-
zu Losane	.	.	.	4.	9.	5.
zu Vivis	.	.	.	5.	5.	6.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die witterung war in diesem monate sehr regnerisch. Der S. W. hatte die oberhand. Der vierzehnte tag ist von eines ungestümen windes wegen merkwürdig. Derselbe erhob sich über das ganze land auf den abend mit einem starken wetter, zu einer zeit, da der barometer gar nicht einen tiefen grad anzeigte; er traf mit dem schrecklichen hagel ein, wodurch ein grosser strich landes in Burgund verwüstet worden ist; das getreid riß er zu boden, zerbrach viele schosse an den reben, riß grosse bäume mit der wurzel aus, und verursachte überall in den waldungen und an den dächern vielen schaden. Cottens, Orbe, Vivis, Gosane, Bern, Kilchberg &c. Den 19. und 20. blies ein starker wind aus W. der die blätter an den fruchtbäumen besengte. Bern. Den 8. zündete das feuer vom himmel ein beladenes fuder mit heu an, ohne menschen oder pferde zu beschädigen. Orbe.

Die heuerndte ist reich; allein die witterung war dazu sehr ungünstig. Wiesen, so im frühjahre stark gewässert worden, waren nicht nach dem ordentlichen verhältniße fruchtbar. Einige küher oder bauern, die viele kühe oder anderes vieh halten, verbessern das futter, indem sie zwischen die lagen salz einstreuen. Das vieh wird dadurch zum fressen und saufen gereizt; und die auslage, die sich in einem ziemlich grossen futterstoke auf 50. pfunde salz belaufen mag, wird in der vermehrung des dinges und dem zumwache des viehes reichlich eingebracht. Bern.

Von der getreiderndte laufen sehr ungleiche berichte ein. Im untern Murgäu ist der Carfangel (Rost) an roggen und dinkel allgemein; das stroh lang aber schwarz; viele ähren taub oder leer; die guten reicher an spreu als

an fern. Man eilt daher mit der erndte ohne die vollkommene zeitigung zu erwarten. Der späte haber ist von besserer anzeige als der frühe. Die sommerfrüchte, als wiken, bonen, erbsen, sind von den sturmwinden zu boden geworfen und vom rost angegriffen. Kilchberg. Im Emmenthal ist die erndte vornemlich reich an garben, und meistens schön, wo die inger (käserwürmer) oder der hagel nicht geschadet haben. Trachselwald. In den gegenden um Bern waren die felder und äker, sowohl an der menge als in der ergiebigkeit der garben sehr verschieden. An sehr vielen orten war der rost nachtheilig; überall schädeten die winde durch das fallen des getreides, und die regen durch verhinderung der erndte. Bern. In der Waat gieng die erndte mit eingehendem monat in den ebnen, und zum ende des monates in den höhen, doch allerorten wegen nasser witterung nur langsam von statten. Viel gefallenes, leichtes, auch einiches rostiges getreid; eine mittelmäßige erndte an weizen im verhältnisse des strohes. Divis, Losane, Cottens. Der Moorhirs gewinnt igt ähren. Orbe. Man schöpft gute hofnung von der buchweizensaat, die igt zu grünen beginnt. Cottens.

Im Aargäu blühten die Reben annoch diesen monat durch, und also sehr späte und langsam; sie treiben stark in holz und laub. Kilchberg. In der Waat ist die nemliche klage; das holz schön und stark, viele trauben dünne oder in gabeln ausgewachsen; doch mangelt es weder an schönen noch an vielen trauben; allein sie bedürfen der sonnenhize mehr als gewöhnlich, damit sie reifen mögen. Divis, Losane, Cottens, Orbe.

Die fruchtbäume, die ohne das von früchten leer sind, die kühengärten, die hanf- und flachsäker, haben von den heftigen windstößen schaden gelitten. Die erndte an hanf
und

und flachs ist daher nicht von den reichsten. Bern, Kilchberg, Trachselwald, Cottens.

Unter den menschen herrscheten an einichen orten husten, kopffschmerzen, spannen über der brust. Kilchberg. An andern gegenden die rötheln, Losane; Bösertige und Flekenseiber. Cottens.

Unter dem viehe ist der stiegende oder zungenkrebs, auf französisch *Surlangue*, in patois *Fouffle* in verschiedenen theilen des kantones stark verspürt worden. Die klugen und schleunigen anstalten einer weisen Oberkeit, und der gebrauch guter mittel, (davon hier eine anzeige zugleich mit der nähern beschreibung der krankheit plaz finden soll) haben diesem wegen seinen geschwinden wirkungen und ansteckender kraft so fürchterlichem übel, ohne merklichen schaden, abgeholfen. Orbe, Cottens, Losane, Divis, Kilchberg. Man will bemerkt haben, daß bey Neus auch hünner und spazzen von dieser krankheit angegriffen worden und gestorben. Cottens. *)



*) Siehe die beschreibung der krankheit und der Mittel am ende dieser wirthschaftlichen beobachtungen.

Meteorologische Beobachtungen.

August 1763.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt:		zoll.	lin.
zu Bern den 26. und 27ten	"	26.	9.
zu Orbe den 27. und 28.	"	26.	11 $\frac{1}{2}$
zu St. Cergue den 19. 20. und 27.	"	24.	10 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 19.	"	26.	7.
zu Losane den 27.	"	26.	7 $\frac{1}{2}$
zu Bivis den 9.	"	26.	7 $\frac{3}{4}$
zu Trachselwald den 10.	"	26.	3.
zu Kilchberg den 9. 13. 19. und 20.	"	26.	8 $\frac{1}{2}$

Sein niedrigster Standpunkt:		zoll.	lin.	Veränd.
		zoll.	lin.	lin.
zu Bern den 15ten	"	26.	4.	5.
zu Orbe den 15.	"	26.	6 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{4}$
zu St. Cergue den 15.	"	24.	6.	4 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 15.	"	26.	1 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 15.	"	26.	2 $\frac{1}{2}$	5.
zu Bivis den 15.	"	26.	2 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{4}$
zu Trachselwald den 15.	"	25.	9.	6.
zu Kilchberg den 15.	"	26.	3 $\frac{1}{2}$	5.

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt:		grad.
zu Bern den 12ten	"	17.
zu Orbe den 20.	"	16 $\frac{3}{4}$
zu St. Cergue den 20.	"	12.
zu Cottens den 20.	"	13 $\frac{3}{4}$
zu Losane den 19. 20. und 28.	"	15 $\frac{1}{4}$
zu Bivis den 19. und 20.	"	16 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 19.	"	16.
zu Kilchberg den 18. 19. und 20.	"	15.

	Sein niedrigster Standpunkt:	Veränd. grad.	grad.
zu Bern den 8ten		4	21.
zu Orbe den 8.		1	17 $\frac{1}{4}$
zu St. Cergue den 8.		4 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 7. und 8.		$\frac{1}{4}$	13 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 8.		0	15 $\frac{1}{4}$
zu Vivis den 8.		1	15 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 8.		5 $\frac{1}{2}$	21 $\frac{1}{2}$
zu Kilchberg den 27.		0	15.

Summ

Summ

	der Graden der Wärme:			der Graden der Kälte:		
	Morgen.	Mitt.	Ab.	Morg.	Mitt.	Abend.
zu Bern	61.	387 $\frac{1}{2}$	156 $\frac{1}{2}$	15.	-	-
zu Orbe	115 $\frac{3}{4}$	347 $\frac{3}{4}$	186 $\frac{3}{4}$	1.	-	-
zu St. Cergue	57 $\frac{1}{2}$	185 $\frac{1}{2}$	64 $\frac{1}{2}$	14.	-	15 $\frac{1}{2}$
zu Cottens	143 $\frac{3}{4}$	308 $\frac{3}{4}$	194 $\frac{1}{4}$	-	-	-
zu Losane	136.	362 $\frac{3}{4}$	199 $\frac{1}{2}$	-	-	-
zu Vivis	193 $\frac{1}{2}$	376 $\frac{1}{2}$	270 $\frac{1}{2}$	-	-	-
zu Trachselw.	44 $\frac{1}{2}$	330 $\frac{1}{2}$	107.	14.	-	4.
zu Kilchberg	157.	331.	191 $\frac{1}{2}$	-	-	-

Regenwasser so gefallen:

	zoll.	lin.	punkt
zu Bern	2.	1.	7.
zu Orbe	1.	11.	9.
zu St. Cergue	2.	5.	4.
zu Cottens	1.	11.	-
zu Losane	2.	1.	4.
zu Vivis	3.	3.	-

Landwirthschaftliche Beobachtungen:

In diesem monat war die witterung trockener, ruhiger und angenehmer als im vorigen. Den 3. bedekte sich nachmittag der horizon aus Westen, und sah fürchterlich aus. Um 3 und ein halb uhr fiel ein plazregen mit einem entsezlichen sturmwinde, doch ohne hagel, ein, obwohl der wind zuvor aus N. W. und das gewölk sehr schnell aus S. W. gieng. Losane, Divis. Die größten wirkungen des windstosses zeigten sich im Eminenthale, um den Thunersee und in allen thälern des Oberlandes oder Allpgebirges, wo die größten bäume aus der wurzel gerissen wurden. So heftig der sturm war, so kurz ist seine dauer gewesen. Bern. Den 14. hatten wir ein donnerwetter, der bliz schlug zu Vampigny ein, und verzehrte eine scheune und zwey häuser. Cottens. Den 7. ließ sich des abends um 5. von ferne ein lange fortdauernder donner hören, mit stättem wetterleuchten begleitet; ein starker hagel traf einen strich des Baselergebietes drey stunden von hier. Kilchberg.

Die erndte gieng in den gebirgen glücklicher als im tiefern lande von statten. Ueberall giebt das getreid weniger als gewöhnlich in kern, der kern geringer in meel, und das meel schlechter im baken aus. Bern, Orbe, Cottens.

Die reben bessern sich; die späten trauben kommen den frühern zu; es giebt wohl weiche und lautere, aber noch keine reife beeren. Kilchberg, Orbe. Sie leiden von einer verwelkung hie und da, welche die wirkung eines kleinen hagels ist, Losane, Divis; oder der tröckne, die igt stark ist. Cottens.

Der grummet oder das spathen ist ziemlich reichlich ausgefallen. Bern, Kilchberg. Ohne wo die inger stark gewühlt haben. Trachselwald. In der Baat befand es sich kurz und dichte. Cottens. Und in feuchten wiesen geringer als das vorige jahr. Losane.

Hey uns sind die bergweiden schön; die käse gelten 3. bis 9. Rthlr. Hinter Cottens ist den 3. ein starker hagel in dem gebirge gefallen.

Zu Vivis zeigten sich die kinderpokken von guter art. In dem innersten theile des Emmenthales starben viele kinder von der rothen ruhr. Trachselwald.

Die krankheit unter dem viche ist überall verschwunden.



Meteorologische Beobachtungen.

September 1763.

Barometer.

	Sein höchster Standpunkt:	zoll.	lin.
zu Bern den 23ten	"	26.	8 $\frac{1}{4}$
zu Orbe den 6. und 23.	"	26.	10.
zu St. Cergue den 6. und 23.	"	24.	9.
zu Cottens den 23.	"	26.	5 $\frac{3}{4}$
zu Losane den 6. und 23.	"	26.	6.
zu Vivis den 22. und 23.	"	26.	7 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 22.	"	26.	2.
zu Kilchberg			

	Sein niedrigster Standpunkt:	Veränd.		
		zoll.	lin.	lin.
zu Bern den 28ten	"	26.	3.	5 $\frac{1}{4}$
zu Orbe den 12. und 28.	"	26.	6.	4.
zu St. Cergue den 28.	"	24.	4 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{1}{4}$
zu Cottens den 28.	"	26.	$\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{4}$
zu Losane den 28.	"	26.	1 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$
zu Vivis den 22. und 28.	"	26.	3 $\frac{1}{2}$	4.
zu Trachselwald den 28	"	25.	7.	7.
zu Kilchberg				


Thermometer.

	Sein höchster Standpunkt:	grad.
zu Bern den 3ten	"	12.
zu Orbe den 1. und 2.	"	10.
zu St. Cergue den 2.	"	5.
zu Cottens den 1. und 2.	"	8.
zu Losane den 1. 2. und 6.	"	10.
zu Vivis den 1. 2. und 6.	"	10.
zu Trachselwald den 2. und 10.	"	9.
zu Kilchberg		

Sein niedrigster Standpunkt :		Veränd.	
		grad.	grad.
zu Bern den 30ten	"	10	22.
zu Orbe den 30.	"	6	16.
zu St. Cergue den 30.	"	11	16.
zu Cottens den 29.	"	6 ³ / ₄	14 ³ / ₄
zu Losane den 30.	"	6	16.
zu Vivis den 30.	"	5	15.
zu Trachselwald den 30.	"	11	-



	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme :			der Graden der Kälte :		
	Morgen.	Mitt.	Ab.	Morg.	Mitt.	Abend.
zu Bern	8.	155.	14.	8 1/2	4.	42.
zu Orbe	23 1/2	144 3/4	45 1/4	32 1/2	1/2	17.
zu St. Cergue	7.	39 1/4	2 1/2	115 1/4	28.	105 1/2
zu Cottens	22 3/4	114 1/2	40 1/2	32.	1 1/2	22 3/4
zu Losane	25.	173 1/4	44 1/2	28 1/4	1/4	16 3/4
zu Vivis	47.	190 1/2	87 1/2	14 1/2	-	6 1/2
zu Trachselwald	1.	113.	5 1/2	117.	7.	73.



Regenwasser so gefallen :

	zoll. lin. punkt		
zu Bern	4.	3.	7.
zu Orbe	3.	3.	9.
zu St. Cergue	5.	2.	4.
zu Cottens	2.	11.	2.
zu Losane	3.	11.	10.
zu Vivis	4.	7.	6.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die witterung war unbeständig, meistens feucht und frostig. Die änderungen plötzlich bey dem thermometer; nicht so merklich bey dem barometer.

Das getreid giebt in der tenne sehr wenig aus. Schwerlich findet man sauberes getreid zur ausfaat. Cottens. Die saat ist wegen der schlimmen witterung schwerlich von statten gegangen. Gosane. Die bauern gewöhnen sich immer besser an das frühe säen, und befinden sich gut bey dieser gewohnheit. Bern. Einiche versuche mit Moorhirs scheinen sehr gut zu gelingen. Urbe.

Der grummet oder emd, spathen, ward an den feuchtern gegenden gering geschätzt. Urbe. An örtern, wo es frisch und dichte gestanden, ist es bey dem eindernden durch das nasse wetter verdorben worden. Cottens. Der letzte grasewuchs oder die spatweide leidet von den frostigen regen: denn schon den 11. und wiederum bey dem beschlusse des monates sahen wir die gipffel der niedrigeren gebirge mit schnee bestreut. Bern.

Die käse sind sehr verkäuflich; der zentner wird 8. bis 10. Rthlr. verkauft, theils weil dieses jahr ein achtel weniger als das vorige verfertiget worden, theils weil der friedenschluß die ausfuhr nach den französischen häfen geöfnet hat. Cottens. Im Emmenthale werden die feißen käse 6 und ein halb bis 8, die magern 3 bis 4 Rthlr. der zentner verkauft. Trachselwald.

Das vieh ist in hohem preise, weil das vorige jahr, wegen mangel an futter, vieles vieh getödet worden, und igt das futter in ziemlichem überflusse ist. Cottens, Trachselwald. Ein paar oxsen vom pfluge gelten 60. bis 100. Rthlr.

Rthlr. Eine melkkuh 22. bis 30. Rthlr. Underhalbjährige stiere 18. bis 24. Rthlr. vom stük. Cottens. Die feiste und junge waar von allen arten schlachtviehes ist theuer; altes und mageres vieh dagegen sehr gering geschätzt. Die pferde werden 12. bis 17. Louisd'ors bezahlt. Trachselwald.

Da die baumfrüchte fast überall gänzlich, und die wurzelgewächse, erdäpfel, gelbe rüben ic. ziemlich fehlen, so muß dieses auf den preis des getreides mitwirken. Vom gedörrten obste wird das maß 12. bis 15. bazen; vom grünen, als Sommerreinettes, 10. bazen verkauft. Bern.

Auch der honig fehlt überall; viele bienenstöcke sind verdorben, und es ist ein gleiches von dem winter zu besorgen. Orbe, Cottens.

Unter den menschen herrscheten fieber von verschiedener art. Cottens. Die rothe ruhr wütete im innersten theile des Emmenthales, unter den kindern. Trachselwald.

Meteorologische Beobachtungen.

Oktober 1763.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt :		zoll.	lin.
zu Bern den 13.	" "	26.	9 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 13.	" "	27.	-
zu St. Cergue den 13. und 23.	" "	24.	10 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 23.	" "	26.	7 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 13.	" "	26.	7 $\frac{3}{4}$
zu Vivis den 13. und 14.	" "	26.	10 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 23. und 24.	" "	26.	3.
zu Kilchberg den 13. und 14.	" "	26.	9 $\frac{1}{2}$

Sein niedrigster Standpunkt :		zoll.	lin.	Veränd.
zu Bern den 3ten	" "	26.	1 $\frac{1}{2}$	9.
zu Orbe den 3.	" "	26.	3 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$
zu St. Cergue den 3.	" "	24.	3 $\frac{1}{2}$	7.
zu Cottens den 3.	" "	25.	11.	8 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 3.	" "	25.	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$
zu Vivis den 2. und 3.	" "	26.	2.	8 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 3.	" "	25.	5.	10.
zu Kilchberg den 3.	" "	26.	1.	8 $\frac{1}{2}$

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt :		grad.
zu Bern den 19ten	" "	5.
zu Orbe den 30.	" "	5.
zu St. Cergue den 3.	" "	4.
zu Cottens den 1. und 31.	" "	4 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 30.	" "	5.
zu Vivis den 1. und 2.	" "	5 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 2. 26. und 28.	" "	5.
zu Kilchberg den 29. und 30.	" "	3 $\frac{1}{2}$

Sein niedrigster Standpunkt :

Veränd.
grad. grad.

zu Bern den 13ten	13 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 13.	9 $\frac{3}{4}$	14 $\frac{3}{4}$
zu St. Cergue den 10.	14	18.
zu Cottens den 13.	9	13 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 8.	9 $\frac{1}{4}$	14 $\frac{1}{2}$
zu Vivis den 8. und 13.	8 $\frac{1}{2}$	14.
zu Trachselwald den 8. und 13.	15	20.
zu Kilchberg den 14.	11	14 $\frac{1}{2}$

Summ

Summ

	der Graden der Wärme :			der Graden der Kälte :		
	Morgen.	Mitt.	Ab.	Morg.	Mitt.	Abend.
zu Bern	1.	51.	4.	208.	28.	127 $\frac{1}{2}$
zu Orbe	2.	37 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	146 $\frac{1}{4}$	25.	104.
zu St. Cergue	-	15 $\frac{1}{4}$	5.	215 $\frac{3}{4}$	86.	189 $\frac{1}{4}$
zu Cottens	2 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	134 $\frac{3}{4}$	52 $\frac{3}{4}$	106 $\frac{1}{4}$
zu Losane	1 $\frac{3}{4}$	46 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{3}{4}$	139 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	110.
zu Vivis	6 $\frac{1}{2}$	63 $\frac{1}{2}$	15.	124 $\frac{1}{2}$	13.	70.
zu Trachselwald	-	47.	2.	231 $\frac{1}{2}$	36.	167.
zu Kilchberg	1.	21.	5 $\frac{1}{2}$	167 $\frac{1}{2}$	52 $\frac{1}{2}$	126 $\frac{1}{2}$

Regenwasser so gefallen :

	3oll. lin. punkt		
zu Bern	3.	6.	6.
zu Orbe	3.	1.	11.
zu St. Cergue	4.	9.	3.
zu Cottens	3.	4.	-
zu Losane	3.	3.	4.
zu Vivis	3.	2.	-

II. Stck 1764,

M


Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Auch die erste woche dieses monates gieng mit stürmischem und feuchtem regenwetter ein. Den 4. fiel auf den obersten theilen des Jura ein schnee, der das vieh in die ebenen und thäler heruntertrieb. Orbe. Den 7. legte sich der schnee an die Safoyschen berge. Losane. Den 8. 9. und 13. waren sehr starke reiffen; der letztere war der kälteste tag des monates. Von demselben an war die witterung hell, beständig; gegen das ende ungemein lieblich und milde, so daß es den 29. gegen abend bey einem laulichten westenwinde donnerte, und der schnee von den zähmern gebirgen gänzlich verschwand. Orbe, Cottens, Divis, Bern, Kilchberg.

Man hat sich gezwungen gesehn, den buchweizen in der eile zu erndten. Cottens. Von dem wenigen ausgesäeten moorhirse haben wegen der ungünstigen witterung nur sehr wenige ähren zu vollkommener zeitigung gelangen können. Orbe, Bern. Die jungen getreidsaaten sind allerorten von schönster anzeige. Doch ist der preis des getreides im Aargäu wegen geringer ergiebigkeit der garben, gestiegen. Kilchberg.

In den weinbergen im Aargäu, und an dem fusse des Jura von Biel bis hinter Orbe, desgleichen an den Thuner- und Murtenseen, auch in allen geringern weinbergen im lande, hat der frost mehr oder weniger in ganzen stellen die trauben besengt, und zu fernerm wachsthum und zeitigung untüchtig gemacht. Die weinlese ist dadurch beschleuniget worden, und liefert eine ziemliche menge eines sauern, und vielleicht schädlichen getränktes, welches anfangs noch sehr verkäuflich, nachwärts aber sehr feil und gering geschätzt war. Kilchberg, Bern, Orbe, Losane, &c.

Im untern Aargau herrscheten magenschmerzen, koliken, und seit dem august die rothe ruhr, welches theils den plötzlichen abwechslungen der witterung, theils den unreifen fruchten und dem ungesunden getränke zuschreiben ist. Rülchberg. Im Emmenthale zeigen sich noch immer spuren der rothen ruhr. Trachselwald.



Meteorologische Beobachtungen.

November 1763.

Barometer.

	Sein höchster Standpunkt:	3oll.	lin.
zu Bern den 11. und 15ten	•	26.	9 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 14. und 15.	•	27.	-
zu St. Cergue den 14. und 27.	•	24.	10 $\frac{1}{4}$
zu Cottens den 14. und 15.	•	26.	7.
zu Losane den 25.	•	26.	7 $\frac{1}{2}$
zu Vivis den 24. und 25.	•	26.	11 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 15. und 23.	•	26.	3.
zu Kilchberg den 15. und 23.	•	26.	10.

	Sein niedrigster Standpunkt:	3oll.	lin.	Veränd.
zu Bern den 21ten	•	26.	$\frac{1}{2}$	lin 9.
zu Orbe den 21.	•	26.	3.	9.
zu St. Cergue den 21.	•	24.	1 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{3}{4}$
zu Cottens den 21.	•	25.	10.	9.
zu Losane den 19. und 21	•	26.	-	7 $\frac{1}{2}$
zu Vivis den 21.	•	26.	2 $\frac{1}{2}$	9.
zu Trachselwald den 1.	•	25.	7.	8.
zu Kilchberg den 19. und 21.	•	26.	1.	9.

Thermometer.

	Sein höchster Standpunkt:	grad.
zu Bern den 5. und 6ten	•	3.
zu Orbe den 9.	•	3.
zu St. Cergue den 8.	•	1.
zu Cottens den 5. 7. 8. und 9.	•	1 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 9.	•	2 $\frac{1}{2}$
zu Vivis den 1.	•	4.
zu Trachselwald den 6.	•	5.
zu Kilchberg den 5. und 6.	•	1.

Sein niedrigster Standpunkt: Veränd.
grad. grad.

zu Bern den 23ten	26	29.
zu Orbe den 22. und 23.	16	19.
zu St. Cergue den 22.	19 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 22.	16	17 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 24.	17 $\frac{1}{4}$	19 $\frac{1}{4}$
zu Vivis den 23.	16	20.
zu Trachselwald den 23.	23	28.
zu Kilchberg den 23.	22 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$

Summ

Summ

der Graden der Wärme: der Graden der Kälte:
Morgen. Mitt. Ab. Morg. Mitt. Abend.

zu Bern	- 13.	-	318.	153.	254.
zu Orbe	- 12 $\frac{1}{2}$	-	224 $\frac{1}{2}$	144 $\frac{3}{4}$	209 $\frac{1}{4}$
zu St. Cergue	- 1.	-	292 $\frac{1}{4}$	222.	302.
zu Cottens	1. 7 $\frac{3}{4}$	-	232 $\frac{1}{2}$	172 $\frac{1}{2}$	212.
zu Losane	- 14.	-	254 $\frac{1}{4}$	149.	231 $\frac{1}{4}$
zu Vivis	2. 23.	-	204.	108.	174.
zu Trachselwald	- 20.	-	328.	154.	203 $\frac{1}{2}$
zu Kilchberg	- 2.	-	285 $\frac{1}{2}$	200.	254.

Regenwasser so gefallen:

3oll. lin. punkt

zu Bern	1.	4.	4.
zu Orbe	1.	6.	6.
zu St. Cergue	2.	9.	2.
zu Cottens	1.	11.	5.
zu Losane	2.	-	7.
zu Vivis	1.	1.	-

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die erste helfte des monates war ganz milde. Zwischen dem 19. und 22. fiel ein tiefer schnee, worauf eine so starke kälte folgte, als man sonst in der mitte des winters erfährt. Die kälte nahm allmählig ab, und der schnee schmolz wieder ein ic. Die vorbeureisenden schneegänse, von denen ungewöhnliche schaaren in dem vorigen, und zu anfang dieses monates theils des abends späte gehört, theils am hellen mittage gesehen wurden, schienen diese frühzeitige kälte angekündigt zu haben. Bern.

In den weinbergen von Lakote hat man eher nicht als mit dem anfang dieses monates die weinlese gehalten. Sie war reich, und der wein ist noch von guter eigenschaft. Man brachte solche vor dem eingefallenen schnee zu ende; ohne in der gegend von Rubonne, wo über hundert fuder werthes an den stöken eingeschneht, und durch das gefrieren um den vierten theil vermindert und verdorben war. Cottens, Gosane. In Lavau, Reifthal, hatte man vor dem ende oktobers, und also vierzehn tage zu frühe die weinlese vollbracht. Vivis. In Lakote haben die besten weinberge 4. bis 6. fuder, im durchschnitt durch die ganze gegend 3. fuder von der juchart geliefert. Das fuder, zu 400. bernmassen, wird 20. bis 23. Rthlr. verkauft, und der beste wein wird stark abgeführt. Cottens. Der welsche landwein gilt 18. Rthlr. Orbe. Der beste Welschneuburgische 24, der rothe 28. Rthlr. Das gewächs vom Bielersee 18. bis 22. Rthlr. Bern.

Man hat, soviel es die witterung zuließ, die reben behaftet. Orbe. Die gewohnheit, diese arbeit vor dem winter zu beschleunigen, breitet sich, mit gutem erfolge, weiters aus. Vivis. Den 31. um 4. uhr des morgens war der thermometer auf 4. grad der wärme, und es blitzte. Vivis. Wir

Wir werden mit vielen, aber nur magern Schweinen aus Burgund versehen. Orbe.

In hiesiger nachbarschaft sind vor kurzem noch verschiedene personen an der rothen ruhr gestorben. Kilchberg. Ein löffel voll zerschmolzenen frischen butter wird von den Engländern für ein sicheres mittel gehalten, und das übel soll von der zweyten oder dritten doßis, welche allemal nach einem zwischenraume von einer oder zweyen stunden genommen wird, gänzlich gestillet werden. Die Pitiane von eicheln, die wie Caffebonen geröstet und zerstoßen werden, ist auch ein so wirksames als einfältiges mittel. Bern.

Meteorologische Beobachtungen.

December 1763.

Barometer.

	Sein höchster Standpunkt:	3oll. lin.
zu Bern den 3. und 4ten	"	26. 10.
zu Orbe den 9.	"	27. 1.
zu St. Cergue den 28. und 29.	"	24. 10 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 3. und 4.	"	26. 7.
zu Losane den 9.	"	26. 9.
zu Vivis den 9.	"	26. 4.
zu Trachselwald den 9.	"	26. 4.
zu Kilchberg den 4.	"	26. 10.

	Sein niedrigster Standpunkt:	3oll. lin.	Veränd. lin.
zu Bern den 13ten	"	25. 6.	16.
zu Orbe den 13.	"	25. 8.	17.
zu St. Cergue den 13.	"	23. 8.	14 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 13.	"	25. 3 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 13.	"	25. 4 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
zu Vivis den 13.	"	25. 6 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{4}$
zu Trachselwald den 12	"	24. 9.	19.
zu Kilchberg den 13.	"	25. 6.	16.

Thermometer.

	Sein höchster Standpunkt:	grad.
zu Bern den 31ten	"	1.
zu Orbe den 30.	"	2.
zu St. Cergue den 29. und 30.	"	2.
zu Cottens den 30.	"	1 $\frac{1}{2}$
zu Losane den 31.	"	2.
zu Vivis den 30. und 31.	"	2.
zu Trachselwald den 30.	"	3.
zu Kilchberg den 31.	"	2.

Sein niedrigster Standpunkt :

Veränd.
grad. grad.

zu Bern den 8ten	18 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 10.	13	15.
zu St. Cergue den 17. und 18.	18	16.
zu Cottens den 6.	12 $\frac{1}{2}$	14.
zu Losane den 4.	13	12 $\frac{1}{2}$
zu Bivis den 4.	12	14.
zu Trachselwald den 5. 7. und 18.	16	17.
zu Kilchberg den 5. 8. und 10.	15	17.

Summ

Summ

der Graden der Wärme : der Graden der Kälte :

	Morgen.	Mitt.	Ab.	Morg.	Mitt.	Abend.
zu Bern	1.	-	-	362.	197 $\frac{1}{2}$	286.
zu Orbe	$\frac{3}{4}$	2 $\frac{3}{4}$	1.	270.	189.	244.
zu St. Cergue	-	-	-	353 $\frac{1}{2}$	262 $\frac{1}{2}$	333 $\frac{1}{2}$
zu Cottens	$\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	264 $\frac{1}{4}$	214 $\frac{1}{4}$	245.
zu Losane	-	-	-	269 $\frac{1}{4}$	197 $\frac{3}{4}$	249 $\frac{1}{4}$
zu Bivis	1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	2.	226.	132.	198.
zu Trachselwald	1.	3.	2.	341.	221.	314 $\frac{1}{2}$
zu Kilchberg	-	2.	-	308.	256.	292 $\frac{1}{2}$

Regenwasser so gefallen :


3oll. lin. punkt

zu Bern	4.	9.	8.
zu Orbe	4.	5.	11.
zu St. Cergue	7.	5.	2.
zu Cottens	4.	4.	-
zu Losane	3.	5.	10.
zu Bivis	2.	3.	-

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die witterung war meist unlustig und unbeständig. Vom 9. welches der höchste standpunkt des quecksilbers in diesem jahre gewesen ist, bis zum 12. da es den niedrigsten grad von vielen jahren anzeigte, war die abwechslung von 16. linien, ohne daß ein sturm erfolgte. Den 2. 16. 25. 30. 31. waren heftige windstöße aus Südwesten. Orbe, Cottens, Divis, Bern, Kilchberg.

Wir sehen hier mehr Krametsvögel als gewöhnlich. Unsere bienenkörbe sind vollreich, aber nicht schwer von honig. Kilchberg.



R e g e n w a s s e r,
so im jahre 1763. gefallen.

	zoll.	lin.	punkt
zu Bern	39.	10.	1.
zu Orbe	34.	3.	2 $\frac{1}{2}$
zu St. Cergue	56.	8.	8.
zu Cottens	36.	7.	10.
zu Losane	34.	8.	4.
zu Divis	35.	10.	