

Zeitschrift: Archiv für Tierheilkunde
Herausgeber: Gesellschaft Schweizerischer Thierärzte
Band: 19 (1852)
Heft: 4

Artikel: Die Typhen der Pferde [Fortsetzung]
Autor: Rychner
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-590567>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Verletzungen an den Augenbogen, der rechten vordern Röthe, sowie die entzündliche Anschwellung des linken Oberschenkels und Kniees sind als Folgen der Quetschungen zu betrachten, welche durch das Stürzen und die krampfhaften Bewegungen während den Anfällen entstanden. Dadurch hervorgerufene Entzündung (mit Schmerz) im linken Schenkel veranlassen sowohl das Hinken mit dieser Gliedmasse als etwelche Beschleunigung des Kreislaufes.

Außersthl, den 19/20 Juli 1852.

K. Z a n g g e r, Thierarzt. *)

IV.

Die Typhen der Pferde.

Von Prof. N y c h n e r.

(Fortsetzung des pag. 233 abgebrochenen Artikels.)

I. Typhen der Schleimhäute.

Es sind hierunter diejenigen Arten von Typhen zu verstehen, deren morbide Wirkungen sich hauptsächlich über eine kleinere oder größere Parthie der Athmungs- oder Darm Schleimhäute erstrecken und sowohl während, als vielmehr nach dem Leben ihre Verwüstungen auf diesen Schleimhautparthieen deutlich wahrnehmen lassen.

*) Anmerkung. Es ist mir bei diesem Fall die Eigenthümlichkeit, daß epileptische Anfälle durch Bewegung erzeugt werden und einige Aehnlichkeit des Leidens mit Obliteration der Oberschenkelarterie nicht entgangen. Dieses konnte mich aber zu keinen andern Gutachten veranlassen. Herr Direktor Hirzel hat den Fall gleichzeitig beobachtet und unsere Ansichten über denselben sind übereinstimmend.

1. Der Petechialtyphus. (Typhus petechialis).

Begriff.

So soll jene Typhenform des Pferdes benannt sein, wo das typhöse Exanthem über die Nasenschleimhaut sich zuerst in Gestalt von Petechien und den erhabenen Exforiationsstellen (Typheneranthem) ausbreitet.

Anmerkung. Petechien (petechiæ) zeigen sich als rothe Stellen, deren Röthe nicht wegdrückbar ist und kommen theils auf der allgemeinen Decke, theils auf den Schleimhäuten vor. Oft sind die Petechien mehr vertieft und ähneln Verschwärungen, oft erhöht gleich Exanthemen.

Die Petechie besteht in einem Blutaustritt in das Gewebe (extravasatio) in Folge der Blutstasis, sowie sie in den Typhen existirt.

Im Typhus der Pferde ist die Petechie als exanthematisch anzusehen. Bezüglich zum zentrischen Leiden halten wir sie für symptomatisch; von der Ecchymosis aber unterscheidet sie sich durch den geringern Umfang und daß die Ecchymosis forrodirt.

Vorkommen.

Weil erst in neuern Zeiten und zwar in den Jahren 1833 die Typhen der Pferde ein ernsteres Studium denkender Thierärzte ausmachten, so herrschen über frühere Typhenepizootieen immer einige Zweifel, jedoch nicht in der Art, daß man ihre frühere Existenz bezweifelt. Es haben nämlich mehrere Schriftsteller seit 1803, so Pilger, Tenneker u. a. m. Krankheiten beschrieben, welche z. B. dem Petechialtyphus so ähnlich sehen, wie ein Ei dem andern, aber bald figurirte die

Krankheit unter dem Namen Milzbrand, dann auch wurde sie, namentlich von französischen Thierärzten akuter Noz (morve aigue) genannt; von deutschen auch bössartiger Chatarrh, bössartiges Schleimfieber u. s. w. Es ist auch sehr die Frage, wie oft die Influenza mit dem Typhus überhaupt und dem petechialis verwechselt wurde. Wie schon gesagt, seit dem Jahre 1833 sind von mehreren Thierärzten die Typhen mit mehr Bewußtsein angesehen und seither begriffen worden. Dannzumal, gewöhnlich bei einer Umschlagung des guten Wetters in regnerisches und bei mehrerer Abkühlung der Luft (Frühjahr 1834) stand der Typhus cerebralis stille und dafür trat der T. petechialis häufiger auf. Wir haben unser Tagebuch vor uns liegen und finden die Erkrankungsfälle ganz eintreffend mit den Witterungsnotizen.

Es kamen dann während den Jahren 1835 und 1836 noch vereinzelte Fälle vor; sehr wenige oder fast gar keine mehr bis zum Jahre 1847, wo aus dem Sonderbundsfeldzug einige Exemplare dieser alten Bekannten mit uns noch mehrere Kollegialitäten begrüßten, die sich von den frühern Fällen einzig durch einen etwas mildern Verlauf unterschieden. Auch ist es kaum 4 Wochen, seit dem wir der Sektion eines sehr entwickelten Falles beiwohnten.

Symptomatologie.

Wir waren nie im Falle vorläufige Symptome dieser Krankheitsform aufzufinden, namentlich bei dem Seuchenzuge von 1834, während sich bei der Entwick-

lung der Krankheit im Sonderbundsfeldzuge hin und wieder katarrhalische Zufälle merkbar machten. Meistens, zur Zeit wo Typhen herrschen, findet die am Morgen zuerst in den Stall eintretende Person ein Pferd in folgendem Zustande:

Vor allem aus wird der Blick des Beobachters durch die Beschaffenheit des Kopfes gefesselt.

Der Umfang desselben ist bedeutend vermehrt, d. h. der Kopf angeschwollen, vorzüglich die Augenlieder und die Theile von den Jochleisten an ab- und rückwärts bis auf die Nasenspitze und Lippen.

Die Farbe der Anschwellung läßt sich am ehesten in der Bindehaut des Auges und der untern Parthie der Schleimhaut der Nase wahrnehmen, wo eine allgemeine Gefäßröthe stark auffällt.

Die Temperatur der Anschwellung ist sehr erhöht, die Empfindlichkeit dagegen indifferant.

In Bezug auf den Widerstand ist sie zwar in den ersten Stunden noch etwas gespannt, bald aber teigig.

Die Umfangsvermehrung betrifft aber auch spezieller die Lymphdrüsen im Kehlgange.

Die willkürlichen Bewegungen des Patienten sind ungeschickt, unsicher, sehr abgeschlagen und im übrigen wird der Kopf gesenkt getragen, auch findet kein Niederliegen statt.

Die Athmungsbewegungen sind etwas bethätigt, das Athmen geschieht mit blasendem Nasengeräusche; die Pulsbewegungen beschleunigt, ungestüm, wild, bis auf 60 und 80 Schläge per Minute, der

Puls meistens noch voll, aber doch zur Weichheit sich stark hinneigend. Der Herzschlag ist stark fühlbar. —

Aus Nase und den Augenspalten bemerkt man bereits etwas wässerigen Ausfluß.

Außer diesem ist, was das Dausesystem anbetrifft, die Freßlust vermindert, fast aufgehoben, das Maul fast ungewöhnlich warm, roth und feucht.

Das Schlingen meist erschwert; es ist wenig Darmgetön bemerkbar und dann nur einzelne Strick-
turlaute (Knurren). — Der Kothabgang ist un-
terdrückt, und geht je etwas ab, so ist der Koth fest,
dunkel und trocken. Der Durst variirt, bald trinken
die Kranken mehr, bald weniger.

Die Haut ist meistens warm anzufühlen, doch ist
diese Wärme ungleich vertheilt; die Haut ist übrigens
immerhin noch trocken genug.

Die Harnentleerung geschieht selten, dann ziemlich
viel auf einmal, jedoch wechselnd zwischen wasserhell
und weingelb, immer ohne Bodensatz.

So die ersten Erscheinungen, oder so der Anfang
der Krankheit.

Verlauf und Ausgang.

Zwölf bis 24 Stunden nach dem nun bemerkten
Zustande treten selbst bei ärztlicher Behandlung fast
unaufhaltsam folgende Veränderungen ein:

Entweder vermehrt sich noch die Anschwellung des
Kopfes, oder sie bleibt sich gleich, und im letztern Falle,
vorwaltend ödematös, senkt sich die Geschwulst mehr
der Nase und den Lippen zu und wird teigiger, dann

bilden sich auch ausgedehntere Fußödeme, manchmal auch am Bauche.

Doch die wichtigsten Veränderungen in der Periode des Steigens der Krankheit treten nun auf der Nasenschleimhaut, der allgemeinen Decke und in dem Nervenleben ein. In erster'm Bezuge ist es die Exanthemenbildung, in letzter'm der Stupor.

Auf der Nasenschleimhaut machen sich nun stark geröthete Flecke in Menge bemerkbar. Die Röthe ist zuweilen sehr lebhaft, oft auch ziemlich dunkel; der Umfang dieser Flecken steigt zuweilen noch über die Größe einer Linse.

Zugleich treten an den verschiedensten Körperstellen auf der Haut Beulen hervor, höchstens von der Größe einer Haselnuß, mit verfilzten Haaren und manchmal einer serösen, röthlichen Ausstückerung. Die Oedeme der Füße sind, wenn die Hauteruption auftritt, etwas geringer. Der Hauteruption geht kein Jucken voran, und kein Jucken begleitet dieselbe; sie ist auch nicht schmerzhafter Art.

Kaum sind die Schleimhaut- und Hautpetechien aufgetreten, so erscheint eine neue Veränderung in der Nase; es zeigt sich nun ein koptöser Nasenausfluß, mehr serumfarbig, bernsteingelb, seltener einem katarrhalischen ähnlich, nicht anklebend, mehr fließend, oft Blutstreifen enthaltend; mit diesem ändert sich auch das blasende Geräusche der Nase in ein plätscherndes und nur einige Stunden, so haben die Petechien eine Metamorphose gemacht, welche oberflächlich angesehen mit den Nozgeschwüren die größte Aehnlichkeit hat,

aber bei genauerer Betrachtung und Befühlen eher erhaben als vertieft sind; daneben mit dem weißlich-gelblichen Aussehen stark aus der dunkler gerötheten Schleimhaut sich auszeichnen. —

Die Hautpetechien ändern sich wenig und verschwären nie gehörig.

Die Stumpfheit vermehrt sich und das Bewußtsein wird immer mehr umnebelt. Es ist wie Zufall, wenn die Kranken das Futter oder Getränk berühren und doch geschieht es, daß sie manchmal einige Halmen Heu oder etwas Kleie ins Maul zu nehmen versuchen; lieber dagegen trinken sie, und am liebsten frisches kaltes Wasser. Der nervöse Zustand tritt aber zugleich hervor in Gefährdung des Gleichgewichtes (Schwanken).

Die Athmungsbewegungen bleiben sich noch ziemlich gleich, nur ist der Husten häufiger und die ausgeathmete Luft wärmer; dagegen steigen die Pulse, obschon schwächer und selbst in einander fließender werdend; auch verkleinert sich der Puls und ist leicht unterdrückbar. Der Herzschlag aber verwandelt sich in ein wahres Herzklopfen.

Das Maul ist heißer, sein Inhalt klebriger.

Die allgemeine Decke, neben dem nämlichen Bestand der Petechien, hat oft brennend heiße Stellen.

Der Urin wird gerötheter, röther als bierfarbig und läßt Laugengeruch wahrnehmen.

Man dürfte auch füglich diesen Stand die Höhe der Krankheit nennen, aus welchem wohl nie mehr die Krankheit (wenigstens nach unsern Beobachtungen)

in Genesung übergeht, vielmehr folgen nun unaufhaltsam die dem baldigen Tode vorangehenden Symptome, als gerne eintretender Durchfall, flebrige, übelriechende Schweisse, Wanken, Niederfallen, fruchtlose Versuche zum Aufstehen und Zuckungen, unter denen übrigens ohne großen Todeskampf das Leben bald endet.

So der gewöhnliche Ausgang der Krankheit, deren Verlauf in 4 bis 6, seltener 8 Tagen beendigt ist. — Zweckmäßige Behandlung dehnt die Dauer allerdings weiter hinaus, jedoch zum Heil der Kranken.

In den wenigen in Genesung übergehenden Fällen finden die günstigen, prognostischen Erscheinungen schon am 2ten und 3ten Tage der Krankheit statt und wir kennen Beispiele, daß solche Kranke bis auf 14 Tage immer unter einigen günstigen Auspizien durchgeschleppt, doch am Ende noch eingingen, aber auch zu einer definitiven Rekonvaleszenz ihre 4 und 6 Wochen erforderten.

Zu diesen günstigen prognostischen Erscheinungen gehören Herstellung der Darmsekretionen, beruhigter Puls und Abnahme der Stumpfheit; obschon nichts destoweniger die Petechien sich ausbilden, doch ohne die kopiösen Ausflüsse und ohne Steigung der Schleimhautröthe.

Diagnosir.

Diese Krankheit wurde nach unsern Beobachtungen doppelt unrichtig diagnostizirt, insofern nämlich sie einige Zeit lang und namentlich von französischen Thierärzten als akuter Rog, von andern und namentlich

deutschen als ein bössartiges Catarrhalsieber angesehen wurde; auch eine dritte Möglichkeit der Verwechslung wollen wir noch zugeben, nämlich die mit der Brustseuche (Rothlauf der Athmungsschleimhäute).

1. Unterscheidung vom Roze.

Anmerkung. Die Eintheilung in akuten und chronischen Roß beruht hauptsächlich auf der Selbstentwicklung aus der Drüse als chronischer Roß, dann auf Ansteckung — als akuter Roß, weil bei letzter'm die Geschwürbildung auf der Nasenschleimhaut rascher auftritt. —

Der Eintritt des Roßes ist allmählig und der Verlauf höchst chronisch, wogegen der T. petechialis überraschend eintritt und sehr akut verläuft.

Beim Typhus erzeugen sich sofort Petechien, beim Roze langsamer — Chancres.

Der Typhus ist mit Nervenaffektion begleitet, nicht so der Roß.

Der Typhus ist fieberhaft, der Roß nicht.

Der Typhus ist allgemeiner und hat seine Quelle in der Pfortader, der Roß in dem Saugadersystem.

Der Typhus tödtet schnell, der Roß dauert Jahre.

Die Sektion zeigt im Typhus sehr ausgebreitete Verwüstungen; im Roze beschränken sie sich auf die Nasenhöhlen, die Lungen und Saugaderdrüsen.

2. Unterscheidung vom Catarrh.

Während im Typhus petechialis Granthembildung und keine besondern Stadien wahrnehmbar sind, dagegen Nervenaffektion, so bleibt im Catarrh Geschwür-

bildung aus; dann hat der Catarrh seine regelmäßigen Stadien und keine Nervenaffektion, der Catarrh ist leicht heilbar, nicht so der Typhus.

3. Unterscheidung von der Brustseuche.

Während in der Brustseuche der Erysipelas der Haut und der Schleimhäute überwiegt, dann keine Granthembildung zugegen ist, mehr Gutartigkeit und Heilbarkeit, so ist beim Ptechialtyphus dieses Alles nicht der Fall, obschon der Nasenausfluß und die Affektion der Bindehaut viel Aehnliches haben. Doch die Ptechienbildung ist unterscheidend genug.

Anmerkung. Es ist hier freilich eine Frage, nämlich die, ob man über den Begriff von Brustseuche im Reinen sei, denn offenbar sind schon mehrfache Verwechslungen entstanden und auch ist es nur zu gewiß, daß die Brustseuche nach Zügen, die sie machte, und nach Lokalitäten große Modifikationen erlitt, sowohl als auch durch Combinationen. Wir halten die Brustseuche für eine febris erysipelatosä, welche nach unsern Beobachtungen einzig beim Pferde vorkommt und hauptsächlich sich über die Schleimhäute der Athmungswerkzeuge und zum Theil über die allgemeine Decke ausbreitet, und finden das Bild unserer reichen Beobachtungen über diese Krankheit wieder in den Monographien von Hr. Prof. Auker vom Jahr 1825, wo pag. 8 hauptsächlich die Rede von der catarrhalisch-lymphatischen Form ist.

Combinationen.

Es hat in diesem Bezuge mit den Typhen eine eigene Bewandniß, zwar ist es bei andern Epizootieen das Nämliche, d. h., sie drücken jeder dazwischenlaufen-

den Krankheit den Stempel auf, wodurch diese bald ganz unkenntlich wird.

Im höchsten Grade ist dieses jedoch bei den Typhen der Fall, und wir wußten namentlich außer der Tuberkulosis auch nicht eine einzige Krankheitscombination mit Typhus petechialis nachzuweisen. Daß Reizzustände der Athmungswerkzeuge, wohl gar beginnende Entzündungen derselben, dann beginnende Catarrhe vorherrschende Anlagen zu dem Typhus petechialis tragen, ist unzweifelhaft, allein vor ihrer deutlichen Entwicklung werden sie vom Typhus ganz verschlungen.

Prognosis.

Die Heilbarkeit des Typhus petechialis gehört zu den Seltenheiten, das Verhältniß der Sterbenden zu den Genesenden ist so überwiegend, daß es sich fast verhält, wie 1000: 10. — Die wenigen Fälle von Heilung trafen auf das Ende der Seuche, wo es gleichsam den Anschein hat, als habe die Seuche durch ihre Extension an Intension verloren. Auch gehören offenbar die geheilten Fälle zu den geringern Graden der Krankheit und gleich in den ersten Momenten des Krankseins betretenen.

Therapie.

Was sollen wir hier sagen? Wir mögen hinblicken, wo wir wollen, so haben wir nirgends einen Halt- punkt in der Erfahrung für die Therapie dieser Krankheit; was in einem Falle einige heilende Bewegungen in der krankhaften Natur hervorzubringen schien, ging an andern Fällen spurlos vorüber.

Auch der Umstand, daß bei Invasionen von epizootischen Krankheiten, zumal so ungekannten in Form und Wesen wie früher bei den Typhen, wo der Thierarzt eher befangen als unbefangen ist, meistens im Finstern tappt, und wenn nicht Zufälligkeiten auf eine Methode führen, die fördert, erst später, wenn die Seuche vorbei ist, Zeit hat seine Reflektionen zu machen, dieser Umstand ist auch begreiflich und einigermaßen entschuldigend.

Die Behandlungen richteten sich meistens durch die bekannten Mittel gegen einen entzündlich = catarrhalischen Zustand, oder gar gegen Rogz, welche Behandlungen auch uns ihre Fruchtlosigkeit seiner Zeit bewiesen hatten (1834).

Die wenigen seither uns vorgekommenen (3) Fälle hatten eine weit geringere Bösartigkeit und auch einen weit geringern Grad, daher die Behandlung dieser Fälle, davon 2 einen erwünschten Ausgang fanden, - nicht maßgebend sein kann und höchstens nur einen Fingerzeig enthalten.

Diesen Fingerzeig benutzend, wollen wir hier nun versuchen, einen grundsätzlichen Heilplan zu entwerfen, der das Wesen und nicht die Form berücksichtigen und auch in Zukunft unserer versuchsweisen In'swerksetzung vorbehalten sein soll.

1. Berücksichtigung der Ursachen.

Obgleich anzunehmen ist, daß eine feuchtere und kühlere Atmosphäre diese Form erzeugt habe, so möchten wir doch nichts desto weniger, namentlich in

Betrachtung von Profluvien bei den Kranken, eher einen temperirten als zu warmen Stall zum Aufenthaltsorte wählen und die Temperatur auf 15° R. feststellen, daneben soll Trockenheit, Reinlichkeit, gebrochenes Licht mit der Temperatur im Einklange stehen, sowie Ruhe ohnehin auch erforderlich ist.

So lange die Patienten noch etwas genießen mögen, dürfen genäßte Kleie und saftiges Grünfutter in kleinen Portionen verabreicht werden; sollte die Kur gelingen, so folgt später kräftigeres und gehaltreicheres Futter, — Heu, Hafer. Als Getränk gesäuertes, gebrochenes Wasser.

Mit Striegeln, Bürsten *ic.* verschont man die Kranken, dergleichen mit schweren Decken, Gurten u. dgl., schützt sie allfällig mit leinenen Decken gegen Fliegen.

2. Berücksichtigung der besondern Heilanzeigen.

Wenn wir zuerst auf das Centrum der Krankheit, die Region des Pfortadersystem's und der Leber hinblicken und den dortigen Zustand gehörig auffassen, so wird sich unstreitig darin die Anzeige finden, a) die Pfortader frei zu machen, b) der Neigung des Pfortaderblutes (in seiner Stase) zur Zersetzung zuvorzukommen, zu verhüten, daß der Zunder der Gährung von dem Pfortadersystem nicht in das venöse System übertrete.

Um Freiheit in die überladene Pfortader zu bringen, ist wohl vor Allem aus nöthig, a) was einen kongestionellen Zustand zu der Leber haben kann, nämlich

Ableitung auf den Darmkanal und Freimachung der Darmsekretionen und b) hierzu solche Mittel, namentlich Salze zu verwenden, welche säuerlicher Natur sind, indem diese theils durch Abgabe von Sauerstoff, theils durch die die Blutcoäston erhaltende Wirkung der Säuerlichkeiten in ähnlichen Fällen ihre Wohlthat schon beurfundet haben. — Tartarus crudus, lieber Cremor tartari. Die Anwendung dieses letztern Mittels hat in unsere Therapie anderweitiger Typhenformen eine bedeutende Abänderung gebracht.

Anderweitige Erscheinungen, zumal nervöser Art können durch belebende oder beruhigende Nervina, Camphor vel Extr. hyoscyami berücksichtigt werden; der Zustand des Darmkanals selbst entweder mit Schleim oder mit reinen Bitterkeiten, kurz diese Umstände berücksichtigend, ist eine freie, bethätigte Darmverrichtung herzustellen (ohne Durchfall), damit auch die Neigung zur Kopfkongestion verschwinde.

Deutlicher hervortretende hepatische Erscheinungen würde man nach gewöhnlicher Art besorgen, namentlich die Ableitung auf die Haut nicht außer Acht lassen. (Vesicatorium).

Ein zweiter Theil der Spezialkur müßte sodann die Petechienbildung bedenken, die vielleicht und selbst wahrscheinlich durch die erste Behandlung sehr modificirt werden dürfte.

Sehr möglich ist es, daß sowohl das membranöse als dermatische Petechialeranthem durch einen überwiegenden Reiz — ein Haarfeil an der Brust — angezogen oder hingehalten werden könnte, wo es aber

aufgetreten, möchten doch Essig- oder Chlordämpfe, bis die Eruption ihre Höhe hat, am Orte sein; namentlich haben wir bereits schon bemerkt, daß sich Petechialflecke dadurch zertheilten, ohne die Höhe des Exanthemes zu erreichen. Wo endlich das Exanthem seine Höhe erreicht hat neben einem beruhigtern Allgemeinbefinden, möchten wir den Abtrocknungsprozeß mit einzuathmendem Kohlenstaub befördern, das Hauteranthem aber mit Schwefelleberauflösung der Abtrocknung entgegenführen.

So weit mag nun unser zukünftig für uns zu beachtende Heilplan im Typhus petechialis gehen, weiter wollen wir uns auf dem Papier nicht versuchen und mehr wird uns einstweilen auch Niemand zumuthen.

2. Der Darmtyphus (Typhus entericus).

Begriff.

Mit dieser Benennung wollen wir eine Typhenform des Pferdes bezeichnen, wo die Verheerungen sich über die Hinterleibsorgane und hauptsächlich über die Schleimhaut der Dauwerkzeuge sich verbreiten.

Synonyme Benennungen sind: Typhus abdominalis, T. ganglionaris, Lebertyphus.

Vorkommen.

Es hat allen Anschein, wenn übrigens keine Verwechslung mit dem gastrisch-erysipelatösen Fieber stattfand, daß diese Form eine der ältesten und bekanntesten Typhenformen des Pferdes ist. Im Sommer des 1834er Jahres kam sie ausgebreitet vor, wir finden

28 in Behandlung gestandene Stücke in unser'm Tagebuch verzeichnet.

Im Allgemeinen ist über diese Form besser zu sprechen, als über die vorangegangene, denn ihr Eintreten und Auftreten ist allmählicher, bescheidener, ihr Verlauf im Ganzen gemäßigter, aber auch Alles verschlingend. In Bezug auf interkurrirende Krankheiten, ist sie, wie der Typhus es immer ist.

Diese Form schien uns übrigens verschiedener Modifikationen am fähigsten, die wir in der Symptomatologie spezieller berücksichtigen wollen.

Bei großer Hitze gedieh sie besser, als man es gerne sah; bei wechselnder Witterung waren die Fälle weit seltener und kehrten mit dem guten Wetter wieder zurück. Der Herbst machte ihr ein Ende und im folgenden Sommer kamen nur einige sehr zerstreute Fälle vor, die, wenn uns nicht Alles täuscht, seither und bis auf den heutigen Tag uns nie mit Besuchen verschont haben; ja es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, daß diese Form hin und wieder und namentlich in unser'm Wirkungskreise stationär geworden ist. Es ist ebenso wenig übertrieben, wenn wir sagen, daß jetzt mehrere Sommer und auch im so eben abgewichenen Frühjahr unter 10 abgestandenen Pferden im hiesigen Wasenkreise nicht 5 Stücke frei vom Typhus getödtet, oder doch neben andern Krankheiten von demselben schwer bezeichnet worden seien. Bei der polizeilichen Ansicht der Sache werden wir uns noch dieses Umstandes erinnern.

Wir wollen versuchen, auch das Bild dieser Krank-

heitsform in gehöriger Schärfe zu zeichnen, sowie die beobachteten Nuancirungen in demselben.

Symptomatologie.

Mit dem Eintritte der Krankheit nimmt der Beobachter nur ganz allgemeine Symptome wahr, wie sie in jeder andern Krankheit vorkommen: — Niedergeschlagenheit.

Zu den treffendern Erscheinungen dagegen gehören mit Abgeschlagenheit verbundene Stumpfheit.

Die Stumpfheit tritt oft schon am ersten, oft erst am zweiten Tage nach der Abgeschlagenheit ein, sie ist oft sehr groß, namentlich wenn nicht Schmerz im Hinterleibe die Patienten etwas aufrüttelt. Zudem verbindet sich mit dieser Stumpfheit auch schläfriges Gesicht.

Die nun aufgehobene Freßlust ist ein auftretendes Symptom, welches allerdings Fingerzeige enthält, nach welchen eine ergiebige Untersuchung erfolgen und sich insbesondere über die Dauwerkzeuge verbreiten soll.

Das Maul ist röthlich mit gelbem Anfluge, die Zunge schmutzig belegt, die Temperatur des Maales vermehrt und dasselbe trocken, daher sich's auch erklären läßt, warum die Patienten gerne dann und wann trinken.

Der aufgeschürzte (nur selten sich blähende) Bauch läßt eine Reizung in seinen Eingeweiden vermuthen und in der That beweist nicht nur das seltene Darmgetön (Knurren) einen solchen Zustand im Darm-system, sondern auch der sehr unterdrückte Abgang von

Koth. Wird einmal etwas abgesetzt, so bestätigen die Härte und Trockenheit der einzelnen blaffen Kothballen das Vermuthete. Mehrmals sahen wir von den Patienten Stränge 1 bis $1\frac{1}{2}$ Fuß lang und 1—2 Zoll im Durchmesser durch den After abgehen; diese Stränge waren elastisch, wohl zusammenhängend, graulich weiß und schienen aus Darmschleim zu bestehen. Wenigstens konnten wir uns keinen andern Begriff davon machen.

In sehr vereinzeltten Fällen ging der Koth etwas weicher ab, wo aber, noch seltener, Durchfall mit dem Anfange der Krankheit eintrat, fielen die Kranken in 48 Stunden schon durch.

Bei zwei Pferden, die wir auf 4 Wochen hinaus zogen und wo, wie die Sektion es nachwies, eine Combination mit Tuberculosis sich einfand, trat kolliquativer Durchfall ein.

Die aus den Erscheinungen sich ergebende gastrisch-hepatisch-nervöse Affektion hatte allerdings auch noch einige symptomatische Erscheinungen in ihrem Gefolge, so im Anfange ungewöhnliche Wärme des Vorkopfes, gelbe Färbung der Bindehaut, auch etwas bethätigtes Athmen.

Doch auch Reaktionen, obgleich ohne Erfolg, ließen sich an dem fieberhaften Pulse wahrnehmen. Vor Allem ist der Unregelmäßigkeit des Pulses zu erwähnen, nach diesem dann seiner Schnelligkeit (50—70 Schläge in der Minute), bei verschiedener Deutlichkeit des Herzschlages, der oft gegen alle Regel zugehen oder ganz unfühlbar war.

Die allgemeine Decke ist von Anfang in ihrer Temperatur indifferent, doch bald steigt dieselbe, ohne daß die Hautausdünstung sich mehrt. Wenn entweder in einzelnen Fällen wegen Unruhe der Patienten, oder eigenen Wirkungen des Krankheitsprozesses die Haut stellenweise feuchter wird, so sind diese Stellen flebricht, übelriechend und das Fliegengeschmeiß setzt sich in Masse auf diese dem Tode verfallenen Stücke.

Vor Anfang der Krankheit, oft bis 48 Stunden geht kein Tropfen Urin ab, dann aber ein nicht zu endender Strahl eines röthlichen Urines, mit deutlichem und lebhaftem Laugengeruche, wohl mit etwas Schaum aber keinem Bodensatz versehen, doch durchscheinend. Auf einige Dosen verdünnter Salzsäure ändert sich der Urin schon, wird helle, allein noch ohne Bodensatz und Schleim.

Dauer, Verlauf und Ausgang.

Die Dauer des Abdominaltyphus ist sehr verschieden; bald kann der Tod in einigen Stunden erfolgen, oft in 4—5 Tagen, oft lassen sich die Patienten auf 3—4 Wochen hinausziehen und gehen dennoch ein. Die günstigsten Ausgänge fielen zwischen den 5ten und 15ten Tag. Vorher tritt nicht leicht Besserung ein und auf das, was nachher kommt, darf man keine große Rechnung machen.

Die ungünstigen, prognostischen Symptome sind ohne deutliche Besserung eine Art von Hinsiechen, oder ein Steigen der Zufälle bis zu den sogenannten flebrigen Schweißem; sind diese einmal da, so bleibt keine be-

gründete Hoffnung mehr für Genesung. Treten nach dem 4ten Tage statt mäßig weichem Kothabgange stinkende, lehmartige Durchfälle ein, so ist bestimmt der Tod zu erwarten.

Zu den günstigen prognostischen Kennzeichen gehören lebhaftere Darmbewegungen, später in 2—3 Tagen weicher, saftiger Kothabgang, Reaktion auf Einreibungen, Aufheiterung im Kopfe, einige Freßlust und Durst, weiche Haut mit gleichmäßig vertheilter Wärme und dem normalen Zustande sich nähernder Kreislauf.

Krankheitsübergänge beobachteten wir nie, nur Genesung oder Tod.

Modifikationen.

Bei einigen Patienten nahmen wir zuweilen eine ganz ungewöhnliche Stumpfheit wahr, die nichts Besonderes an Folgen hatte.

Bei andern kamen Niederliegen und auch unzweifelhafte Koliksymptome im Verlaufe vor, doch nicht anhaltend, aber zurückkehrend und bei schon weicher abgehendem Koth. Bei zweien, unter diesen Zufällen eingegangenen Pferden kamen große Darmgeschwüre vor. Wahrscheinlich hatte die Einwirkung scharfer salziger Mittel diese Zufälle zur Folge.

Das Fieber ist übrigens bald mehr synochel, bald mehr torpid.

Combinationen.

In mehreren Fällen und zwar in den Vorläufern konnte man allerdings eine Spur von dazwischenlaufen-

den Zuständen annehmen, so Durchfälle, einfache Gastrizismen, dann Koliken. Die erstern und letztern kamen am schlechtesten weg, und namentlich haben wir Koliken gesehen, wo gut genährte Stücke unter auffallenden Erscheinungen in 4 Stunden eingingen. Wir nennen diese Erscheinungen, die sich auf die Cadaver bezogen, deswegen auffallend, weil sich an den Gedärmen und zwar am Dickdarme mehrere Stellen vorfanden, (nicht übertrieben gesagt), pechschwarz und von bedeutendem Umfange; brandähnliche Zerstörung der Darmhäute, wie wir solche selbst bei den heftigsten in Brand ausgegangenen Darmentzündungen nicht in solchem Grade wahrgenommen hatten.

Hier zeigt sich wieder die Macht des Typhus in auffallendem Grade; seine unbeschränkte Sucht, alle andern Krankheiten in sich aufgehen zu lassen, um mit noch mehr Wuth die Vernichtung des Organismus zu betreiben. Die Verschlingung von dazwischenlaufenden Krankheiten geschieht auch so rasch, daß an keine deutliche Entwicklung einer derselben zu denken ist.

Diagnose.

Es ist beinahe überflüssig hier in besondere diagnostische Erörterungen einzutreten, denn das Bild der Krankheit, welches sich der Leser aus der Symptomatologie schaffen mag, ist von einfachen Gastrizismen, dann von Leber- und Darmentzündungen durch die nervöse Seite der Krankheit, durch die Unregelmäßigkeit im Kreislaufe, durch den Zustand des Blutes beim Versuchsbaderlasse, durch die übrigen Erscheinungen so ver-

schieden bezeichnet, daß, namentlich wenn sich mehrere ähnliche Fälle zur nämlichen Zeit einstellen, eine Verwechslung unmöglich ist. Nur in einem Falle wäre sie eher möglich, nämlich eine Verwechslung mit dem sogenannten Nervenfieber von 1824 und 1825, diesem Darm- und Hauterysipel mit ungewöhnlichem Stupor.

Die in dem sogenannten Nervenfieber unverkennbaren Hautsymptome des Erysipelas, nämlich die erysipelatös-ödematösen Anschwellungen des untern Theils des Kopfes und der Gliedmassen, die gastrisch-gallichte Complication nach Anker, der rasche und meistens glückliche Verlauf und überhaupt das weniger Widersprechende im Kreislaufe zu andern Verrichtungen sind auch für eine richtige Diagnose maßgebend genug.

Prognosis.

In dieser Form läßt sich keineswegs die Prognosis günstig stellen, indem nämlich, auch nach genommener Umsicht bei andern Collegialitäten, die Zahl der Geheilten zu den Eingegangenen sich wie 1: 5 verhielt. Tuberkulöse, dann anderweitige auf die Hinterleibsorgane sich beziehende Combinationen hatten stets den Tod zur Folge. Höherer Grad der Krankheit und ungünstige Verhältnisse des Aufenthaltes lassen ungünstig prognostiren, mit einem Worte ist die Prognosis stets auf Gefahr zu stellen. —

Vor zwei Jahren kamen uns einige Fälle vor, die bei einer anderweitigen Behandlungsart, wenn nicht sonst etwas dabei einwirkte, eine günstigere Prognosis aussprechen ließen, indem sich dannzumal das Verhältniß

der Genesenden zu den Umgestandenen, wie 2: 4 verhielt. Diese Abänderung in der Behandlung werden wir sogleich auch mittheilen.

Therapie.

1. Berücksichtigung der Ursachen.

Eine Causalanzeige kann sich wohl weniger gegen den Genius epizooticus als gegen die neuesten einwirkenden Ursachen richten, daher bei der Besorgung solcher Kranken zuerst darauf gesehen wurde, denselben Schutz gegen große Hitze zu gewähren, durch Verlegung in einen kühlen Aufenthaltsort, was, sowie das Zubringen der Nächte im Freien oft auf die stupiden Patienten, auffallend erheiternd wirkte.

Rücksichtlich des diätetischen Verhaltens wurde bis zu der ersten Kothentleerung nichts gefüttert, dann Kleie, später Gras und erst bei der bestimmten Convalescenz Heu. Früher ließen wir kaltes Wasser vorhalten, doch mit mehr Nutzen mit Lindenbast- oder Gerstenschleim gemildertes Wasser mit Zusatz von Zitronensaft zur angenehmen und so wohlthätig wirkenden Säuerung des Getränkes.

2. Berücksichtigung der besondern Heilanzeigen.

Sowie wir zur speziellen Behandlung im Jahre 1834, ohne Rücksicht, je nach Launen, Natrum sulph., Tartarus stibiatus, Kali sulph. gaben, um die Darmsekretionen und Entleerungen anzustreben, und zwar mit,

man kann wohl sagen, gewöhnlichem Erfolge, aber nicht mit dem in Typhen gewünschten, so haben wir durch neuere Erfahrungen belehrt zwar immer noch die Anzeige vor Augen, die Darmsekretionen frei zu machen und die Entleerungen zu fördern; jedoch mehr mit den Rücksichten auf das Pfortadersystem und den typhösen (spezifischen) Zustand selber, wie wir solche in der Therapie der vorhergehenden Form bezeichnet haben, nämlich in Verabreichung von Cremor tartari — jedoch in Schleim und zwar selbst in total emulsiver Form, nach Umständen mit Extr. hyosciami; Latwergen taugen nichts, sie berühren zu wenig Darmfläche.

Mit milden, schleimigen, wohl auch einfachen Seifenlystiren unterstützt man die innerlichen Mittel und erwartet Entleerung, womit sich auch größere Freiheit des Sensorii einstellt.

Bevor man in ganz stupiden Fällen diese Mittel verabreicht, sind allgemeine Begießungen und selbst in Form von Sturzbädern über den ganzen Körper, Kopf ausgenommen, von trefflicher Wirkung, nur muß auch die nicht ungestüme, sondern sanfte Abtrocknung, nicht mit Strohwischen, sondern mit Leinen, nicht vergessen werden. Auf den Kopf aber macht man nachher kühlende, deprimirende Umschläge. Die Douche kann nach 8, 10, 12 Stunden, nach Ermessen, neben den innern Mitteln wiederholt werden.

Nach der Douche ist es nicht nöthig die Patienten herumzujagen, besser ist, die Kühle der Douche inhärire dem Körper und die Reaktion erfolge nur allmählig.

Wo aber mehr kolikähnliche Zufälle vorhanden sind, da kann von Douches nicht wohl die Rede sein.

Wenn die erste therapeutische Maßnahme mit Erfolg verflungen hat und der rein hepatische Zustand nun lauter und über den Stupor hervortritt, so faßt man diesen wohl ins Auge und gibt ohne stürmisch zu verfahren die Gallenabsonderung befördernde Mittel. Im neuern Verfahren fand ich die Wirkung einer Verbindung von Cremor tartari mit Extr. chelidonii und Rad. rhei, dieses hingegen in Latwergenform mit beliebigem Vehiculum, sehr befriedigend. Natürlich auf den ersten Hieb fällt kein Baum, man setzt fort.

Die übrigen Ableitungen von der Leber auf die Haut dürfen nicht vergessen werden.

Tritt die Entwicklung von Blutpigment durch Urinfärbung oder Rothfärbung anderer Ausflüsse auf, dann müssen Mineralsäuren, namentlich die verdünnte Salzsäure in einem kampherhaltigen Schleimtrank in Vordergrund gestellt werden, bis die Zufälle gedämpft sind.

Gewahrt man, nachdem schon die Darmsekretionen frei geworden und überhaupt die Patienten sich etwas wenigens gebessert, daß nach salzigen Mitteln unterbrochen leichtere Kolikzufälle die Kranken beunruhigen, dann möchten wir, Beobachtungen zufolge, uns nicht gerne vor dem Gedanken abbringen lassen, daß Darmgeschwüre oder Corrosionen vorhanden seien, daher ein mildes und doch zur Vernarbung führendes Verfahren beobachtet werden muß. Auch früher wollte uns die Sonne nicht recht leuchten, aber dann der Gedanke: ob nicht dieselbe Verbindung, die bei Verlegun-

gen, Verschwärungen und Granthemen der Maulschleimhaut sich so heilsam zeigt, die Verbindung des Honigs mit Essig oder mit Salzsäure in Wasser oder in Schleim, auch da nicht hülfereich sein könnte? — dieser Gedanke verwirklicht, hatte seinen Erfolg und paßte ganz dem typhösen allgemeinen Zustande an. 10 bis 12 Tage, täglich 3 bis 4 Eingüsse von der genannten mäßig säuerlichen Composition haben in zwei Fällen der Art ihre vermuthete Wirkung angenehm bewiesen.

Wir kommen hier noch einer Frage entgegen, nämlich der, „wie es mit dem Aderlaß zu halten sei?“

Es dünkt einem zwar, die Antwort sollte auf der flachen Hand liegen. So gut wie jedes Fieber seine synochale, erethische oder torpide Seite hat, so auch das typhöse Fieber, und eben so wohl als in dem synochalen Fieber oder Körperzustande in Hirn- und Lungenentzündungen u. d. Aderlaß dringend angezeigt ist, ebenso dringend ist er in solchen bei Typhen angezeigt, ohne daß deswegen der unglückliche Gedanke oder die Ansicht in Vordergrund gestellt werden muß, die Typhen bestehen zu Anfang aus einer Entzündung, denn diese einseitige und schwache Ansicht führt von der wahren Bahn ab und wir wiederholen noch ein und zwar für alle Mal, Phlogosis ist Phlogosis, Typhus ist Typhus und für beide, sowie noch für viele giebt es nur ein Fieber, aber dasselbe kann entweder eine synochale (die gewöhnlichste), eine erethische oder eine torpide Richtung haben. — Der Aderlaß

im Anfange der Typhen vollblütiger Pferde ist und bleibt nützlich, ja unerläßlich.

Außerdem sind auch die Naturen sowohl von Anbeginn der Krankheit an als auch durch dieselbe hindurch heruntergekommen, dem Torpor genähert und daher je nach Umständen, mit Tonicis nervinis — Arnika, Angelika — oder Tonicis propriis — China — zu bedenken.

Hat man die Patienten so weit gebracht, daß sie, ohne zu ermatten, kleine Spaziergänge machen können, so erholen sie sich entweder freigelassen oder geführt in der Morgen- und Abendkühlung neben reinem Wasser und gutem, nicht allzureichlichem Futter noch ziemlich bald.

(Schluß folgt.)

V.

Künstliche Oeffnung des Muttermundes.

Erster Fall.

Am Abend des 13. März 1852 wurde Thierarzt J. Kunz in Rümlang (Kt. Zürich) zu einer Kuh gerufen, welche den ganzen Tag heftige Geburtsschmerzen hatte, ohne daß eine Wasserblase oder ein Junges zum Vorschein kam. Ich fand, — sagt Kunz, — die Kuh sehr unruhig auf der Streue liegend, umgeben von einer Menge Menschen männlichen und