

# Radialislähmung bei einem Rinde

Autor(en): **Bach, E.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **64 (1922)**

Heft 4

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-591249>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

eine diffuse, ödematöse undefinierbare Schwellung auftritt, so ist sogar in Abwesenheit von Fieber und Veränderungen im Kehlgang die Vermutung der Druse berechtigt. Von diesem Moment an tut eine energische, aktive Behandlung not.

### **Radialislähmung bei einem Rinde.**

Von E. Bach, Kreistierarzt, Thun.

Seit meiner Publikation im „Schweizer Archiv“ habe ich noch zwei Fälle dieser Krankheit beobachtet. Der letzte Fall war interessant, weil die Ursache genau bekannt und der Fall rasch abheilte:

In der Nacht vom 14./15. Januar 1922 wurde ein ca. 1 Jahr altes Rind von einem andern in die Krippe geworfen. Am Morgen lag es dort hilflos in tiefen Schweiss gebadet, das linke Buggelenk auf dem Krippenladen. Auf dem Buggelenk zeigten sich Hautschürfungen und die Erscheinungen einer totalen Radialislähmung, die aber in vier Tagen abheilte.

### **Literarische Rundschau.**

**O. Heneberk.** Die Fleischhygiene im Lichte der Gegenwart. Ebenda, Heft 3, 1921.

Den Ausgangspunkt für diese Ausführungen bildet ein österreichischer Ministerialerlass, welcher im Hinblick auf die Not der Zeit die Befolgung des alten Grundsatzes der Fleischhygiene, bei sorgfältiger Beobachtung der hygienischen Forderung, das Volkvermögen vor ungerechtfertigten Schädigungen zu bewahren, den technischen Organen der Fleischschau dringend ans Herz legt. Obwohl für uns der zweite Teil dieser Mahnung nicht mehr in dem Masse zutrifft, wie während der Kriegsjahre, so bietet doch dieser Erlass in seinen Ausführungen durch den Autor für den in diesem Zweige der tierärztlichen Praxis tätigen Spezialisten viel Interessantes. Naturgemäss wird den beiden Hauptthemen der modernen Fleischhygiene, dem Kapitel der Fleischvergiftungen und der Frage der Beurteilung tuberkulöser Veränderungen der weiteste Platz eingeräumt. Hier wie dort empfindet der Praktiker den Mangel an in bestimmte Formen gekleideten Weisungen für die Beurteilung von Fleisch, das Veränderungen an sich trägt, die nach den überkommenen Ansichten auf eine septikämische Erkrankung