

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 78 (1936)

Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 11.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CANCEREX

Die Hufkrebspaste gegen Hufkrebs, Strahlfäule und Panaritium. Das Vehikel setzt die Säuren, wie salpetrige Säure, schweflige und Essigsäure, nur schubweise in Freiheit. Die Pastenmasse übt auf das gesunde Gewebe eine vorzügliche kurative Wirkung aus.

CEJODYL. KAKODYLIC.

Cejodyl. kakodylic. ist unter den neuern Cer-Jod-Verbindungen die geeignetste für die Behandlung der Aktinomykose bei Rindern und Schweinen. Das Präparat eignet sich auch vorzüglich zur Behandlung der Sklerostomiasis.

354

W. Brändli & Co., Bern, Vertreter der „Atarost“ Rostock.

Lysoform

283

Puissant antiseptique, microbicide, désinfectant, désodorisant. Action égale aux phénols et dérivés, non toxique, non caustique, d'odeur agréable, se mélangeant facilement à l'eau et à l'alcool, n'attaque pas les instruments.

Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques, etc.

Pour la médecine vétérinaire, nous recommandons le **Lysoforme brut**, qui convient également pour la désinfection des écuries, abattoirs, etc.



Eviter les contrefaçons souvent dangereuses; exiger notre marque déposée.

Dans toutes les pharmacies.

Gros:

Société Suisse d'Antiseptie Lysoform, Lausanne.

Tuberkulin Typ. bovinus

zur Subcutanprobe
zur Intracutanprobe und
zur Ophthalmoprobe.

Metritisvakzine

bei Retentio placentarum
bei chronischer Endometritis.

352

In Packungen zu 3 × 10 ccm.
und Flaschen zu 100 ccm. mit
durchstechbaren Gummistopfen.

Veterinaria A.-G. Zürich

Verzeichnis der laufenden Literatur.

Münchener Tierärztliche Wochenschrift. 1936. Nr. 24. — *Jakob*: Vorschläge zur richtigen Bezeichnung fehlerhafter und irreführender Ausdrücke. — *Ernst*: Über Oligodynamie und das Katadyn-Verfahren.

Nr. 25. — *Saxer*: Über Banginfektion als Ursache von Wirbelnekrose beim Schwein. — *Kitt*: Mannskopfgroße mit Mageninhalt gefüllte Lungenhöhle vom Rind.

Nr. 26.— *Jakob*: Fang von wildernden Katzen und Töten von Katzen durch Ertränken. — *Scherer*: Über das Verhalten von Valvanol zu Geweben. — *Nützel*: Die Brauchbarkeit der Tussipektpräparate als Expektorantien bei Hund und Katze.

Nr. 27. — *Fricker*: Können Staphylokokken zur Bildung von Aktinomyzes-Drusen führen?

Recueil de Médecine Vétérinaire. 1936. Nr. 2. — *Henry et Carpentier*: Crises épileptiformes d'origine ecto-parasitaire. — *Forestier*: Obstruction de l'oesophage chez le cheval par des betteraves fourragères. — *Veau et Le Hyaric*: Le bec-de-lièvre chez les animaux. — *Bourdieu*: Les Trichomas: leur rôle dans l'avortement précoce, le pyomètre et la stérilité de la vache. — *Isnard*: Troubles de l'alimentation des volailles.


Nr. 3. — *Valade et Quarante*: Cancer de la conjonctive du bœuf. — *Taylor et Jorgensen*: Etude des divers modes d'infection expérimentale des ovins par *Br. Melitensis*. — *Cordier, Menager et Delorme*: De la valeur des injections intraveineuses de carbone animal et d'alcool en pathologie vétérinaire. — *Pineteau et Bourbon*: Transmission de la fièvre aphteuse par un bovin guéri depuis plusieurs mois.

Nr. 4. — *Lesbourries et Berthelon*: Paratyphoses des Palmipèdes et des Gallinacés. — *Moutaux*: Hémorragie mortelle par rupture d'un anévrisme de l'artère carotide interne chez le Cheval. — *Moine*: Tétanie d'herbage de fièvre vitulaire. — *Cazaban et Jean Isnard*: Contribution à l'étude des tourteaux de lin cyanogénétiques. — *Dauvois*: Un cas de gestation extra-utérine chez la Vache.

Nr. 5. — *Verge*: Les Spirochétoses aviaires. — *Houzé*: Nouvelle méthode de traitement de l'encastelure. — *Miquel*: Accidents des membres chez le hévrier de course. — *Chapron*: Ankyloses chez un Veau. — *Conte*: Traitement de la paraplégie enzootique des Agneaux. — *Chicon*: La responsabilité du vétérinaire inspecteur d'abattoir du fait du prépose.

Revue vétérinaire. 1936. Mai. — *Cuillé et Darraspen*: Contribution à l'étude clinique de la strongylose cardio-pulmonaire du chien. — *Montpellier, Bosselut et Jacquemire*: Sarcome lymphocytaire de l'intestin du chien. — *Bardoulat*: Le „Cancer de l'œil“ de la vache normande. — *Parlier*: Sur un cas de mal de mer après le débarquement.

Revue générale de médecine vétérinaire. 1936. Mai. — *Panisset*: Méningo-encéphalo-myélite du cheval. — *L. et H. Lamarre*: Dermoïde coruéen chez une vache.



Die in unserem Institute hergestellten Tuberkuline haben sich seit Jahren bewährt

Tuberkulin Typ. bov. concentr.



Für die Ophthalmoreaktion. Abfüllung in gebrauchsfertigen Pipetten (ges. gesch.) zu 0,5 und 0,3 ccm, und in Tropffläschchen

Tuberkulin-Salbe Typ. bov.



Für die Ophthalmoreaktion. In Tuben von 2 und 5 ccm Inhalt, mit Spachtel zum Einstreichen

Intradermo-Tuberkulin Typ. bov.



Für die intradermale Tuberkulinprobe. Einzeldosen zu 0,25 ccm in Schachteln zu 6 Röhren, und in Ampullen zu 2,0 ccm

Tuberkulin Typ. bov. dil.



Für die subkutane Tuberkulinprobe. Abfüllung in Ampullen zu 5 ccm. Grössere Abfüllung auf Wunsch.

357

**BAKTERIOLOGISCHES LABORATORIUM
UND SERUMINSTITUT**

DR. E. GRÄUB, BERN

Verzeichnis der laufenden Literatur.

Il nuovo Ercolani. 1936. Nr. 1. — *Riccio*: Della assicurazione del bestiame. Nr. 2. — *Piccinini*: Considerazioni e ricerche sul valore delle sanse delle re nell'alimentazione del bestiame. — *Raimondi*: Spazi latero-faringei e già retrofaringea in alcuni animali domestici.

Nr. 3. — *Monti*: Ricerche intorno alle tasche ed ai corpi ghiandolari pali in *Sus scrofa domesticus*. — *Godina*: Le arterie uterine della vacca ante e dopo la gravidanza.

Nr. 4. — *Ajello*: Su un caso atipico di necrobacillosi mandibolare in un piglio. — *Barile*: Contributo allo studio dei blastomi primitivi del pancreasulare nei bovini. — *Salina Borello*: Un caso di parasitismo multiplo da tietà di *Anomotaenia depressa* nel rondone (*cypselus apus*). — *Simonelli*: la filariosi in Umbria. — *Asdrubali*: Sulla ciste dell'uraco nei vitelli.

La Clinica Veterinaria. 1936. Nr. 4. — *Vianello*: Osservazioni e studi l'afta epizootica (Parte seconda). — *Giusti*: Rilievi sulla resa alla cellazione dei polli di razza livornese bianca. — *Gentili*: Nuovo orientamento della suinicoltura per la più rapida ed economica produzione della ne e dei grassi. — *Orlandi*: La röntgenterapia profonda nella linfosarcotosi del cane.

Der Beitritt zur Sterbekasse und dem Hilfsfonds ist für Mitglieder der G. S. T., die das 50. Altersjahr nicht überschritten haben bzw. nach dem Jahre 1906 in die Gesellschaft aufgenommen worden sind, obligatorisch.

Kollegen!

*Reservieren Sie den 22. u. 23. August 1936
für den Besuch unserer Jahresversammlung
in LUGANO*

Bakteriologisches Laboratorium und Seruminstitut

Dr. E. Gräub

BERN. Telephon: 23.750. Telegr.-Adr.: Gräublabor



Seit 10 Jahren in der Praxis bewährt

Metritis-Vaccine „Gräub“

Metritis-Vaccine

ist indiziert in Abortusbeständen, in denen die Krankheit in die latente Form übergegangen ist.

Metritis-Vaccine

357

hat sich bewährt zur Heilung der Aconception infolge chronischer Endometritis. Therapeutische Impfung und nachherige Deckkarenz von 3 Monaten.

Metritis-Vaccine

ist wirksam gegen Retentio placentarum und das Auftreten schwerer Metriten. Prophylaktische Anwendung 3—4 Wochen vor dem Abkalben. — Therapeutische Anwendung bei beginnender Metritis.

Abgabe in Schachteln von 3 × 10 ccm und in Flaschen mit Spaltverschluß von 100 ccm Inhalt.

I. Impfung: 10 ccm subkutan. II. Impfung: 20 ccm subkutan.