

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **133 (1991)**

Heft 2

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



rächtzyttig drüber rede!

Die DICTOL®-Trinkimpfung ist das **einzige richtige**, um die Lungenwurmseuche schon beim jungen Rind fast 100% sicher zu verhindern.




DICTOL®

- zuverlässig (fast 100% Schutz)
- weltweit über 20 Mio-fach in der Praxis erprobt
- auch in der Schweiz längstens bewährt und anerkannt
- 1 einzige Impfung (= 2 Dosen) genügt zur definitiven, lebenslangen Immunisierung

Kurz-Information DICTOL®

- Trink-Vakzine gegen die Lungenwurmseuche der Rinder
- Wässrige Suspension (lebende Larven des 3. Stadiums von *Dictyocaulus viviparus*, die durch eine genau dosierte X-Bestrahlung teilweise inaktiviert wurden)
- 2 Dosen im Abstand von 4 Wochen
- Mindest-Alter 2 Monate

Vollständige Dokumentation auf Wunsch



Vertrieb für die Schweiz:


biokema 

BIOKEMA AG · CH-1023 Crissier-Lausanne · Telefon ☎ 021/634 28 45

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

**RASCH HANDELN !
ENTSCHEIDEND HANDELN !**

- Eine wirksame Therapie **erster Wahl**, um die symptomatische **und** bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronizität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf **alle** für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli.
- Eine rasche und vollständige Diffusion der Wirkstoffe im Euter für eine Tiefenbehandlung.



Cloxa-Coli-Mastitisinjektor für Kühe
Suspension

4 x 10 ml

Cloxa-Coli-Injecteur pour vaches
(mastite) Suspension

4 x 10 ml

cloxa-coli



Abgabe nur durch
den Tierarzt
Delivre par
le vétérinaire

Hersteller /
Fabricant
VIRBAC
06516 Carros, FRANCE

Vertrieb für die Schweiz/
Distributeur pour la Suisse
Virbac AG
8702 Zollikon

Zusammensetzung
Cloxacillin (in Form von Cloxacillin-Natrium) 1.000 mg
Colistin (in Form von Colistin-Pentamer) 1.000 mg
E-Präparat Suspension 100 mg/ml
E-Präparat Suspension 100 mg/ml

Art der Anwendung
Die intramammäre Euterinjektion sollte bei Mastitisinjektion
sich auswirken, die Mastitisinjektion sollte die Mastitis
durch den Mastitisinjektor verabreicht werden.

Wartezeiten Milch
Während der Behandlung sind 5 Tage Mastitisinjektor
Schweine Mastitisinjektor
Rind Mastitisinjektor
Ch-B
ndbar Dis

Composition
Cloxacillin (sous forme de Cloxacillin-Na) 1.000 mg
Colistine (sous forme de Colistine-Pentamère) 1.000 mg
E-Präparat Suspension 100 mg/ml
E-Präparat Suspension 100 mg/ml

Mode d'emploi
Intramammäre Euterinjektion sollte bei Mastitisinjektion
sich auswirken, die Mastitisinjektion sollte die Mastitis
durch den Mastitisinjektor verabreicht werden.

Temps d'attente lait
Pendant le traitement, il faut attendre 5 jours avant
de donner du lait à consommer.

Virbac AG, 8702 Zollikon, Suisse
Virbac AG, 8702 Zollikon, Suisse



Mammites cliniques pendant la lactation

**FRAPPEZ VITE !
FRAPPEZ FORT !**

- Un traitement efficace de **1er choix** pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur **tous** les germes responsables de mammites, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

VIRBAC A.G., OBERWACHTSTRASSE 2, 8700 KÜSNACHT






Das neue
Prinzip

Baytril®

Die neue Kraft von Bayer. Gegen Bakterien und Mykoplasmen.

Baytril gehört zur chemischen Gruppe der Chinolone und wirkt bakterizid durch Hemmung der bakteriellen DNS-Gyrase im Zellkern. Es erreicht bei gleicher Dosierung oral wie parenteral identische Gewebs- und Serumspiegel und damit die gleiche Wirkung.

**Für jede
Situation
die tiergerechte
Formulierung –
Baytril.**



Generalvertretung Schweiz:


provet  **Vet.-med.
Center**

3421 Lyssach bei Burgdorf
Telefon 034 45 40 66
Telefax 034 45 20 93

DOMOSEDAN®

10 mg Detomidin/ml

Neu!



Zur dosisgesteuerten Sedation
und Analgesie bei Pferd und Rind.

- Mit einem Medikament
ausreichende Sedation
und Analgesie.
- Intravenöse oder intramuskuläre
Applikation.
- Keine Senkung des Blutdrucks,
dadurch erhöhte Arzneimittelsicherheit.

Handelsform: Durchstechflaschen zu 5 ml.

Hersteller:

Orion Corporation, Farnos, Turku, Finnland.

Vertrieb International:

SmithKline Beecham, Louvain-la-Neuve,
Belgien.

Vertrieb Schweiz: Dr. E. Gräub AG, Bern.

Telefon 031 / 34 22 11.

GRAEUB

Veterinärmedizin