

Zeitschrift: Schweizer entomologischer Anzeiger : Monatsschrift für allgemeine Insektenkunde, Schädlingsbekämpfung, Insektenhandel, Tausch, Literatur = Journal entomologique suisse

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 3 (1924)

Heft: 4

Artikel: Die Schmetterlinge des Tößstockschongebietes

Autor: Weber, Paul

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-762879>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Schmetterlinge des Töbstockschongebietes.

(2. Nachtrag.)

Im Jahre 1923 verbrachte ich die Zeit vom 4.—15. August im Schongebiet am Töbstock. Die Hauptaufmerksamkeit widmete ich diesmal dem Sammeln bei Nacht mit dem Lichtfangapparat. Der erste Faktor, der dabei in Betracht kommt, nämlich dunkle Nächte, wurde bei Festsetzung der Zeit berücksichtigt, der Neumond fiel auf den 12. August. Wenn die Ausbeute trotzdem nicht besonders groß war, so liegt der Grund hiefür einerseits in den sternhellen, kühlen, oft auch windigen Nächten, andererseits darin, daß die Herbststelen noch nicht flogen. Die in den früheren Berichten nicht erwähnten oder selteneren Spezies seien hiemit verzeichnet:

Lycaenidae.

Thecla ilicis Esp. 1 ♂ a. d. Vord. Töbsschlucht bei Punkt 963.

Drepanidae.

Drepana lacertinaria L. 1 ♂ unterhalb der Nagelfluhfelsen beim Bärloch, a. Licht.

Noctuidae.

Acronycta alni L. 1 ausgewachs. Raupe bei Pension Hint. Strahlegg.

Craniophora ligustri F. 1 ♂ bei Pens. Hint. Strahlegg a. Licht.

Agrotis strigula Scholen. 1 ♂ auf der Warte (1207 m) a. Licht.

„ *baja* F. 2 ♂ auf der Warte (1207 m) a. Licht.

„ *brunnea* F. Je 1 ♂ auf der Warte u. b. Bärloch a. Licht.

„ *depuncta* L. 1 ♂ bei Hint. Strahlegg a. Licht.

„ *decora* Hb. 1 ♂ beim Bärloch a. Licht.

Bombycia viminalis F. Ziemlich häufig bei Hint. Strahlegg u. b. Bärloch a. Licht.

Hadena scolopacina Esp. 1 ♂ b. Hint. Strahlegg a. Licht.

Hydroecia nictitans Bkh. 1 ♂ b. Bärloch a. Licht.

Leucania lithargyrea Esp. 1 ♂ b. Hint. Strahlegg a. Licht.

Caradrina taraxaci Hb. 1 ♂ südwestlich Tierhag (ca. 1100 m) a. Licht.

Calymnia trapezina L. 1 ♂ do.

Cosmia paleacea Esp. 1 ♂ do.

Cymatophoridae. *Thyatira batis* L. 8 Raupen — $\frac{3}{5}$ bis $\frac{4}{5}$ erw. — auf der Schindelbergerhöhe an Brombeere.

Geometridae.

Acidalia bisetata Huf. 1 ♂ am Südhang der Wartenhöhe (ca. 1150 m) a. Licht.

„ *aversata* L. 1 ♂ südwestl. Tierhag (ca. 1100 m) a. Licht.

Lygris reticulata S. V. 1 ♂ in der Vord. Töbsschlucht bei Punkt 963.

„ *prunata* L. 1 ♂ b. Hint. Strahlegg a. Licht.

Larentia cognata Sebaldt. 2 ♂ a. d. Warte (1207 m) a. Licht.

Tephroclystia sobrinata Hb. Häufig b. Hint. Strahlegg, a. Südhang der Wartenhöhe, auf d. Warte, b. Bärloch u. auf d. Schindelbergerhöhe a. Licht.

Crocallis elinguaris L. 1 ♀ auf der Warte (1207 m) a. Licht.

Arctiidae.

Lithosia complana L. 1 ♂ am Südhang der Wartenhöhe a. Licht.

Arctia caja L. 1 ♂ beim Bärloch a. Licht.

Pyralidae.

Crambus tristella-paleella Hb. 1 ♂ südwestl. Tierhag a. Licht.

„ *myellus* Hb. 1 ♂ auf d. Warte a. Licht.

Hypochalcia ahenella Hb. 1 ♂ b. Bärloch a. Licht.

Scoparia truncicolella Stt. 1 ♂ im Wald zwischen Vord. Strahlegg u. Bärloch.

Tortricidae.

Cacoecia aeriferana H. S. 1 ♂ dieses seltenen Falterchens auf d. Warte a. Licht.

Pandemis cinnamomeana Tr. Häufig bei Hint. Strahlegg u. b. Bärloch a. Licht.
Notocelia incarnatana Hb. 2 ♂ auf der Warte u. 1 ♂ a. d. Schindelbergerhöhe a. Licht.
Epiblema cana Hw. 1 ♂ b. Pens. Hint. Strahlegg a. Licht.
 „ *nisella-decorana* Hb. 1 ♂ dieser selt. Form b. Bärloch a. Licht.

Orneodidae.

Orneodes desmodactyla Z. 1 ♂ b. Bärloch a. Licht.

Gelechiidae.

Hypercallia citrinalis Sc. 1 ♂ am Südhang der Wartenhöhe.
Gelechia electella Z. 1 ♂ auf der Warte aus Wacholdergebüsch geklopft.

Gracilariidae.

Lithocolletis salictella Z. 1 Stck. in d. Vord. Tößschlucht (Punkt 963).

Lyonetiidae.

Lyonetia clerkella L. Westl. Pens. Hint. Strahlegg häufig aus Gebüsch geklopft.
 „ *clerkella-aereella* Tr. do.

Elachistidae.

Eladista monticola Hein. Wck. 1 ♂ bei Pens. Hint. Strahlegg aus Gebüsch geklopft.
 „ *nigrella* Hw. 1 ♂ am Südhang der Wartenhöhe.
 „ *humilis* Z. 1 ♂ auf d. Schindelbergerhöhe a. Licht.

Hyponomeutidae.

Prays curtisellus Dup. Vord. Tößschlucht b. Punkt 963, 1 ♂.
Hyponomeuta cognatellus Hb. 2 ♂ unterhalb Tierhag a. Licht.
Argyresthia fundella F. R. 1 Stck. am Westhang der Schindelbergerhöhe.
Cerostoma parenthesella-paricostella Fuchs. 1 ♀ westl. Pens. Hint. Strahlegg aus Gebüsch geklopft.

Nepticulidae.

Nepticula basalella H. S. 1 Stck. in der Vord. Tößschlucht (P. 963).

In den Jahren 1920—23 wurden im Schongebiet am Tößstock festgestellt:

| | Arten | Formen | | Arten | Formen |
|----------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
| Papilionidae | 1 | | Pyralidae | 29 | 2 |
| Pieridae | 8 | 2 | Tortricidae | 49 | 5 |
| Nymphalidae | 28 | 5 | Glyphipterigidae | 1 | |
| Erycinidae | 1 | | Pterophoridae | 7 | |
| Lycaenidae | 11 | | Orneodidae | 1 | |
| Hesperiidae | 8 | | Gelechiidae | 14 | |
| Sphingidae | 4 | | Coleophoridae | 6 | |
| Notodontidae | 7 | | Gracilariidae | 5 | 1 |
| Drepanidae | 2 | | Lyonetiidae | 1 | 1 |
| Saturniidae | 2 | | Elachistidae | 4 | |
| Lasiocampidae | 2 | | Scytrididae | 2 | |
| Lymantriidae | 2 | | Hyponomeutidae | 16 | 2 |
| Noctuidae | 47 | 1 | Tineidae | 2 | |
| Cymatophoridae | 2 | | Incurvariidae | 7 | |
| Geometridae | 94 | 4 | Nepticulidae | 1 | |
| Arctiidae | 7 | 1 | Micropterygidae | 2 | |
| Zygaenidae | 6 | 3 | Hepialidae | 2 | |
| Psychidae | 1 | | | <hr/> | |
| | | | | 382 | 27 |

Paul Weber, Zürich.