

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss
Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 1 (1862-1865)

Heft: 2

Artikel: Weitere Beiträge zur schweizerischen Hymenoptern-Kunde

Autor: Meyer-Dür

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-400165>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Orthoptera.

- 1) *Locusta cantans* Fssl. fand sich Anfangs September häufig in lichten Waldtobeln der Gysnau bei Burgdorf vor. — Dagegen ist der im Jahr 1858 so zahlreich aufgetretene *Pachytylus cinerascens* Fieb. seither aus unserer Gegend wieder ganz verschwunden.
- 2) *Forficula acanthopygia* Gén. fand sich im August um Bern häufig unter Platanenrinde in Bremgarten und scheint dort diese sonst allgemein sehr seltene Art förmlich eingenistet.

Hemiptera.

- 1) *Sthenarus (Capsus) Roseri* H. S. Eine ganze Colonie dieses sehr seltenen Capsiden kloppte ich am 12. Juli beim hiesigen Turnplatz von einer Wollweide. Das ♀ hat einen blass rostgelben Thorax und bleiche ganz ungestriemte Flügeldecken. Das ♀, mit dunkelschwarzbraunem Thorax, Scutellum und Innenwand der Flügeldecken, stimmt ganz mit Herr. Sch. Abbildung überein.
- 2) *Dichroscytus (Caps.) rufipennis* F. wurde Mitte Juli im Meyenmooswald bei Burgdorf öfters von jungem Eichengesträuche abgeklopft. Dasselbst fand sich auch
- 3) *Camptoneura virgula* H. S. in zahlreichen Exemplaren.
- 4) *Typhlocyba elegantula* Z. M. im Juli auf Eichen in Menge gesammelt.
- 5) " *discicollis* H. S. " " " " " " "

Weitere Beiträge zur schweizerischen Hymenoptern-Kunde

von Meyer-Dür.

- 1) *Methoca ichneumonoides* Latr. (*Gonatopus mutillarius*, Nees ab Esenb.) Ein ♀ dieser überaus seltenen Art fieng ich im Juni an einem sehr heissen Sandbord am Binsberg bei Burgdorf.
- 2) *Bombus apricus* F. fand sich diesen Sommer einzeln an unsern Waldrändern der Gysnau.
- 3) *Chrysis auripes* Wesm. am 21. Juni bei Burgdorf an altem Holzwerk gefunden.
- 4) *Neuroterus numismalis* Ol. Diese Gallwespe fand ich schon im Merz im Gyrix bei Aarau zu tausenden auf Eichenbüschen.

- 5) *Smiera clavipes*. (Chalcis) Diese wunderhübsche Art mit gewaltig verdickten braunrothen Hinterschenkeln, schöpfte ich am 25. Mai im Egelmoos bei Bern von Sumpfpflanzen ab.
- 6) *Dasypoda hirtipes* ♂ ♀ schwärmte im August in zahlloser Menge bei Burgdorf aus den Sandwänden einer Griengrube heraus.
- 7) *Priocnemis exultans* D. Beide Arten (von Sichel bestimmt) im Juni
- 8) „ *propinquus* „
mehrmals um Burgdorf am Gyrixbergdamme gefangen.

Ganz auffallend war diesen Sommer um Burgdorf die enorme Menge von *Solenius 6cinctus*, *Thyreopus cribrarius*, dann eines neuen noch unbeschriebenen *Triphon* um Buchen schwärmend, an welchen Raupen von *Lithosia quadra* auf und ab liefen. In den Schächten längs der Emme wimmelte es förmlich von *Tenthredoniden*, und zwar bestand die Masse hauptsächlich aus *Selandria sericans* Hart. — *Selandria ovata* L. — *Dolerus eglanteriae* F. — *Tenthredo Fagi* (maura Lep.) — *Tenthredo colon*, *flavicornis*, *nitida*, *viridis*, *scalaris*, *Macrophya punctum*, *neglecta*, *12punctata*, *Macrocera ribis*, *Allantus 3cinctus*, *scrophulariae*, *Tenthredo atra*, *Hylotoma coerulescens*, *Athalia rosae*, *Pachyprotasis rapae* Kl., *Tenthredo aucupariae* Kl., *Macrophya haematopus* Pz., *Eriocampa luteola* Kb., *Dolerus niger* Kl., *gonager* F. und *uliginosus* Kl. — *Blennocampa ephippium*. — An Eschen schwärmte am 1. Mai in ungeheurer Menge *Blennocampa fuliginosa* Sch.? und im Egelmoos bei Bern im Schilfe eine kleine Art, die ich für *Blennoc. pusilla* Kl. halte.

Abia fasciata F. war um die Mitte des Mai in allen unsern Schächten ziemlich zahlreich.

Die Zahl der von mir im heurigen Sommer nur in Burgdorfs Umgebung gefangenen Hymenoptern-Arten beläuft sich nahezu auf 1000 und die der *Tenthredoniden* einzig bei 90.

Antwort!

Herr Meyer-Dür fragt im 1. Hefte unserer Mittheilungen an, wo Bremi's hinterlassene Sammlung schweizerischer Diptern hingekommen sei. Hierauf diene als Antwort:

Dass die Bremi'sche Sammlung angekauft und dem schweize-