

VII me recueil : supplément à la monographie du genre *Calathus*

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **2 (1866-1868)**

Heft 7

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400234>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

VII^{me} RECUEIL.Supplement à la monographie du genre *Calathus*.
Corrigenda.

1^o Le *calathus distinguendus*, de Chaudoir, n'est qu'un *C. latus* Linné.

De l'aveu de M. de Chaudoir; son assertion (in litteris) chez Mr. Reiche.

Il faut donc établir la synonymie de cette espèce de la manière suivante :

Calathus **Latus**. Linné.

Syno : *cisteloïdes*. Illiger.

» *distinguendus*. de Chaudoir.

2^o Ayant trouvé tous les passages entre le véritable *C. bœticus* Rambur, et les *hispanicus* ou *lugens*; Mr. Piochard de la Brulerie et moi établissons ainsi cette synonymie :

Calathus **bœticus** Rambur.

Syno : *hispanicus*. G. des Cottés.

» *lugens*. de Vuillefroy.

Mr. Piochard de la Brûlerie ayant mis à ma disposition tous les calathus provenant de ses chasses d'Espagne, pris de concert avec M. de Vuillefroy; il m'a été facile de rectifier et préciser des espèces tant décrites dans ma monographie qu'ailleurs. M. Piochard de la Brûlerie adopte également cette révision. Ainsi :

3^o Le calathus *asturiensis* Vuillefroy, n'est qu'un simple *fulvipes* Gyllenhall.

Il faut donc établir ainsi cette synonymie et ajouter (toujours d'après l'opinion des deux auteurs :) :

Calathus **fulvipes** Gyllenhall.

Syno : ? *angustatus* Rambur.

» *asturiensis* Vuillefroy.

Var. : *pedibus piceis*.

Syno : *bipunctatus* G. des Cottés.

» *liotrachelus* Vuillefroy.

4^o Le *C. angularis* Chevrolat est bien une espèce similaire au *C. uniseriatus* Vuillefroy. Mr. Chevrolat a soin d'indiquer dans son

extrait de la rev. zool. de 1865 page 21, Nr. 33, que cette espèce a une série de neuf points sur la 3^{me} strie des élytres; j'ajouterai que cette série de 9 points est constante chez les espèces passées par mes mains.

Ainsi la synonymie de cette espèce restera comme dans ma monographie.

Calathus **angularis** Chevrolat.

Syno: *uniseriatus* Vuillefroy.

5° Après des examens et preuves irréfragables, nous réunissons aussi au *C. ambiguus* Payk. les espèces suivantes indiquées tant dans ma monographie qu'ailleurs.

Calathus **ambiguus** Paykull.

Syno: *fuscus* Fabricius.

» *dilutus* Chaudoir.

» *Chevrolatii* G. des Cottés.

Var.: *pedibus fusco-piceis*.

depressus G. des Cottés.

grenatensis Vuillefroy.

Observation. A cause des caractères différentiels que j'ai indiqués dans ma monographie je n'ose encore réunir à *l'ambiguus* mon *Tappesii*.

6° Le *calathus rotundatus* Jacq. Duval, que j'avais placé bien loin du *piceus* Marsham, par suite d'un exemplaire mal nommé dans la collection Chevrolat vient, d'après le groupement de ma monographie, tout à fait à la fin du genre.

Ce calathus de Portugal, dont je possède un exemplaire typique, est semblable, en tous points, à ceux de la collection Reiche; et ils diffèrent du *piceus* de Marsham que par une plus grande taille (ils mesurent jusqu'à 13 mill.) et une couleur généralement plus foncée. C'est donc tout au plus une variété locale.

En effet, si je prends pour point de départ le *C. piceus* d'Angleterre, il mesure de 8 à 9 millimètres, celui de Paris de 9 à 10¹/₂ mill.; celui de Grenade (Espagne) de 11 à 12, et ainsi de suite en descendant jusqu'au Caucase où il paraît très abondant.

La synonymie s'en établira donc ainsi :

Calathus **piceus** Marsham.

Syno: *rotundicollis* Dejean.

» *rotundatus* Jacq. Duval.

Band 2. Nr. 3. 1866. page 114. ligne 31. Au lieu de plaine lisez pleine.

Band 2. Nr. 4. 1866. page 159. ligne 15. Au lieu de Cheyrolatii lisez assimilis.

Band 2. Nr. 5. 1867. page 189. ligne 13. Au lieu de ferai lisez vérifierai.

Addenda.

1° Il faut ajouter, comme habitat du *C. glabricollis* Dejean, la Calabre, la Sicile et la Grèce.

Les exemplaires des deux premières provenances sont un peu plus larges que le type (c'est mon planipennis); quant à celui de Grèce, au contraire, il affecte une forme plus étroite.

2° Au *C. Syriacus* (Mihi) *orientalis* (de Chaudoir) il faut ajouter comme habitat Constantinople et ses environs, et Téhéran (en Perse). Les deux exemplaires que j'ai sous les yeux de cette dernière provenance sont identiques à ceux de Constantinople et de toute l'Asie mineure.

Description d'une nouvelle espèce de calathus de la faune européenne.

Calathus Bellieri.

N. sp. G. des Cottés.

Ovalis, piceus, subdepressus. Prothorace trapezoidali, angustiore elytris ad basin, reflexo in lateribus, angulis anticis præminentibus; posticis obtusis utrinque impressis punctatisque. Elytris deplanatis, ovalibus, striato punctatis, striis fortiter impressis; 3^a stria cum 5 vel 7 punctis. Ore, antennis, pedibus epipleurisque ferrugineo-rufis.

In Etruriâ lectus à Domino Bellier de la Chavignerie.

Long. 11 millim.

D'un brun de poix peu brillant, de forme ovalaire, très déprimé en dessus. Tête petite, rougeâtre à l'arrière, allongée. Prothorax en forme de trapèze renversé, étroit à l'arrière beaucoup plus que les élytres; côtés très relevés comme dans le *montivagus* Dej., angles antérieurs très prononcés presque acuminés; les postérieurs

obtus, relevés, avec une impression ponctuée de chaque côté. Les élytres sont ovalaires, très déprimées, fortement striées, ponctuée légèrement; sur la 3^{me} strie de 5 à 7 points très visibles; intervalles plans. La bouche, les antennes, les pattes et les épipleures sont d'un rouge ferrugineux assez clair, excepté les fémurs qui sont généralement foncés.

Cet insecte a été capturé, cette année, par mon collègue et ami Mr. Bellier de la Chavignerie dans les environs de Florence au pied des Apennins; il a eu la bonté de m'en donner deux exemplaires.

Observation. Cet insecte viendrait évidemment, à cause des angles postérieurs du corselet plus ou moins ponctués, à côté du *bæticus* Rambur *hispanicus* G. des Cottes.

Mais le retrécissement du corselet à sa base, ses côtés et ses angles postérieurs relevés, le font évidemment placer à côté des espèces de ma dernière division (*C. angusticollis* et *montivagus* Dej.). Cette découverte est très intéressante pour la faune européenne, déjà si pauvre dans les espèces composant la division dont je viens de parler.

Supplément à mon dernier recueil.

Description d'un nouveau *Calathus* d'Espagne, et observation sur le *harpalus subcylindricus*: Dej.

Calathus Vuillefroyi, nov. sp.

Niger, subdepressus; ♂ nitidus, ♀ opaca. Prothorace subquadrato, elongato; elytris angustiore; in lateribus reflexo; angulis posticis reflexis, rectisque; utrinque ad basin biimpresso, punctato in impressis. Elytris subdeplanatis, subparallelo-ovalibus; striatis; striis impunctatis, lævibus; stria 3^a cum 7 vel 9 punctis impressis. Antennarum, art.° 1^o rufo, articulis 2. 3. 4. nigris, ultimis fuscis. Pedibus nigris. Habitat in hispania bor.?

A Domino de Vuillefroy lectus. A. Dom. Jeckel datus.

Long. 11 à 12 millim.

Il est de la taille de mon *hispanicus*, (*lugens* Vuillefroy); mais il en diffère par la forme plus parallèle, entièrement déprimée en

dessus. Par le corselet carré plus long que large à côtés entièrement et fortement relevés, surtout vers les angles postérieurs qui sont droits et acuminés. Enfin par les élytres dont les stries sont lisses, et entièrement aplaties.

Insecte donné par Mr. de Vuillefroy à Mr. Jeckel, sous le nom de *lugens*.

Il a été récolté en Espagne pendant la dernière excursion par Mr. de Vuillefroy et Piochard de la Brûlerie, sans indication précise pour la localité.

Le *harpalus subcylindricus* Dej. sp. IV, 374, et Fairm. et Laboulbène Faun. Fr. p. 139, a été réuni, à tort, à *l'harpalus anxius* Duftschmid.

Cet insecte fort rare dans les collections, diffère essentiellement de l'*Anxius*, par ses élytres subparallèles, convexes en dessus, plus larges que le corselet; par celui-ci dont la base est occupée plus carrément etc. etc.

J'ai pris 3 exemplaires de ce rare *harpalus* au mois de Mai dernier, sur les bords de l'Arve à 8 ou 10 Kilomètres de Genève. C'est du reste, un insecte des montagnes.

Die schweizerischen Microlepidopteren.

Von

H. Frey.

~~~~~  
Vierte Abtheilung.

### 6. Gelechiden.

Der Reichthum dieser Familie, was Genera und Spezies betrifft, ist ein ausserordentlicher, so dass höchst wahrscheinlich bei den bedeutenden Differenzen, welche uns zwischen den extremen Gattungen entgegentreten, in der Folge eine Zerfällung in mehrere Familien sich ergeben wird. Ich selbst habe schon vor Jahren eine Anzahl jener Geschlechter als Familie der Oecophoriden von den eigentlichen Gelechiden ausgeschieden. Eine haltbare systematische Zer-