

Descriptions d'espèces nouvelles de Carabiques propres à la faune méditerranéenne, suivies de quelques observations

Autor(en): **Des Cottes, Gautier**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **2 (1866-1868)**

Heft 3

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400215>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Gautier des Cottes.

DESCRIPTIONS

d'espèces nouvelles de Carabiques propres à la faune méditerranéenne, suivies de quelques observations

1^o RECUEIL.

1. *Metabletus valladolensis*. Gaut. des Cottes.

Elongatus obsкуро-æneus, subnitidus. Prothorace subcordato angulis posticis obtusis reflexisque. Elytris elongatis substriatis, ad apicem rotundato-truncatis; aliquoties macula obsoleta humerali. Pedibus nigris, tibiis in medio levissime rufis; habitat in Hispania (Valladolid). A. Dom. Bellier de la Chavignerie lectus.

Longit. 3¹/₂ à 4 mill.

Allongé d'un noir obscur avec un reflet bronzé en dessus. Corselet cordiforme, assez court, rétréci en arrière, angles postérieurs obtus, relevés. Elytres allongées, striées; l'angle huméral ordinairement d'une couleur un peu plus claire à peine visible. Pattes noires, tibias quelquefois un peu plus clairs.

Ce *Metabletus* se rapproche de l'*obsкуроguttatus* (Dufts.); ce n'est que par comparaison avec ce dernier, qu'il est possible d'en bien préciser la description par la différence: Il est d'abord *d'un tiers plus grand*; le corselet est *plus rétréci* en arrière; les élytres sont *plus parallèles*, plus *allongées*, à *maculations presque invisibles sur les angles huméraux*, n'en présentant jamais avant leur extrémité. Les pattes sont *entièrement noires*, avec les tibias quelquefois *un peu plus clairs*. —

Ces caractères sont constants sur *une dizaine* d'exemplaires rapportés de Valladolid par mon collègue et ami, Mr. Bellier de la Chavignerie.

Nota. J'ai fait une *nouvelle espèce* de ce *Metabletus* au même titre que l'on a séparé le *Metabletus pallipes* - Dej. de l'*obsкуроguttatus* Duftsch.

2. *Blechrus mauritanicus*. Lucas (Exp. al. p. 16).

Cet insecte a été envoyé, de Sicile, à Mr. Bellier de la Chavignerie; il fait donc partie actuellement de la faune européenne.

3. *Amblystomus escorialensis*. Gaut. des Cottés.

Ovalo-oblongus, nigro-micans. Capite oblongo-ovali; articulis antennarum, primo testaceo, 2^o—6^o nigris, ultimis griseo-tomentosis. Prothorace subtransverso, rotundato, angulis posticis obtusis, utrinque impressis; linea basali sub-arcuata, transversa. Elytris parallelis, ad apicem rotundatis, sinuato-truncatis, subglabris striatisque. Pedibus piceis, tibiis in medio tarsisque læviter testaceis. — Hab. in Hispania (Escorial).

Longit. 1 $\frac{3}{4}$ mm. — à 2 mm.

Ovale-oblong d'un noir très brillant. Tête en ovale allongé; antennes à premier article testacé, les suivans jusqu'au sixième noirs, les derniers revêtus d'une villosité grise. Prothorax subtransversal, arrondi sur les côtés, un peu plus étroit en arrière, traversé à sa base par une ligne enfoncée qui se perd, de chaque côté, dans l'impression des angles postérieurs qui sont obtus mais bien marqués. Elytres presque parallèles s'arrondissant à l'extrémité qui est tronquée sinueusement; entièrement couvertes de stries d'autant plus fines qu'elles se rapprochent de leurs côtés. Les pattes sont couleur de poix, avec les tibias et les tarses un peu plus clairs.

Cette espèce diffère de toutes ses congénères:

- 1^o par sa forme plus courte.
- 2^o par la tête plus allongée.
- 3^o par le premier article des antennes entièrement testacé.
- 4^o par les élytres qui sont striées sur toute leur surface.
- 5^o par l'exiguité de la taille qui est constante.

Je dois deux exemplaires de cette espèce à l'obligeance de Mr. Perez-Arcas de Madrid, qui me l'avait indiquée comme nouvelle, et un autre à Mr. Piochard de la Brûlerie qui l'avait confondu avec *Amblystomus metallescens* Dej. Ils proviennent tous de l'Escorial.

Cette nouvelle espèce porte à 6 celles méditerranéennes contenues dans ce genre; abstraction faite toutefois du *Stenolophus niger* Heer (faun. helv. appendix p. 563) qui n'est que *Amblystomus metallescens* de Dejean; et non pas une variété de cette espèce comme l'indiquent tous les catalogues.

En voici l'énumération:

Amblystomus mauritanicus, Dej- 480. -*Algiria, Hispania,*
metallescens, Dej- 482. *Gal. mer. Helvetia Hispania etc.*
Raymondi Gautier Fr. 61. 193. *Gal. mer. hispan.*
Solskyi. Reiche Fr. 64. 231. *Algiria.*
escorialensis Gautier. *Mittheilungen* 66. *Hisp. bor.*
dilatatus. Chaudoir 188. *Caucasus.*

J'ajouterai que toutes ces espèces se divisent en deux groupes bien distincts:

- 1^{er} groupe corselet transversal, subarondi.
 2^{de} , , cordiforme.

4. *Bembidium (notaphus) gadarramense.* Gaut. des Cottés.

Curto-ovalum, nigro-nitidum; in utroque latere capitis striis duabus sub parallelis; antennis nigris, articulis primis glabris, ultimis villosis, — Thorace subquadrato, angulis posticis rectis reflexis, utrinque impressis. Elytris nigris, subnitidis, ovalibus, leviter convexis — sub striato-punctatis. Pedibus nigris.

Longit. 3 Mill.

- a. dom. Piochard de la Brûlerie lectum. Habitat in Montibus nivosis Gadarramæ (Hispania.)

C'est un des plus petits *Bembidium* de la division des *Notaphus* telle qu'elle est établie dans le Catalogue de feu Mr. Schaum; il n'y a guères que le *Bembidium ephippium* (Marsh), de la même division, qui lui soit inférieur en taille.

Il a la forme du *B. adustum* (Schaum)-*fumigatum* (Dej.); mais il est plus petit, entièrement noir brillant en dessus. La tête présente les deux sillons frontaux presque parallèles, non réunis à l'avant. Le corselet transversal, les angles postérieurs droits, relevés avec une impression bien marquée, de chaque côté. Les élytres sont striées ponctuées, les stries peu effacées en arrière et sur les côtés. Les pattes sont noires.