

# Supplément à la Faune des Macrolépidoptères du Valais

Autor(en): **Favre, E.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =  
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the  
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **11 (1903-1909)**

Heft 3

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400640>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

wird auch diesem Gebiete der Jura-Ebene eine spezielle Beachtung geschenkt und die Frage ihrer Stellung unter den übrigen Faunen-Distrikten gelöst werden müssen.

Für jetzt wollen wir zufrieden sein, dass das mittlere Jura-Gebiet in dem besprochenen Werke eine so sorgfältige Bearbeitung erfahren hat. Wir möchten von ihm sagen wie jener Kritiker: „Sein einziger grosser Fehler ist der, dass es nicht mich zum Verfasser hat.“

Sei es also nochmals aufs wärmste empfohlen; es ist zu beziehen von Monsieur le Prof. Tripet, secrétaire de la société des sc. nat. à Neuchâtel zu dem verhältnismässig sehr bescheidenen Preis von Fr. 7.50.

---

## Supplément à la Faune des Macrolépidoptères du Valais.

---

Compte-rendu d'excursions faites dans la vallée de Tourtemagne (Valais) en 1903—04 par M<sup>r</sup> le pasteur de Rougemont à Dombresson et qu'il a bien voulu nous communiquer pour notre Bulletin.

Tout d'abord il a soin de nous prévenir que la plupart des papillons qu'on y rencontre y sont, par suite de la configuration de la vallée, moins communs que dans beaucoup d'autres localités valaisannes. Voici ceux qu'il y signale:

*Parn. delius* Esp. Moins fréquent que dans le Val d'Anniviers.

*Pieris Callidice* Esp. Pâturages au-dessus des bois.

*Colias Phicomone* Esp. — Chenille sur *Hipporepis comosa*.

*Lycaena Optilete* Kn. et *Donzelii* Bdv. assez fréquents le long de la Tourtemagne et en remontant les sentiers des forêts jusqu'à la limite supérieure des bois.

*Lyc. Bellargus* Rott. Fin-juin. Des exemplaires beaucoup plus grands que le type, dans les replats humides et herbeux des hauts pâturages, entre 1800 et 2200 m, là où fleurit *Primula farinosa*; cette variété est d'ailleurs rare, on peut même dire très rare (trouvée aussi à Grimentz et à Tête à Fayaz en Anniviers).

*Polyom. Virgaureae* var. *Zermattensis* Fall. vole en grande abondance dans le bas de la vallée dès les premiers jours de juillet. Beaucoup plus fréquent que dans la localité classique de Zermatt où il diminue considérablement.

*Polyom. Dorilis* var. *Montana* M.-D. = *Subalpina* Spr. — Dans les hauts pâturages de Gruben-dessus.

*Melit. Cynthia* Hb. Bien plus rare qu'à Zinal.

*Syricht. Cacalia* Rbr. Assez fréquent au commencement de juillet dans les replats humides des plus hauts pâturages, de 2200 à 2500 m.

En fait de *Sphingides* la seule bête intéressante que M<sup>r</sup> de Rougemont signale dans la vallée de Tourtemagne est une *Sésie* qui vole en juillet sur les touffes d'*Euphorbia Cyparissias* entre 1800 et 2000 m dans les clairières des forêts, et qui n'est probablement qu'une variété alpine de la *Sesia Tenthrediniformis* Lasp. (*Empiformis* Esp.). Elle s'en distingue cependant très visiblement par le fait que la partie transparente des ailes supérieures y est toute recouverte d'écaillés dorées; de sorte que l'aile paraît d'un brun-noir avec une tache longitudinale jaune sur le disque et une tache ronde assez grosse de la même couleur plus près de l'extrémité.

*Lithosia Cereola* Hb. Quoique rare en Suisse, elle volait en assez grand nombre dans la forêt de Blumatt en juillet 1904.

*Arctia Flavia* Fuessl. M<sup>r</sup> de Rougemont dit avoir trouvé à plusieurs reprises le cocon frais éclos avec la dépouille de la chenille parfaitement reconnaissable sur les diverses alpes entourant Gruben et jusqu' à la hauteur de 2800 m. (Gigi-alp, pierriers des chalets de Gruben d'en haut; lac au pied du Meidenpass, etc.) Une chenille vivante a été trouvée par M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> Audéoud de Genève à la Gigi-alp en 1902.

*Arctia Hnateckii* Frey. M<sup>r</sup> de Rougemont l'envisage comme l'espèce type, dont la *Cervini* Fallou ne serait qu'une variété plus petite et plus sombre provenant d'une plus grande altitude. (Ce n'est pas notre avis: *A. Cervini* a été découvert par M<sup>r</sup> Fallou déjà en 1864, An. S. de Fr.; tandis que *Hnateckii* ne date que de 1872, Mitt. III p. 479; et Staudinger Cat. 1901 n'en fait qu'une aberr. plus claire avec toutes les ailes jaunâtres ♂ ♀, ita Favre.) M<sup>r</sup> de Rougemont continue et dit qu'il a trouvé les œufs, les chenilles, les chrysalides et l'insecte parfait et peut déclarer que chenilles et chrysalides sont parfaitement identiques à celles de la *Cervini*. (Cette dernière partie nous semble fortement corroborer notre manière de voir ci-dessus, Favre.) Quant à la localité, M<sup>r</sup> de Rougemont veut en garder le secret pour beaucoup de raisons. Nous l'approuvons sans réserve aucune, car il n'est plus possible d'indiquer les localités de semblables raretés: la *Cervini* était très abondante au Gornergrat et aujourd'hui on en est à se demander si elle y est encore.

- Psyche plumifera* Ochs. (probt. *Vallesiella* Mill. selon nous).  
Dans les hauts pâturages.
- Bombyx Alpicola* Staud. Plus fréquent à Gruben que nulle part ailleurs.
- Crateronyx Taraxaci* Esp. Volait en grand nombre autour des réflecteurs fin-août 1903 (et fin juillet 1905).
- Harpyia Vinula* L. et *Pygaera Pigra* Hfn. Les chenilles de ces deux espèces se trouvent nombreuses sur les buissons de petits trembles dans les clairières des forêts de la Meidenalp (rive gauche de la Tourtemagne) jusqu' à 2000 m d'altitude.
- Agrotis praecox* L. Un superbe ex. au réflecteur de l'hôtel, en août 1903.
- Agrotis cuprea* Hb., *Ocellina* Hb., *Grisescens* Tr., *Simplonia* H. G., *Recussa* Hb. et *Corticea* Hb. s'y rencontrent, plus ou moins abondants.
- Mamestra Dentina* Esp. Pas rare, comme partout.
- Halena Zeta* var. *Pernix* H. G. Quelques ex. au réflecteur.
- Had. Lateritia* Hfn. Pas rare.
- Hypt. Ochreago* Hb. De jour, sur les fleurs dans le fond de la vallée, en juillet (J. Müller-Rutz).
- Mithymna Imbecilla* F. Vu un seul exemplaire.
- Plusia Illustris* F. Un seul exemplaire.
- Plusia Interrogationis* L. Quelques superbes ex. (seule place des Alpes où M<sup>r</sup> de Rougemont ait rencontré cette espèce).
- Pl. Divergens* F. Très nombreux sur les pâturages élevés. (Pas rencontré *Devergens*, ni *V. argenteum*, ni *Deaurata*).
- Pl. Ain* en juillet 1905 dans le fond de la vallée (J. Müller).
- Anarta Nigrita* Bdv. Un seul exemplaire (couloir de la Gigialp).
- A. Melanopa* var. *tristis* Hb. Abondant, comme partout. M<sup>r</sup> de Rougemont en a vu un ex. à ailes inférieures blanches avec bordure noire, donc la vraie *Melanopa* Thb. qu'il n'a sans cela jamais rencontré dans les Alpes. — Nous ajoutons que notre ami M<sup>r</sup>. Ch. Oberthür, en notre compagnie, a pris un ex. identique en 1902 dans des clairières de forêts d'arolles dans les environs de l'hôtel de Riffelalp (Favre).
- Acidalia Immorata* L. Quelques ex. à la plus haute altitude où il ait jamais rencontré ce papillon, 2150 m en fin juin 1904, dans un pré humide.
- Acid. Fumata* Steph. volait en assez grand nombre tout le long de la lisière supérieure de la forêts de Meiden (rive gauche) à 2000—2100 m fin-juin et commencement juillet.
- Psodos Alticolaria* var. *Faucium* Favre. Sur les hauts cols de Forcletta et de Augstbordpass; en même temps que *Gnoph. Caelibaria* H. S. et *Dasy. Tenebraria* Esp., vole plutôt en août qu'en juillet; toujours très rare.

*Gnophos Obfuscaria* Hb., *Psod. Coracina* Esp., *Trepidaria* Hb., *Alpinata* Sc., *Quadrifaria* Sulz., *Pygmaena Fusca* Thb., *Halia Brunneata* Thb., *Cleogene Lutearia* F., *Minoa Murinata* Sc., *Lygris Populata* L., etc. sont tous très communs dans la seconde moitié de juillet, surtout entre 1800 et 2200 m.

*Cidaria Simulata* Hb. Bien plus rare qu'à Zermatt.

*Cid. Immanata* Hw. Dans les forêts.

*Cid. Munitata* Hb. Dans les hauts pâturages au-dessus de la région arborescente, de 2200 à 2400 m.

*Cid. Aptata* Hb. Moins commun qu'à Grimentz.

*Cid. Turbata* Hb. Assez rare.

M<sup>r</sup> de Rougemont signale encore dans cette vallée quelques jolis Microlépidoptères: Sur les plus hauts cols (2600 bis 2900 m): *Hercyna Helveticalis* H. S.; *Rupestrialis* Hb. (J. Müller, août 1905); *Crambus Luctiferellus* Hb. et var. *Luctuellus* H. S.; *C. Zermattensis* Frey; *Scoparia Valesialis* Dup., très fréquent dans tous les hauts pierriers; *Gelechia Melaleucella* Const.; *G. Perpetuella* F. R.; *Butalis Glacialis* Frey.

Dans les plus hauts pâturages (2100—2600 m): *Penthina Metalliferana* H. S.; *Sphaler. Alpicolana* Hb.; *Tortrix Rigana* Sod.; *Conchylis Rutilana* Hb., *Dichr. Cigulana* H. S. et *harpeana* Frey etc.

Dans les forêts (1800 – 2100 m env.): *Scoparia Centuriella* S. V. (fin juin); *S. Sudetica* Z.; *Botys Nebulalis* Hb., remarquablement abondant; *B. Inquinatalis* Z.; *Crambus Speculalis* Hb.; *Pempelia Fusca* Haw., en grand nombre; *Tortrix* var. *Dohrniana* H. S.; *Conchylis Pallidana* Z. (très grands exemplaires, forêt de Blumatt); *Adela Ochsenheimerella* Hb.; *Anchinia Daphnella* S. V.; *Chaul. Scurellus* F. R. etc.

Martigny-ville, le 10 Avril 1905.

Ch<sup>ne</sup> E. Favre.