

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss
Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 19 (1943-1946)

Heft: 3

Nachruf: Notice nécrologique

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

déjà de *Ph. nigrogemmea* sous le rapport de la conformation des ptérygodes ; elle a les tegulae et les ptérygodes presque entièrement recouvertes de poils écailleux terminés en palette ; les palettes sont imperceptiblement dentelées à leur extrémité comme chez *Ph. nigrogemmea*, mais chez cette dernière ce revêtement scaliforme est bien moins ébouriffé, plus couché et mieux imbriqué ; enfin ; il est bien moins prononcé aux tegulae qu'aux ptérygodes.

Il faut noter que HAMPSON (Cat. Lep. Phal. Br. Museum, XII, pp. 402—403) sépare le genre *PLUSIDIA* Btlr., avec comme seule espèce *cheiranthi* Tausch., des *EOSPHOROPTERYX* Dyar. et des *PHYTOMETRA* Haw. en se basant sur le fait que les premiers ont les ptérygodes « dilatées d'écailles » à leur extrémité. Cette distinction nous paraît reposer sur un caractère bien ténu, après ce que nous venons de voir pour certaines *Phytometra* éthiopiennes.

Les antennes de *Phytometra nigrogemmea* ♀ sont très finement et densément ciliées.

Au point de vue de la longueur et de la densité des épines dont sont garnis les tarses de toutes les pattes, *Ph. nigrogemmea* se comporte sensiblement comme *Ph. limbirena*. Les tibias des pattes postérieures sont modérément frangés de poils en dessus, de sorte qu'on pourrait classer l'espèce décrite plus haut dans la section IV de HAMPSON (Ct. Lep. Phal. Br. Museum, vol. XIII) et dans son groupe Aa b1 b2 (pp. 461—462) près de la *Phytometra dorjmeisteri*, dont elle est cependant très différente.

Envergure d'apex en apex : 24 mm.

Tshinkolobwe, 20-3-1931, 1 ♀ type assez fraîche.

Notice nécrologique.

Au printemps de l'année 1943, la Société Lépidoptérologique de Genève a eu douleur de perdre prématurément l'un de ses membres les plus anciens et des plus dévoués, en la personne du Docteur GEORGES-E. AUDEOUD de Chêne-Bourg. Une biographie de notre très regretté collègue paraître dans le bulletin de 1944.