

La femelle de *Lapton femoralis* Nees

Autor(en): **Ferrières, C.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **20 (1946-1947)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400978>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

La femelle de *Lapton femoralis* Nees

par

CH. FERRIÈRE.

(Muséum d'Histoire naturelle de Genève.)

A la suite de la note parue dans le « Bulletin de la Société entomologique suisse », Vol. XIX, 1946, p. 694, sur la présence de cette espèce à Genève et au Valais, M. J. DE BEAUMONT, directeur du Musée zoologique de Lausanne, en cherchant dans sa riche collection d'Hyménoptères, trouva trois exemplaires de *Lapton* qu'il avait récoltés dans le Valais en 1943. Un mâle avait été pris le 25 juin à Martigny et un couple vers la fin de juillet à Zeneggen, au-dessus de Viège. Cette espèce, restée si longtemps inconnue, n'est donc pas si rare, tout au moins dans le Valais.

La découverte de la femelle me permet de compléter la note précédente. Point n'est besoin d'en donner ici une description détaillée ; la description du mâle s'adapte en effet en tous points exactement aussi à la femelle, tant pour la coloration que pour la structure des diverses parties du corps. L'abdomen, vu d'en haut, s'élargit jusqu'à l'extrémité du second segment puis se rétrécit fortement en arrière, où les derniers segments sont fortement comprimés sur les côtés, presque en lame de couteau. Le dernier segment ventral est court, comprimé comme les tergites, et s'avance un peu en triangle au-dessous de la base de la tarière, sans vraiment dépasser le bout de l'abdomen. La tarière est très courte, à peine proéminente, avec les valves légèrement élargies. Longueur du corps : 10 mm.

PFANKUCH, après avoir examiné le type mâle de NEES, l'avait placé parmi les *Pimplinæ Acænitini*. J'avais cru pouvoir confirmer cette opinion après avoir étudié deux mâles trouvés en Suisse, tout en relevant les différences qui séparaient ces mâles de ceux de *Phænolobus* et d'*Acænitus*. Maintenant que la femelle est connue, il faut reconnaître que cette opinion ne peut plus se justifier. L'abdomen de la femelle est nettement du type des *Ophioninæ* et se rapproche en particulier de celui des *Banchini*. C'est dans cette tribu que le *Lapton femoralis* est actuellement le mieux situé, comme SCHMIEDEKNECHT l'a fait dans ses *Opuscula Ichneumonologica*. Toutefois la forme de la tête, où le clypeus n'est pas séparé de la face, l'absence d'aréole dans les ailes antérieures, le développement et l'épaississement des pattes postérieures et surtout l'allongement des pièces buccales en forme de bec en font un genre tout à fait distinct des autres *Banchini* et le feront peut-être rentrer dans une tribu spéciale.