

Zeitschrift: Bericht über die Tätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft
Herausgeber: St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft
Band: 80 (1969-1972)
Anhang: [Beilagen]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


Beilage 1 Glazialmorphologische Karte Gossau – Jonschwil

1 : 50'000 0 1 2 km



Beilage 2 Geomorphologie von Nassen – Anzenwil (Ausschnitt der Original – Kartierung)

1 : 10'000
0 200 400 m



Legende

Untergrund

- anstehendes Gestein (Molasse)
- Ablagerungen
- Kalksinter

Gewässer

- Quelle
- alter Flusslauf
- Necker-Flussbett Sommer 1970
- Vernässung, Sumpf

Fluviale Formen

- Terrassenkante deutlich, ± konsolidiert
- do undeutlich
- do, Prallhang aktiv zurückschreitend
- Wasserfall, Stromschnelle
- Schuttfächer
- Schotterbänke im Necker Sommer 1970

Formen in Fels und Schutt


- Abrissnischen
- Rutschung
- Gehänge- und Blockschutt

Glaziale Formen

- Moränen-Bedeckung
- Schotter und Schottermoräne
- Wallmoräne
- randglaziale Entwässerung
- Rundhöcker

Verflachungen (Terrassen und Talböden)

- prä- und hochglazial
- spätglazial, höheres Niveau (Konstanz-Stad.)
- do, tieferes Niveau
- holozäne Flussaue



Beilage 4 Unteres Neckertal im Würm - Maximum

1 : 50'000

0 1 2 km



Legende

++ risszeitliche Erratiker

Eisrandlagen des Würm - Maximum :

äusserer Stand

innerer Stand

höchste Moränenmassen

eisrandliche Stauterrassen

++ Erratikergruppen äusserer Stand


xx do innerer Stand

○ Drumlins zw Rhein-/Neckergletscher

○ Rundhöcker, eisüberprägte Kuppen

Transfluenzspässe


--- Grenze zw Rhein- und Säntiseis



Beilage 5 Unteres Neckertal im Diessenhofen – Stadium des Hochwürm

1 : 50'000

0 1 2 km




Legende

Eisrandlagen des Diessenhofen – Stadiums:

- a äusserer,
- m mittlerer,
- i innerer Stand
- Moränenwälle
- Schottermoränen
- Schotterfelder und eisrandliche Stauschotter
- Erratikerhäufungen dieser Stände
- randglaziale Entwässerung
- subglaziale Entwässerung
- Eintiefung der Aach
- kurzfristiger Eisstausee

Beilage 6 Unteres Neckertal und Umgebung im Stein a/Rh - Stadium des Hochwürm

1 : 50'000 0 1 2 km



Legende

Eisrandlagen des Stein a/Rhein - Stadiums :

- a äusserer ,
- m mittlerer ,
- i innerer Stand
- ~~~~~ Moränenwälle
- Schotterfelder
- hinterstaute Schotter im unteren Neckertal
- Rundhöcker dieses Stadiums
- Schmelzwassertäler
- randglaziale Entwässerung
- subglaziale Entwässerung
- kurzfristiger Eisstausee ?

Beilage 7

Glazialmorphologische Karte der Umgebung von St Peterzell (Neckertal)

1 : 25'000

0 0,5 1 km





Legende

- Gratlinien
- Terrassen- und Tobelränder
- Anstehendes: Molasse
- glaziale Bedeckung: Moräne, Schotter
- Flussauen und -schotter
- Moränenwälle deutlich
- do undeutlich
- drumlinartige Moränenhügel
- Schuttfächer
- Rundhöcker

Eisrandlagen des Peterzeller Stadiums (Stein a/Rhein) :

- äußerer Stand
- mittlerer Stand
- innerer Stand
- randglaziale Entwässerung
- ++ wichtige Erratiker





Legende

-  Gletscherzungen- und Firnbegrenzung
-  Höhenkurven der Eisoberfläche
-  Schotterfelder, Stauschotter
-  Moränenwälle des 3. Stadiums im Hochwürm (Stein a/Rhein)
-  wichtige Rundhöcker des 3. Stadiums im Zungenbereich
-  randglaziale Entwässerungsrinnen
-  subglaziale Entwässerung
-  Eisstausee
-  do unsicher
-  Gratlinien und Wasserscheiden im Akkumulationsgebiet
-  Abgrenzung von Gletscher-Einzugsgebieten
-  Pässe
-  Eistransfluenzen mit Bewegungsrichtung des Eises
-  Eisabflussrichtung
-  Berggipfel
-  Siedlungen mit Höhenangaben

Beilage 9 Necker-, Thur- und Urnäschgletscher im jüngeren Hochwürm (Stein a/Rh - Stadium)

1 : 100'000

0 2 4 km

