

Les orchidées du Val Blenio (Tessin) : un supplément

Autor(en): **Gsell, Rudolf**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **41 (1946)**

PDF erstellt am: **23.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1003608>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Les Orchidées du Val Blenio (Tessin)

Un supplément
par Rudolf Gsell, Coire

J'ai publié, il y a deux ans, une liste des orchidées du Val Blenio. Depuis ce temps-là j'ai pu augmenter cette liste et je répons volontiers à l'aimable invitation de Monsieur le Professeur M. Jäggli de publier les nouveaux données dans le « Boll. d. Soc. Ticinese di Sc. Nat. ».

Les plantes figurant dans ma première liste des Orchidées du Val Blenio, seront marquées par VB. I. (Val Blenio, première liste). ¹⁾.

Voici les données les plus intéressantes:

Cypripedium Calceolus L.

VB. I.

Orchis Morio L.

Pentes méridionales du Toira entre Sommascona et l'Alpe d'Anvedua, à 1300 m. env., un seul pied. — VB. I.

O. coriophora L.

VB. I.

O. tridentata Scop.

Leggiuna à S. Anna, çà et là. — Assez répandu entre Sommascona et l'Alpe d'Anvedua. Monte jusqu'au-dessus de 1500 m., à l'est de l'Alpe d'Anvedua, et se trouve çà et là entre 1400 et 1500 m. Ce sont les stations les plus élevées en Suisse connues jusqu'à présent. — VB. I.

O. ustulata L.

Monti di Leggiuna, 830 m. env. — Entre Leggiuna et S. Anna çà et là, atteignant une hauteur de 35 cm. — Entre S. Anna et Malvaglia 670 m. env., deux stations. — Au sud des Mti Gariva sur Castro à 1600 m., entre Mti Gariva et Piano dei Oss à 1700 m. env. et 1750 m. env., plantes isolées. — Mti Sasco au sud-ouest de Camperio. — Val di Campo Blenio: à l'est de Ronco, 1670 m. env. — VB. I.

1) Gsell Rudolf. Die Orchideen des Bleniotales. Boll. d. Soc. Ticinese di Sc. Nat. XXXVIII 1943 (novembre 1944) pag. 112-123.

O. tridentata x ustulata (= *O. Dietrichiana* Bogenh.)

Leggiuna à S. Anna, 600 m. Trois pieds entre les parents.
— Pentes méridionales du Toira à l'est des Mti Anvedua, 1500 m., avec l'*O. tridentata*, et non loin de l'*O. ustulata*. — VB. I.

O. mascula L.

VB. I.

O. sambucina L.

VB. I.

O. sambucina var. *incarnata* x var. *lutea* (= *O. Zimmermanni* Camus).

VB. I.

O. maculata L.

VB. I.

lus. *candidissima* Schulze. Un pied dans l'*Alnetum* de Campra (Valle S. Maria), 1450 m. env.

O. latifolia L.

VB. I.

O. Traunsteineri Sauter.

Pentes sud-est du Molare: à l'ouest de Piano dei Oss, 1940 m. env., abondamment. De même à 1900 env. et 1800 m. env. — Valle de S. Maria ça et là, à savoir: Mti Sasco (au sud-ouest de Camperio), où je crois avoir vu des hybrides avec l'*O. maculata*, puis Mti Pü 1350 m. env., Campra 1450 m., abondant, Piano Segno, Acquacalda à 1750 m. env. en abondance, et enfin à Casaccia à 1800 m. — Val di Campo entre Ronco et Stabbio Nuovo à 1670 m., en divers endroits, dont quelques-unes en abondance. — Au nord de Campo Blenio entre Butino et Megordino, 1300 à 1340 m., ça et là, souvent en abondance. — Toutes ces données sont cependant à vérifier à l'égard de *O. alpestris* Pugsley. — VB. I.

O. incarnata L.

Au nord de Campo Blenio, entre Butino et Megordino, le long de deux ruisseaux, à 1310 m. env., par endroits, en compagnie d'*Epipactis palustris*. Je n'ai pas vu l'*O. incarnata* en fleur, mais la tige creuse, d'une couleur vert-jaune et non pas vert-bleue, la forme des feuilles, les fleurs petites, tout cela indique la présence de l'*O. incarnata* et non pas de l'*O. Traunsteineri* (ou de l'*O. al-*

pestris), qui d'ailleurs s'y trouve aussi. — A Casaccia je ne pouvais pas trouver l'*O. incarnata*, quoique j'ai cherché un peu partout. Le rapport de *Franzoni* (voir *Chenevard*: « Passo Lucomagno, à Casaccia ») n'est donc pas confirmé. — VB. I.

Traunsteinera globosa Rchb. (*Orchis globosa* L.).

Au sud de Corzoneso (à l'ouest de Dongio) 900 m., deux pieds, exposition est. — Sur les flancs blenois du Molare je n'ai pas encore vu la *T. globosa*. — VB. I.

Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
VB. I.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

Aux environs de Marolta selon une aimable communication de M. Duby. — VB. I.

Chamorchis alpina (L.) Rich.

Au-dessus de Foiada, (pentes est du Molare) à 2200 m. env. — Entre Foiada et Piano dei Oss, 2000 m. env., un seul pied dans la bifurcation du sentier (au nord du point trigon. 2062.2 de l'atlas Siegfried). — Ganna Negra (à l'est du Lucomagno), env. 2400 m. (peu à l'ouest du col). — VB. I.

Herminium Monorchis (L.) R. Br.

Dans la Valle de Sà Maria très répandu et souvent en grande abondance; par exemple à l'est de la plaine de Campa à 1450 m. env. et à Mti Sasco, env. 1350 m. Par milliers. — Au-dessus de Ponto-Valentino (communic. de M. H. Dübi). — VB. I.

Coeloglossum viride (L.) Hartman.

Entre Passo di Nara et Pzo di Nara 2200 m. — Pentes méridionales du Molare çà et là, y monte jusqu'à 2530 m. au moins (Pzo Molare = 2588.3 m.). — Au nord du massif du Molare entre la Ganna Rossa et le Passo della Beretta, çà et là, p. e. à l'Eur Langosa 2380 m., à l'ouest du P. 2389 (voir l'atlas Siegfried) à 2310 m., et enfin au sud du P. 2389 à 2300 m. env. — Sommascona-Anvedua (pentes méridionales du Toira), 1290 à 1300 m. — A l'ouest de la Ganna Negra (à l'est du Passo Lucomagno) à 2400 m. env. — VB. I.

Nigritella nigra (L.) Rchb.

Passo di Nara - Pzo di Nara, 2300 m. — Pentes méridionales du Molare, çà et là. Monte jusqu'à 2580 m. au moins (sommets du Molare = 2588.3 m.). — Au nord de Foia-

da (pentes est du Molare) en grande abondance, p. e. à 2200 m. De même au-dessus de Piano dei Oss, en grande abondance. — Entre Eur Langosa et le Passo della Beretta, flanc nord du massif du Molare, à 2400 m. env. — Ganna Negra, à l'est du passo Lucomagno, répandu jusqu'à 2430 m. (le col de Ganna Negra 2440 m. env.). — VB. I.

1. *flava* Jacc. Au nord-ouest de Foiada (flanc oriental du Molare à 2100 m. env., 3 pieds d'un jaune blanchâtre, tournant au jaune foncé à l'état sec, et moins parfumés que le type qui y abonde.

N. rubra (Wettst.) Richter.

Au nord-est du Molare à 2300 m. env. — Au nord-ouest de Foiada, pentes orientales du Molare, à 2070 m. — VB. I.

Bicchia albida Parlat. (*Gymnadenia albida* (L.) Rich.).

S. Anna (sur Leggiuna) 700 m., un pied. — Entre Corzoeso et Moncuco (à l'ouest de Dongio) à plusieurs reprises, à savoir à 1090 m., haut de 24 cm., avec *Trifolium alpinum* L., puis à 1100 m., à 1120 m. et à 1160 m., avec *Pulsatilla alpina* ssp. *sulphurea* (L.) A. et G., *Trifolium alpinum* L., et une abondance de *Convallaria majalis* L. — En outre à Moncuco à 1270 m. et enfin au sud d'Avrosso 1250-1330 m. — Entre le Passo di Nara et le Pzo Erra ou à vrai dire entre Passo di Nara et le P. 2130 (col sans nom au sud du Passo di Nara), disséminé. — Passo di Nara - Pizzo di Nara, 2200 m.; au nord-est du Pizzo di Nara, env. 2200 m., ça et là. — Pentes méridionales du Molare: sur Piano dei Oss, env. 1940 m., et flanc oriental: au nord-ouest de Foiada, env. 2100 m. — Val S. Maria: à l'est des Mti Oncedo (sur Camperio), env. 1400 m., par centaines, et à l'est de Piano Segno, 1670 m. — VB. I.

Gymnadenia conopea (L.) R. Br.

VB. I.

G. odoratissima (L.) Rich.

Au sud des Mti Gariva (sur Castro), env. 1600 m., assez nombreux. — VB. I.

Platanthera bifolia (L.) Rich.

VB. I.

P. chlorantha (Custer) Rchb.

VB. I.

Epipactis palustris (Miller) Crantz.

Au nord de Campo Blenio entre Butino et Megordino, plusieurs stations, 1300-1340 m. Les plantes y atteignent une hau-

teur de 55 cm.; un exemplaire haut de 47 cm. portait 17 fleurs. Par centaines. Il s'agit donc d'une station riche. — Le rapport de *Keller, Rob.*: « Olivone » (voir *Chenevard*) ne pouvait pas être confirmé: mais il y a plus de 40 ans depuis lors et, entre temps, la station peut bien avoir été détruite. — VB. I.

E. atropurpurea Rafin.

Au nord de Campo Blenio dans la forêt entre Campo Blenio et Butino, env. 1260 m., et jusqu'au chemin de Campo Blenio à Baselga, Répandu. — VB. I.

E. latifolia (Hudson) All.

Val Malvaglia entre Ponte Cabbiera et Ascona sotto, 930. — VB. I.

Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch.

Répandu sur les pentes méridionales du Toira, jusqu'à l'est des Monti Oncedo. Monte jusqu'à 1490 m. et se trouve ça et là entre 1400 et 1490 m. Descend jusqu'à 950 m. Olivone 893 m.). — VB. I.

Limodorum abortivum (L.) Sw.
VB. I.

Spirantes aestivalis (Poiret) Rich.

Leggiuna à S. Anna, 520 m. Plus de 30 individus. — Malvaglia Rongie à Pontei, 450 m., deux pieds, et 510 m., un pied. — Motto, au pied de la cascade, env. 580 m., jusqu'à 40 cm. de haut. — Entre Ponto Valentino et Largario: cette station, rapportée déjà dans ma première liste, a prouvé être une station riche: plus de 100 individus sur la partie non fauchée de la station, (1946) atteignant une hauteur de 39 cm. Une seconde station se trouve à env. 100 m. au dessus de la première, à 940 m. env., mais celle-ci est moins riche. — VB. I.

1. *bifurca*. Entre Ponto Valentino et Largario (voir ci-dessus), une plante; à 9 cm. au-dessus de la base la tige était fourchue. Un bras atteignait 6 cm. de longueur, portant 8 fleurs, l'autre bras avait 10 cm. avec 14 fleurs.

S. spiralis (L.) Chevallier.
VB. I.

Listera ovata (L.) R. Br.

Monti di Leggiuna ça et là, 740 à 800 m. — S. Anna sur Leggiuna vers Malvaglia, env. 660 m. — Au sud de Mti Gariva (sur Castro) env. 1600 m. — Val S. Maria: Campa 1460 m.; à l'est de Piano Segno 1660 m. et Acqua-

calda env. 1750 m. — Val di Campo: à l'ouest de Ronco, env. 1680 m. et à l'est de Stabbio Nuovo env. 1770 m. — Au nord de Campo Blenio entre Baselga et Cozera, 1230 m., un pied. Entre Butino et Megordino, env. 1320 m.; jusqu'au chemin qui conduit de Campo Blenio à Baselga, répandu. — VB. I.

L. cordata (L.) R. Br.

Au nord-ouest d'Avrosso (au sud de Corzoneso) à 1280 m. env., nombreux. — Val Pontirone: dans le vallon Scienigio à 1380 m. env. une colonie au bord d'un petit ruisseau au nord-ouest de Fontaio; une seconde station se trouve au nord de Fontaio à 1400 m. env., le long d'un ruisseau qui descend de Fontaio. — Val S. Maria: à l'ouest de Mti Pü, vers la plaine de Campra, en compagnie de *Corallorrhiza trifida* Chât., ça et là. 1430 m. env. — Même Vallée, au sud-est de Piano-Segno, rive droite du Brenno, à 1670 m., abondant, flanc nord d'un rocher avec *Vaccinium*, à l'abri de *Rhododendron ferrugineum* L. — Val di Campo: à l'ouest de Ronco, env. 1670 m., très nombreux, avec le *Rhododendron ferrugineum*, à l'abri du *Larix decidua* Miller, et à une distance de 20 à 30 m. de quelques *Pinus*. Cette station se trouve à env. 1 km. à l'ouest de la station publiée dans ma première liste. — VB. I.

Celà porte à 8 le nombre de stations de *Listera cordata* dans le Val Blenio et ses affluents.

Neottia Nidus-avis (L.) Rich.

Plante nouvelle pour la flore du Val Blenio. Au-dessus de Pianezza (sur Semione) à env. 1150 m., un seul pied., probablement descendu d'une forêt de hêtres plus en haut. Plante grêle, haute de 24.5 cm.

Goodyera repens (L.) R. Br.

Au nord de Campo Blenio, dans la forêt qui s'étend au sud de Butino, env. 1250 m. Rare. Sous les pins, avec *Fragaria*, *Melampyrum sylvaticum* L., *Corallorrhiza trifida* Chât., *Epipactis atropurpurea* Rafin.

Cette plante, si répandue dans les Grisons, n'a jamais été, à ce que je sais, mentionnée du Tessin, ni des vallées méridionales des Grisons, à l'exception du Bergell, où je l'ai constatée en 1942, au sud de Castasegna, à 1220 m., Elle est mentionnée cependant du Mont Reit sur Bormio (par Comolli,) et des Alpes Bergamasques, à savoir sous l'Alpe Epolo, à 1300 m. (par Wilczek et Chenevard), de Schilpario, V. di Scalve, (par Chenevard), et de Ca-

po Brembo et Valleve (au nord de Branzi) (par *Rodegher-Venanzi*).

Corallorrhiza trifida Châtelain.

Val Pontirone: dans le Val Sciengio, à 1380 et 1400 m., avec *Listera cordata*, rare, aux bords d'un petit ruisseau au nord-ouest de Fontaio. — Val Malvaglia: entre Ponte Cabbiera et Ascona sotto, 930 m. env., deux pieds. — Valle S. Maria: à environ 300 m. à l'est de Mti Pü, 1380 m. env., rare. Une seconde station se trouve entre Monti Pü et la plaine de Campra, à 1420 m. env., 40 individus. Y Croît avec *Listera cordata*. — Au nord de Campo Blenio, dans la forêt au sud de Butino, disséminé, çà et là, env. 1250 m. VB. I.

Celà porte à 6 le nombre des stations dans le Val Blenio et ses affluents.

Ce sont les découvertes les plus importantes depuis la publication de ma première liste des Orchidées du Val Blenio. La présente liste comprend deux nouveautés, à savoir la *Neottia Nidus-avis* et la *Goodyera repens*, cette dernière plante nouvelle pour le canton. En outre, deux confirmations, à savoir l'*Orchis incarnata* et l'*Epipactis palustris*. Le total des espèces de la famille des Orchidées, qui habitent le Val Blenio, s'élève à 35 (contre un total de 49 pour le canton, et environ 57 espèces pour la Suisse entière, y compris les espèces spéciales à la Suisse occidentale). C'est donc un nombre très considérable, qui démontre la richesse de la Vallée de Blenio.

Il est toujours possible que l'une ou l'autre des espèces non citées, s'y trouve également et soit découverte un jour.