

Zeitschrift: DrogenMagazin : Zeitschrift für Suchtfragen
Herausgeber: Verein DrogenMagazin
Band: 21 (1995)
Heft: 1

Artikel: Nemexin-Programme in der Strafanstalt Lenzburg
Autor: Sachs, Josef
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-801161>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Nemexin-Programme in der Strafanstalt Lenzburg

Dr. med. Josef Sachs, leitender Arzt
Forensik, Psychiatrische Klinik
Königsfelden

Rahmenbedingungen

Gut die Hälfte der 180 Gefangenen der Strafanstalt Lenzburg entstammt – als Händler oder Konsument – dem Drogenmilieu. Gebraucht werden innerhalb der Institution vor allem Heroin und Haschisch. Heroin wird meistens intravenös konsumiert, wobei in letzter Zeit zunehmend zum sogenannten «Folienrauchen» übergegangen wird. Den mehr oder weniger stark opiatabhängigen Gefangenen steht eine erstaunlich grosse Zahl von Gelegenheits-Heroinkonsumenten gegenüber. Kokain, Benzodiazepine und Alkohol sind nur episodisch erhältlich und spielen im Gefängnisalltag eine weit geringere Rolle.

Die Strafanstalt Lenzburg begegnet den namentlich mit dem intravenösen Drogenkonsum verbundenen und mit herkömmlichen Vollzugsmethoden nicht zu bewältigenden Problemen zur Zeit mit drei unterschiedlichen Angeboten:

- einer gut ausgebauten AIDS-Sprechstunde, in welcher alle neu Eintretenden Gefangenen erfasst und Angehörige von

Risikogruppen systematisch begleitet werden


- der Sondervollzugsabteilung «Dingi» zur Rehabilitation von ausgewählten motivierten Gefangenen im letzten Vollzugsjahr, wobei bei Opiatabhängigen teilweise «Nemexin» eingesetzt wird

- freiwilligen Programmen mit dem Opiatantagonisten «Nemexin» im Normalvollzug.

Im folgenden sollen ausschliesslich die Nemexinprogramme im Normalvollzug vorgestellt werden.

«Nemexin» im Normalvollzug

Mit den Programmen wurde anfangs Mai 1994 begonnen. Interessierte Gefangene melden sich zur Abklärung in der psychiatrischen Sprechstunde und werden, falls die Indikation für die Behandlung mit «Nemexin» gestellt wird, zur körperlichen Untersuchung und zum Ausschluss von Kontraindikationen dem Gefängnisarzt zugewiesen. Mit jedem «Nemexin»-Kandidaten wird ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen, welcher die Rahmenbedingungen festhält. Der Therapie geht ein einwöchiger Opiatentzug in einer definierten Zelle der Strafanstalt voraus, wo der Kandidat von anderen Gefangenen isoliert gehalten wird. Für diese Zeit werden Besuche und Freizeitaktivitäten gestrichen, Spazieren und Duschen erfolgen einzeln. Am 6. Entzugstag wird mit Urinprobe und «Narcan»-Provokationstest die Opiatfreiheit verifiziert und anschliessend die perorale Therapie mit «Nemexin» in der üblichen Dosierung eingeleitet (montags und mittwochs je 100 mg, freitags 150 mg). Das «Nemexin» wird aufgelöst und unter Sichtkontrolle des Krankenpflegers eingenommen. Die «Nemexin»-Patienten haben sich monatlich drei unangekündigten Urinkontrollen zu unterzie-





hen, welche im Sinne der Hausordnung sanktioniert werden, das heisst mit zusätzlichen Freizeitaktivitäten bei negativem und Disziplinarstrafen bei positivem Befund. Ausserdem werden die «Nemexin»-Patienten psychotherapeutisch begleitet und monatlich vom Gefängnisarzt untersucht. Das Programm kann nur nach einem Gespräch mit dem Psychiater abgeschlossen oder allenfalls auch abgebrochen werden.

Ergebnisse der Nemexinprogramme


Im vergangenen Dreivierteljahr wurden 15 «Nemexin»-Programme eingeleitet, von denen 7 zur Zeit noch laufen. 3 weitere Programmteilnehmer konnten in die Sondervollzugsabteilung «Dingi» versetzt werden, wo die Behandlung weitergeführt wird. 3 Patienten traten aus der Strafanstalt aus; sie setzten das «Nemexin»-Programm ausnahmslos bei ihrem Hausarzt fort. In 2 Fällen wurde «Nemexin» auf Wunsch der Patienten abgesetzt; beide unterzogen sich in der Folge freiwilligen Urinkontrollen, die allerdings zu etwa 50% opiatpositiv ausfielen.

Bei einem Patienten musste die «Neme-





xin»-Therapie wegen ausgeprägten gastrointestinalen Nebenwirkungen abgesetzt werden. Nach einem schweren Rückfall in die Opiatabhängigkeit bewarb er sich um Wiederaufnahme ins Programm. Dank dem Einsatz von «Buscopan» erlebt er die nach wie vor auftretenden Nebenwirkungen jetzt als erträglich. 3 andere Patienten litten unter leichteren gastrointestinalen Störungen, die aber nicht zu einem Therapieabbruch führten. Ein Patient beklagt den unangenehmen Geschmack von «Nemexin», so dass er regelmässig mit Coca Cola nachspülen muss.



Die 8 abgeschlossenen Programme dauerten durchschnittlich gut 11 Wochen und können – vielleicht mit Ausnahme der beiden vorzeitigen Abbrüche auf Wunsch der Patienten – als erfolgreich bezeichnet werden. Berücksichtigend, dass die zwei Therapieabbrecher bedeutend weniger Heroin gebrauchen als früher, muss aber auch diesen Fällen zumindest ein Teilerfolg attestiert werden. In den 7 laufenden Programmen traten bisher keine nennenswerten Probleme auf; die Patienten leben alle opiatabstinent. Der typische Nemexinbewerber ist 29,1

Jahre alt, hat auf eigene Faust bereits mehrere erfolglose Opiatentzüge durchgestanden, ist bei anderen Gefangenen verschuldet und hat Angst vor deren Repressalien, so dass er unter einem erheblichen Leidensdruck steht. Nicht bewährt hat sich direkte oder indirekte Druckausübung durch die Anstalt, zum Beispiel im Sinne von Vollzugserleichterungen für Patienten, die sich der Behandlung unterziehen.

Beurteilung

Die Therapie von opiatabhängigen Strafgefangenen mit «Nemexin» hat sich als sehr wirksam erwiesen, sofern gut strukturierte Programme auf freiwilliger Basis angeboten werden. Suchtverlagerungen sind in der Strafanstalt

Lenzburg kaum zu beobachten, wobei allerdings die geringere Verfügbarkeit von anderen Drogen mit eine Rolle spielen dürfte. Leichte Erreichbarkeit der Patienten und Präsenz von Ärzten und Therapeuten stellen günstige Rahmenbedingungen für die Durchführbarkeit von Abstinenzprogrammen dar.

Die kurze Beobachtungsdauer erlaubt noch kein definitives Urteil über den Stellenwert von «Nemexin» bei der Suchtbehandlung von Strafgefangenen. Selbst wenn mit Fug davon ausgegangen werden darf, dass die Programme noch ausbaufähig sind, wird eine Gruppe von Opiatabhängigen bleiben, die mit diesem Angebot nicht erreicht werden kann und für die alternative Behandlungsmethoden gesucht werden müssen.

Königsfelden, 30.01.1995

«Nemexin»-Programme in der Strafanstalt Lenzburg vom 01.05.94 bis 30.01.95

| Pat. Nr. / Jahrgang | Beginn | Ende | Urinproben -/+ | Verträglichkeit | Grund für Abbruch |
|---------------------|----------|----------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| 01/1967 | 04.05.94 | 07.12.94 | 21/1 | gut | Austritt |
| 02/1965 | 04.05.95 | 05.07.94 | 8/0 | gut | Versetzung ins Dingi |
| 03/1966 | 16.05.94 | 05.07.94 | 6/0 | Durchfälle Magenprobleme | Nebenwirkungen |
| | 14.10.94 | laufend | 10/0 | Besser mit Buscopan | — |
| 04/1968 | 24.05.94 | 13.06.94 | 3/0 | gut | Versetzung ins Dingi |
| 05/1968 | 30.05.94 | 27.07.94 | 6/1 | gut | Wunsch des Pat. |
| 06/1963 | 06.06.94 | laufend | 23/0 | Durchfälle | — |
| 07/1968 | 27.06.94 | 23.09.94 | 10/0 | gut | Austritt |
| 08/1969 | 18.07.94 | 27.07.94 | 2/0 | gut | Versetzung ins Dingi |
| 09/1965 | 05.09.94 | 26.12.94 | 12/0 | gut | Wunsch des Pat. |
| 10/1970 | 07.11.94 | 11.01.95 | 8/0 | leichte Magenprobleme | Austritt |
| 11/1939 | 07.12.94 | laufend | 5/0 | leichte Magenprobleme | — |
| 12/1967 | 14.12.94 | laufend | 4/0 | gut | — |
| 13/1958 | 26.12.94 | laufend | 2/0 | gut | — |
| 14/1968 | 26.12.94 | laufend | 3/0 | gut | — |
| 15/1972 | 11.01.95 | laufend | 2/0 | (schlechter Geschmack) | — |