

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 61 (1983)
Heft: 2

Artikel: Hymenochaete tabacina (Sow. ex Fr.) Lév., Tabakbrauner
Borstenscheibling = Hyménochète brun tabac
Autor: Kobler, B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936728>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Hymenochaete tabacina (Sow. ex Fr.) Lév., Tabakbrauner Borstenscheibling

- Fruchtkörper:* krustenförmig der Baumrinde aufliegend. Oft oben und an den Randpartien mit gebrechlichen Hütchen oder zusammengewachsenen Hutkanten, die im jungen Zustand hellrostgelb gefärbt sind. Oberseite jung fein filzig, gezont.
- Fruchtschicht:* stereoid, rost- bis tabakbraun, matt, oft mit für diese Art typischen, kreisförmig angeordneten Unebenheiten. Das Hymenium enthält zahlreiche braune Seten.
- Standort:* vorwiegend an toten Ästen von Weide und Haselnuss, seltener auch an andern Bäumen und Sträuchern. Vereinzelte Funde auf Fichte. Häufig. B. Kobler

Hymenochaete tabacina (Sow. ex Fr.) Lév., Hyménochète brun tabac

- Carpophore:* étalé en croûte sur l'écorce des arbres. La partie supérieure et les bordures forment souvent de petits chapeaux fragiles ou d'étroites projections confluentes, de couleur jaune rouille clair dans la jeunesse. Surface supérieure zonée et finement feutrée chez les jeunes sujets.
- Hyménium:* stéréiforme, brun rouille à brun tabac, mat, avec des excroissances rangées en cercle, caractère souvent typique de cette espèce. On trouve dans l'hyménium de nombreuses soies brunes (spinules).
- Habitat:* sur branches mortes, surtout de noisetier et de saule, plus rarement d'autres arbres et arbustes. Découvertes mentionnées sur pin. Fréquent.

(Trad.: F. Brunelli)

Hymenochaete tabacina (Sow. ex Fr.) Lév.

- Ricettacolo:* cresce a forma di crosta sulla corteccia degli alberi. Sovente nella parte superiore e nelle parti marginali ha piccoli cappelli fragili, oppure l'orlo superiore è strettamente riflesso. Zonato, e da giovane la parte superiore è finemente feltrata.
- Imenio:* liscio e nudo, da bruno ruggine a bruno tabacco, opaco, sovente con protuberanze ordinate a cerchio, che sono tipiche di questa specie. L'imenio contiene numerose setole brune.
- Habitat:* in prevalenza su rami secchi di salici e noccioli, raramente su altri alberi o cespugli. Vi sono rari ritrovamenti su abete rosso. Comune. (Trad.: E. Zenone)

Kalender 1983 / Calendrier 1983 / Calendario 1983

- 12.3. Frühjahrstagung in Thalwil
19.3./20.3. Delegiertenversammlung in Horgen
19.6. Rencontre mycologique Mont-Soleil
3.7. Rencontre mycologique Gardot
13.8./14.8. Bestimmungstage in Schöftland
27.8./28.8. Journées romandes à Sion
27.8.–3.9. 1. Vapko-Kurs in Gfellen
2.9.–4.9. Cours de mycologie in Martigny
4.9.–10.9. Pilzbestimmerwoche in Meienberg
4.9.–10.9. Dreiländertagung in Coburg (BRD)
10.9.–17.9. 2. Vapko-Kurs in Degersheim
24.9./25.9. Vapko-Tagung in Thun
-